

广西植物名录

第二册 双子叶植物



广西植物研究所编

1971.12

中国科学院图书馆	
分类号	58.VI

13007

58.VI

毛主席语录

58.8673
107
:2

领导我们事业的核心力量是中国共产党。
指导我们思想的理论基础是马克思列宁主义。

中华人民共和国第一届全国人民代表大会第一次会议开幕词(一九五四年九月十五日),一九五四年九月十六日《人民日报》

备战、备荒、为人民。

转摘自《中国共产党第八届中央委员会第十一次全体会议公报》(一九六六年八月十二日)

自然科学是人们争取自由的一种武装。
人们为着要在社会上得到自由,就要用社会科学来了解社会,改造社会进行社会革命。人们为着要在自然界里得到自由,就要用自然科学来了解自然,克服自然和改造自然,从自然界里得到自由。

在边区自然科学研究会成立大会上的讲话(一九四〇年二月五日),一九四〇年三月十五日《新中华报》

人类总得不断地总结经验,有所发现,有所发明,有所创造,有所前进。

转摘自《周恩来总理在第三届全国人民代表大会第一次会议上的政府工作报告》,一九六四年十二月三十一日《人民日报》

中科院植物所图书馆



S0050188



贈閱

中国科学院
植物研究所草委会



說 明

遵照伟大领袖毛主席“**备战、备荒、为人民**”的伟大教导，为了进一步开发和利用祖国丰富的植物资源，更好地为社会主义建设服务，我们将多年来野外调查采集的标本和收集的资料重新整理，编写成《广西植物名录》，供医药、工、农、林、牧、副等部门，在开发利用广西丰富的植物资源时参考。

本册是《广西植物名录》的第二册，收载已知的广西双子叶植物188科，1200属，4463种(其中包括亚种11、变种358、和变型38)，绝大部分是分布在广西的植物，少数是从我国各省、区或国外引进广西的种类。

每种植物依次记载：中名，别名，学名，分布，用途。

我们一定要解放我国神圣领土台湾省。为了坚决粉碎帝国主义制造“两个中国”的阴谋，绝不许将台湾省称作“Formosa (福摩萨)”。因此在学名中，凡有用“Formosa”称台湾省作为植物种名语根的，本书一律将“Formosa (福摩萨)”改为“Taiwan (台湾)”。

中名的左上角有“*”号的，是栽培植物。旧有中名不恰当需要更改，或未有中名的植物，我们都拟出新名。在名后有“☆”号的，为新拟名。

分布仅指该植物在广西的分布(产地)。因资料不够完整，就是在广西的分布也没有全部写上，故在两地(县)之间，或相邻地区，虽然本书未有记录，也可能有这种植物的

分布。书中的大瑶山、大苗山等，是指各该山脉和相邻的地区。

科的排列系按《有花植物科志》的系统（1926年版）。每个科中的属、种、亚种和变种等，则按拉丁文字母顺序排列。同属植物的属名，除该属第一个种的属名全写外，其余只写属名的第一个字母代之，但在每页的上方，有全写的属名。

为了节省篇幅和便于应用，对学名中的一部分命名人，采用比通常使用的缩写更简略的缩写。例如：L. = Linn., Thb. = Thunb., Hk. = Hook., H-M. = Hand.-Mzt., Gagn. = Gagnep., W. et A. = Wight et Arn., R. et W. = Rehd. et Wils., S. et Z. = Sieb. et Zucc., M.-A. = Muell.-Arg.

书末有中名索引、拉丁文科名、属名索引，以便检索。由于我们学习毛泽东思想不够，水平有限，错误之处，请同志们批评指正。

在编写过程中，承兄弟单位热情支持，提供了一些标本、资料，借此致以衷心感谢和革命敬礼！

广西植物研究所

一九七一年十二月

《广西植物名录》第二册勘误表

页	行	误	正
43	4	Naravalia	Naravelia
44	倒10	小藥碱	小藥碱
45	倒12	莲荷	莲 荷
59	倒 8	苧叶菱	苧叶菱
61	倒 7	Houttynia	Houttuynia
104	倒10	酢醬草科	酢漿草科
105	5, 13, 17, 21, 22	酢醬草	酢漿草
110	14	Duabunga	Duabanga
113	倒 5	小二仙科	小二仙草科
131	倒 8	Gymnostemma	Gynostemma
131	倒12	Gymnopetatum	Gymnopetalum
135	3	Gymnostemma	Gynostemma
146	左上角	Camellia	Camellia-Cleyera
146	13	concarpa	conocarpa
147	右上角	Camellia-Eurya	Cleyera-Eurya
191	7	柑橄果	柑欖果
208	11, 15, 20	黄花稔	黄花稔
209	1, 5, 12, 18, 23	黄花稔	黄花稔

页	行	误	正
348	倒10	十	十万大山
356	6	锦楮	绵楮
375	9	seneu	sensu
476	倒2	Roiptelea	Rhoiptelea
517	倒7	C.B.Clarks	C.B.Clarke
517	倒11	var. dielsii (Lévl.)	var. dielsii (Lévl.) Walk.
529	倒5	macrothyrsas	macrothyrsus
539	10	急性腹炎	急性肠炎
666	倒12	缩萼	宿萼
684	2	腹炎腹泻	肠炎腹泻
729	6	Goniosporum	Geniosporum
763	中5	白鼓钉...58	白鼓钉...85
763	右8	鸟祱草	包袱草
763	右10	包不宿	鸟不宿
769	左13	似铁屎木	似铁屎米
786	左8	柑橄果	柑榄果
788	右30	狭叶山黄麻...392	狭叶山黄麻...367
818	右8,10	198A	198B
832	左8	...183...431	...183...413
835	左3	...232...592	...232...593
840	右14	Viburnnm	Viburnum

目 录

被子植物亚門 ANGIOSPERMAE

双子叶植物綱 DICOTYLEDONEAE

1. 木 兰 科	Magnoliaceae.....	1
2A. 八 角 科	Illiciaceae	6
3. 五味子科	Schizandraceae	8
8. 番荔枝科	Annonaceae	10
11. 樟 科	Lauraceae	15
13A. 青 藤 科	Illigeraceae	35
14. 肉豆蔻科	Myristicaceae	36
15. 毛 茛 科	Ranunculaceae	36
17. 金鱼藻科	Ceratophyllaceae	45
18. 睡 莲 科	Nymphaeaceae	45
19. 小 蘗 科	Berberidaceae	46
21. 木 通 科	Lardizabalaceae	48
22. 大血藤科	Sargentodoxaceae	50
23. 防 已 科	Menispermaceae	50
24. 马兜铃科	Aristolochiaceae	56
27. 猪笼草科	Nepenthaceae	58
28. 胡 椒 科	Piperaceae.....	59
29. 三白草科	Saururaceae	61

30. 金粟兰科	Chloranthaceae	62
32. 罂粟科	Papaveraceae	63
33. 紫堇科	Fumariaceae	64
36. 白花菜科	Capparidaceae	65
39. 十字花科	Cruciferae	68
40. 堇菜科	Violaceae	72
42. 远志科	Polygalaceae	75
45. 景天科	Crassulaceae... ..	79
47. 虎耳草科	Saxifragaceae	80
48. 茅膏菜科	Droseraceae	82
52. 沟繁缕科	Elatinaceae	83
53. 石竹科	Caryophyllaceae	83
54. 粟米草科	Molluginaceae	86
56. 马齿苋科	Portulacaceae	87
57. 蓼科	Polygonaceae	87
59. 商陆科	Phytolaccaceae	96
61. 藜科	Chenopodiaceae.....	97
63. 苋科	Amaranthaceae	98
64. 落葵科	Basellaceae	102
65. 亚麻科	Linaceae.....	102
66. 蒺藜科	Zygophyllaceae.....	103
67. 牻牛儿苗科	Geraniaceae	103
69. 酢浆草科	Oxalidaceae	104
70. 金莲花科	Tropaeolaceae	106
71. 凤仙花科	Balsaminaceae	106
72. 千屈菜科	Lythraceae.....	107
74. 海桑科	Sonneratiaceae	110

75. 安石榴科	Punicaceae.....	110
77. 柳叶菜科	Onagraceae	111
77A. 菱.....科	Hydrocaryaceae.....	113
78. 豆瓣草科☆	Haloragaceae.....	113
79. 水马齿科	Callitrichaceae	114
81. 瑞香科	Thymelaeaceae	114
83. 紫茉莉科	Nyctaginaceae	117
84. 山龙眼科	Proteaceae	117
85. 五桠果科	Dilleniaceae	120
87. 马桑科	Coriariaceae	120
88. 海桐花科	Pittosporaceae	121
91. 红木科	Bixaceae	123
93. 大风子科	Flacourtiaceae	124
94. 天料木科	Samydaceae	126
98. 桤柳科	Tamaricaceae.....	128
101. 转心莲科☆	Passifloraceae	128
103. 葫芦科	Cucurbitaceae	129
104. 秋海棠科	Begoniaceae	137
106. 木瓜科	Caricaceae	139
107. 仙人掌科	Cactaceae	139
108. 茶.....科	Theaceae	140
108A. 五列木科	Pentaphylacaceae	158
112. 猕猴桃科	Actinidiaceae	158
113. 水东哥科	Saurauiaceae	161
114. 金莲木科	Ochnaceae	162
116. 龙脑香科	Dipterocarpaceae	162
118. 桃金娘科	Myrtaceae	163

120. 野牡丹科	Melastomaceae	172
121. 使君子科	Combretaceae	180
122. 红树科	Rhizophoraceae.....	182
123. 金丝桃科	Hypericaceae	183
126. 山竹子科	Guttiferae.....	185
128. 椴树科	Tiliaceae	186
128A. 杜英科	Elaeocarpaceae	191
130. 梧桐科	Sterculiaceae.....	195
131. 木棉科	Bombacaceae	202
132. 锦葵科	Malvaceae	203
133. 金虎尾科	Malpighiaceae	210
135. 古柯科	Erythroxylaceae	211
135A. 粘木科	Ixonanthaceae	212
136. 大戟科	Euphorbiaceae	212
136A. 虎皮楠科	Daphniphyllaceae	238
139. 鼠刺科	Escalloniaceae	239
141. 醋栗科	Grossulariaceae	241
142. 绣球花科	Hydrangeaceae	241
143. 蔷薇科	Rosaceae	246
144. 毒鼠子科	Dichapetalaceae	274
145. 蜡梅科	Calycanthaceae.....	275
146. 含羞草科	Mimosaceae	275
147. 苏木科	Caesalpiniaceae.....	281
148. 蝶形花科	Papilionaceae	291
150. 通条木科☆	Stachyuraceae	334
151. 金缕梅科	Hamamelidaceae	335
152. 杜仲科	Eucommiaceae	339

154. 黄 杨 科	Buxaceae	340
155. 悬 铃 木 科	Platanaceae	341
156. 杨 柳 科	Salicaceae	341
159. 杨 梅 科	Myricaceae	343
161. 桦 木 科	Betulaceae	343
162. 榛 木 科	Corylaceae	345
163. 壳 斗 科	Fagaceae	346
164. 木 麻 黄 科	Casuarinaceae	364
165. 榆 科	Ulmaceae	365
167. 桑 科	Moraceae	369
169. 荨 麻 科	Urticaceae	382
170. 大 麻 科	Cannabinaceae	392
171. 冬 青 科	Aquifoliaceae	393
173. 卫 矛 科	Celastraceae	403
178. 翅 子 藤 科	Hippocrateaceae	410
179. 茶 茱 萸 科	Icacinaceae	411
182. 青 皮 木 科	Olacaceae	412
183. 山 柑 科	Opiliaceae	413
185. 桑 寄 生 科	Loranthaceae	414
186. 檀 香 科	Santalaceae	417
189. 蛇 菰 科	Balanophoraceae	418
190. 鼠 李 科	Rhamnaceae	419
191. 胡 颓 子 科	Elaeagnaceae	425
193. 葡 萄 科	Vitaceae	426
194. 柑 桔 科	Rutaceae	434
195. 苦 木 科	Simarubaceae	447
196. 橄 榄 科	Burseraceae	447

197. 楝 科	Meliaceae	448
198. 无患子科	Sapindaceae	453
198A. 七叶树科	Hippocastanaceae	457
198B. 南华木科	Bretschneideraceae	458
200. 槭 树 科	Aceraceae	459
201. 清风藤科	Sabiaceae	464
204. 省沽油科	Staphyleaceae	468
205. 漆 树 科	Anacardiaceae	469
206. 牛栓藤科	Connaraceae	473
207. 胡 桃 科	Juglandaceae	474
207A. 马尾树科	Rhoipteleaceae	476
209. 山茱萸科	Cornaceae	477
210. 八角枫科	Alangiaceae	479
211. 紫 树 科	Nyssaceae	480
212. 五 加 科	Araliaceae	481
212A. 烂泥树科	Torricelliaceae	491
213. 伞 形 科	Umbelliferae	491
214. 山 柳 科	Clethraceae	498
215. 杜鹃花科	Ericaceae	499
215A. 鹿蹄草科	Pyrolaceae	508
216. 乌饭树科	Vacciniaceae	508
218. 水晶兰科	Monotropaceae	511
221. 柿 科	Ebenaceae	511
222. 山 榄 科	Sapotaceae	513
222A. 肉 实 科	Sarcospermaceae	515
223. 紫金牛科	Myrsinaceae	515
224. 安息香科	Styracaceae	525

225. 山 矾 科	Symplocaceae	531
228. 马 钱 科	Loganiaceae	538
229. 木 犀 科	Oleaceae	542
230. 夹竹桃科	Apocynaceae	550
231. 萝 藦 科	Asclepiadaceae	562
232. 茜 草 科	Rubiaceae	574
233. 忍 冬 科	Caprifoliaceae	603
235. 败 酱 科	Valerianaceae	610
236. 续 断 科	Dipsacaceae... ..	612
238. 菊 科	Compositae	612
239. 龙 胆 科	Gentianaceae.....	646
239A. 睡 菜 科	Menyanthaceae	649
240. 报春花科	Primulaceae	649
241. 蓝 雪 科	Plumbaginaceae	653
242. 车前草科	Plantaginaceae	654
243. 桔 梗 科	Campanulaceae	654
243A. 五 膈 草 科	Pentaphragmataceae	657
243B. 楔 瓣 花 科	Sphenocleaceae	657
244. 半 边 莲 科	Lobeliaceae	657
247. 花 葱 科	Polemoniaceae	659
248. 田 基 麻 科	Hydrophyllaceae	659
249. 紫 草 科	Boraginaceae	659
250. 茄 科	Solanaceae	662
251. 旋 花 科	Convolvulaceae	670
252. 玄 参 科	Scrophulariaceae	676
253. 列 当 科	Orobanchaceae	686
254. 狸 藻 科	Lentibulariaceae	687

256. 苦苣苔科	Gesneriaceae.....	687
257. 紫葳科	Bignoniaceae.....	695
258. 芝麻科	Pedaliaceae	698
259. 爵床科	Acanthaceae	698
261. 苦檻蓝科	Myoporaceae.....	705
263. 马鞭草科	Verbenaceae	705
263A. 透骨草科	Phrymaceae	719
264. 唇形科	Labiatae	719

附 录

中名索引	741
拉丁文科名、属名索引	815

種子植物門 SPERMATOPHYTA

被子植物亞門 ANGIOSPERMAE

双子叶植物綱 DICOTYLEDONEAE

1 木 兰 科 MAGNOLIACEAE

细蕊木兰

Kmeria septentrionalis Dandy

罗城。

鹅掌楸 马褂木

Liriodendron chinense Sarg.

大苗山、临桂、龙胜、兴安、资源、灌阳。

绿化树种。木材供建筑、家具等用。

庐山厚朴 凹叶厚朴

Magnolia biloba (R. et W.) Cheng

临桂、灵川、兴安、龙胜、资源、全州、大瑶山、大苗山、富川、钟山。

树皮、根皮温中理气，消积散满；治腹痛胀满，气逆咳喘。芽、

叶、花、果、种子均可入药。造林及材用树种。种子可榨油。

香港木兰

M. championi Benth.

十万大山。

*夜香木兰 夜合花

M. coco (Lour.) DC.

Magnolia

栽培花木。

花香气浓郁，可提香精，亦可薰茶。

*荷花玉兰 广玉兰

M. grandiflora L.

栽培花木。

花芳香，大而美，为绿化、行道及材用树种。叶、花治高血压。

叶、嫩枝、花可提芳香油。

*白玉兰 玉兰、应春花、望春花

M. heptapeta (Buchoz) Dandy

(*M. denudata* Desr.)

栽培花木。

绿化及材用树种。花瓣可食，亦可薰茶。种子可榨油。

光叶玉兰

M. nitida W.W.Sm.

武鸣、大明山、大瑶山、象州、大苗山、临桂、灵川、龙胜、灌阳。

厚朴

M. officinalis R. et W.

大瑶山、灵川、贺县。

树皮、根皮温中理气，消积散满，燥湿健脾；治腹闷胀满，气逆

咳喘。芽、叶、花、果及种子均可入药。造林和材用树种。亦

可供绿化。种子可榨油。

长叶玉兰

M. paeneta Dandy

龙州、扶绥、大明山、十万大山、靖西。

*木兰 辛夷、木笔、紫玉兰

M. quinquepeta (Buchoz) Dandy

(*M. liliflora* Desr.)

栽培花木。

树皮、叶、花散上焦风热，镇痛；治头痛，鼻炎。花可提取香精。绿化灌木，亦可作白兰砧木。

小花木兰 天女花

M. sieboldii K.Koch

(**M. parviflora S. et Z.**)

兴安、全州、资源。

绿化树种。

桂南木莲☆

Manglietia chingii Dandy

十万大山、武鸣、大瑶山、大苗山、玉林、容县、贺县、荔浦、临桂、灵川、兴安、资源、全州、龙胜。

材用及绿化树种。

木莲

M. fordiana (Hemsl.) Oliv.

大苗山、大瑶山、临桂、灌阳、全州、龙胜、贺县、苍梧、蒙山、昭平、十万大山、玉林、龙州、田林、德保。

材用及绿化树种。

滇桂木莲☆

M. forrestii W.W.Sm. ex Dandy

大苗山。

球果木莲

M. globosa H.T.Chang

十万大山。

缅甸木莲☆

M. hookeri Cubitt. ex W.W.Sm.

容县。

美木莲 大木莲、红花木莲

M. insignis (Wall.) Bl.

全州、十万大山。

广东木莲

M. kwangtungensis (Merr.) Dandy

苍梧、龙州。

大叶木莲 米弄

M. megaphylla Hu et Cheng

靖西、那坡。

毛桃木莲 毛桃、牛心树

M. moto Dandy

贺县、苍梧、凌云。

细工用材树种。

锈毛木莲

M. rufibarbata Dandy

东兰。

广西木莲 小木莲

M. tenuipes Dandy

上思、凌云、乐业、靖西、那坡、田林、百色、隆林、大瑶山。

材用树种。

• 白兰

Michelia alba DC.

栽培花木。

花行气化痰，止咳；治白浊，白带，咳嗽；又可提芳香油及薰茶。行道及绿化树种。

苦梓

M. balansae (A. DC.) Dandy

东兴、上思、那坡、靖西、阳朔。

花可提芳香油。

●黄兰

M. champaca L.

栽培花木。

花香浓郁，可提芳香油及薰茶。叶可养蚕。木材优良，可供造船。绿化树种。

灰绒白兰花☆

M. fallax Dandy

全州、资源、大苗山、田林。

材用树种。

含笑花

M. figo (Lour.) Spreng.

(**M. fuscata Bl.**)

三江、大苗山、大瑶山、龙胜、临桂、桂林、永福、恭城、兴安；亦多有栽培。

花可提芳香油及薰茶。庭园绿化树种。

野木兰 火力楠、牛耳楠、香糊楠、大兰树

M. foveolata Merr. ex Dandy

临桂、龙胜、兴安、全州、恭城、宁明、靖西、那坡、德保、田林、十万大山、大瑶山、容县、贺县。

材用树种，木材耐水湿。

火力楠 楠木、棉毛含笑、醉香含笑

M. macclurei Dandy var. sublanea Dandy

东兴、浦北、十万大山、容县、北流、博白、陆川、玉林、岑溪、苍梧、崇左、龙州。

桂南速生及优良用材树种。花可提芳香油。

深山含笑 大叶楠、光叶白兰花

M. maudiae Dunn

全州、兴安、龙胜、灌阳、恭城、灵川、临桂、宜山、大瑶山、

Michelia-Illicium

大苗山、容县、大明山、宁明、贺县。

花有水果香，可提芳香油。优良用材及绿化树种。

白花含笑 苦梓

M. mediocris Dandy

藤县、昭平、宁明。

材用树种。

阔瓣白兰花

M. platypetala H.-M.

全州、资源、灌阳、灵川、临桂、大苗山、大瑶山。

材用树种。

广东含笑

M. tsoi Dandy

灵川、临桂、恭城、贺县、德保。

香木莲 唛采

Paramanglietia aromatica (Dandy) Hu et Cheng

(*Manglietia aromatica* Dandy)

龙州。

全株有香气，花、叶及木材均可提芳香油。

香花木 香花楠

Tsoongiodendron odorum Chun

龙州、大新、崇左、田林、德保、靖西、那坡、都安、苍梧、大

苗山、阳朔、永福、临桂、桂林、龙胜。

优良用材树种。花可提芳香油。种子可榨油。

2A 八角科 ILLICIACEAE

短柱八角

Illicium brevistylum A.C.Sm.

大瑶山、蒙山、昭平。

红花八角 红花荷树、山八角、野八角

I. dunnianum Tutch.

龙胜、兴安、临桂、大瑶山、大苗山、上思、南宁、大新、苍梧、贺县。

果有大毒，可作农药。根仅外用，治风湿腰痛。

红茴香

I. henryi Diels

大苗山、龙胜。

叶、果可提芳香油。果镇呕行气；治胃寒作吐。

大八角 野八角、神仙果

I. majus Hk.f. et Thoms.

全州、兴安、资源、龙胜、灌阳、阳朔、灵川、昭平、大苗山、

大瑶山、宜山、大明山、那坡、凌云、乐业。

果有大毒，可作农药，亦可醉鱼。

小花八角 野八角

I. micranthum Dunn

(*I. wangii* Hu)

大新、宁明、藤县、苍梧、大瑶山、大苗山、龙胜。

果有毒，可作农药。

山八角

I. oligandrum Merr. et Chun

大瑶山、大明山。

厚叶八角

I. pachyphyllum A.C Sm.

大瑶山、十万大山。

花可提芳香油。

灰木叶八角

I. symplocifolium How, ined.

Illicium-Kadsura

龙胜、大苗山。

●八角

I. verum Hk.f.

百色、南宁、钦州、梧州、柳州等地区均有栽培。

果、叶含八角茴香油，为香料和制药原料；果作调味香料；又温中开胃，治胃寒呕吐，脘腹胀满。

3 五味子科 SCHIZANDRACEAE

冷饭团 大钻、酒饭团、大钻骨风

Kadsura coccinea (Lem.) Sm.

(*K. chinensis* Hance,

K. hainanensis Merr.)

区内各地。

根、藤祛风止痛，行气活血；治风湿关节炎，跌打肿痛，刀伤，胃痛。果可食。

风藤 梅花钻、海风藤

K. heteroclita (Roxb.) Craib

陆川、玉林、十万大山、富川、钟山、大瑶山、大苗山、靖西、

田林、隆林、凌云、永福、灵川、恭城、灌阳、龙胜、资源。

藤祛风散寒，舒筋活络；治腰腿痛，风湿痛，跌打。果可食。

披针叶南五味子

K. lancilimba How

隆林、龙胜、大瑶山、大苗山。

果可食。

小钻 长序南五味子、入地麝香、小钻骨风、春头草、血头果

K. longipedunculata Fin. et Gagn.

(*K. peltigera* R. et W.)

资源、全州、龙胜、兴安、临桂、永福、三江、大苗山、大瑶山、凤山、十万大山、大明山、玉林、博白、北流。

根祛风活血，散瘀止痛；治风湿关节炎，跌打，胃痛，经痛。种子止咳。果可食。茎皮纤维可结绳。

多籽南五味子

K. polysperma Yang

龙胜。

罗裙子 峨眉五味子、小血藤

Schizandra henryi Clarke

隆林、那坡、凌云、乐业、大瑶山、大苗山、全州、兴安、资源、龙胜。

根、藤通经活血，祛风除湿；治筋骨酸痛，跌打，月经不调。果敛肺止咳，滋肾固精；治肺虚喘咳，遗精；亦可食用。茎皮可制纤维。

边缘罗裙子

S. henryi Clarke

var. marginalis A.C.Sm.

全州、龙胜、灵川、大苗山、大瑶山、南丹、凌云、乐业、贺县、大明山。

果可食。

过山风

S. viridis A.C.Sm.

全州、资源、兴安、龙胜、恭城、临桂、荔浦、罗城、都安、大苗山、大瑶山、凌云、乐业。

根、藤祛风除湿；治风湿骨痛。花可提芳香油。果可食。

8 番荔枝科 ANNONACEAE

毛叶阿芳

Alphonsea mollis Dunn

龙州大青山。

单果阿芳 唛嫩

A. monogyna Merr. et Chun

龙州、那坡、平南。

木材坚硬，可作支柱等用。

*牛心果 圆滑番荔枝

Annona glabra L.

南宁。

木材轻，可作瓶塞及鱼网浮子。

*番荔枝 唛螺陀

A. squamosa L.

桂南、桂西有栽培。

热带果树。

香港鹰爪

Artabotrys hongkongensis Hance

十万大山、龙州、靖西、凌云、乐业、临桂、富川、钟山。

鹰爪 鹰爪花

A. uncinatus (Lam.) Merr.

(*A. odoratissimus* R.Br.)

靖西、龙州、大新、灵山、藤县；也有栽培。

花极香，可作香精原料，亦可薰茶。

喙果皂帽花

Dasydaschalon rostratum Merr. et Chun

(*D. glaucum* Merr. et Chun)

十万大山、宁明、那坡、大瑶山、临桂、龙胜。

皂帽花

D. trichophorum Merr.

博白、北流、大瑶山。

假鹰爪 酒饼叶、鸡爪风

Desmos cochinchinensis Lour.

钦州、南宁、玉林、梧州地区以及百色、河池、柳州、桂林四地区南部。

全株有小毒，祛风止痛；治风湿骨痛，产后腹痛，跌打，皮癣。

茎皮纤维为人造棉及高级纸原料，亦可代麻。叶可制酒饼。花香，供观赏。

云南假鹰爪☆ 云南山指甲

D. dumosus (Roxb.) Safford

大瑶山。广西新纪录。

独山瓜馥木

Fissistigma cavaleriei (Lévl.) Rehd.

(*Uvaria cavaleriei* Lévl.)

田林。

阔叶瓜馥木

F. chloroneurum (H.-M.) Tsiang

宁明、龙州、那坡。

金果瓜馥木

F. cupreonitens Merr. et Chun

东兴、十万大山。

白叶瓜馥木

F. glaucescens (Hance) Merr.

十万大山、龙州、宁明、大瑶山、大苗山。

广西瓜馥木

F. kwangsiensis Tsiang et P.T.Li

龙州大青山、十万大山。

毛瓜馥木

F. maclurei Merr.

(*Melodorum maclurei* Ast)

扶绥。

瓜馥木 铁钻、降香藤、小香藤、香藤风

F. oldhami (Hemsl.) Merr.

区内各地。

藤治跌打风湿。茎皮纤维可造纸及代麻。鲜花含芳香油，为香精原料。种子可榨油，供工业用。

长柄瓜馥木

F. oldhami (Hemsl.) Merr.

var. *longistipitatum* Tsiang

大苗山。

多花瓜馥木

F. polyanthum (HK.f. et Thoms.) Merr.

玉林、横县、宁明、上林、龙州、那坡、百色、凌云、都安、巴马、东兰、大瑶山、昭平、平乐。

根祛风除湿；治风湿跌打。

凹叶瓜馥木

F. retusum (Lévl.) Rehd.

(*F. capitatum* Merr. ex Li)

龙州、那坡、百色、隆林、凌云、乐业、罗城。

上思瓜馥木

F. shangtzeense Tsiang et P.T.Li

东兴、十万大山。

容县瓜馥木☆ 天堂瓜馥木

F. tientangense Tsiang et P.T.Li

容县天堂山。

香港瓜馥木 大香藤、大酒饼子

F. uonicum (Dunn) Merr.

十万大山、博白、容县、平南、苍梧、藤县、贺县、昭平、大瑶山、大苗山、三江、荔浦、阳朔、永福、龙胜。

叶可制酒饼。果甜，可食。

木瓣瓜馥木

F. xylopetalum Tsiang et P.T.Li

宁明。

红叶哥纳香

Goniiothalamus rufus Tsiang, ined.

龙州、上思。

密榴木

Milusa chunii W.T.Wang

(*M. filipes* Merr. et Chun)

大新、宁明、龙州、那坡、靖西、百色、都安、柳城、荔浦、阳朔、永福、桂林。

算盘子密榴木

M. glochidioides H.-M.

宁明、龙州、德保、靖西、河池、阳朔。

Milusa-Uvaria

中华密榴木

M. sinensis Finet et Gagnep.

德保、靖西、田林、田阳、百色、凌云、隆林、天峨、东兰。

山蕉

Mitrephora maingayi Hk.f. et Thoms.

大新、龙州、靖西、田阳、都安、河池、凤山。

斜叶澄广花 米得洗

Orophea anceps Pierre

大新、龙州、靖西、东兰。

茎皮纤维可造纸，代麻。木材供细工用。

斜脉暗罗 九层皮

Polyalthia plagioneura Diels

龙州、大瑶山、大苗山。

茎皮纤维可造纸，代麻。木材供细工用。

光叶紫玉盘

Uvaria boniana Fin. et Gagn.

十万大山、苍梧、昭平。

刺果紫玉盘

U. calamistrata Hance

横县、陆川。

那大紫玉盘

U. macclurei Diels

龙州、隆林、天峨。

紫玉盘 酒饼子

U. macrophylla Roxb. var. *microcarpa*

(Champ.) Fin. et Gagn.

(*U. microcarpa* Champ.)

陆川、博白、北流、贵县、岑溪、苍梧、藤县、贺县、十万大山、宁明、龙州、平果、田阳、河池。

花紫红色，可供庭园栽植。叶可制酒饼。果可食。

越南紫玉盘 乌藤、扣匹

U. tonkinensis Fin. et Gagn.

龙州。

11 樟 科 LAURACEAE

尖叶黄肉楠☆ 尖叶六驳

Actinodaphne acuminata Meissn.

苍梧、十万大山、凌云、大苗山、龙胜、全州。

红果黄肉楠☆ 红果楠

A. cupularis (Hemsl.) Gamble

(*Litsea cupularis* Hemsl.)

龙胜。

毛黄肉楠 毛六驳、茶胶树、阿婆胶、胶木、刨花树

A. pilosa (Lour.) Merr.

(*A. cochinchinensis* Meissn.)

合浦、十万大山、博白、容县、岑溪、南宁、宁明、龙州。

木材刨成薄片，泡水后得透明粘液，可供粘布、粘鱼网、作造纸胶和作发胶用。叶可治跌打。

滇印琼楠

Beilschmiedia assamica Nees

十万大山。

圆果琼楠

B. balansae H.Lec.

十万大山。

短序琼楠

B. brevipaniculata Allen

十万大山、贺县。

广东琼楠

B. fordii Dunn

武鸣、永福、大苗山。

木材可供建筑、车辆、枕木、家具用。

糠秕琼楠

B. furfuracea Chun ex H.D.Chang

十万大山。

二色琼楠

B. intermedia Allen

(*B. discolor* Allen,

B. grandiosa Allen)

十万大山、宁明。

木材可作梁、柱、桁、板和较好的家具。

长果琼楠☆

B. longicarpa Chun et S.Lee, ined.

田阳。

瘤果琼楠

B. muricata H.D.Chang

十万大山。

倒卵叶琼楠

B. obovalifolia H.Lec.

十万大山。

种子油供工业用。

隐脉琼楠

B. obscurinervia H.D.Chang

十万大山。

厚叶琼楠

B. percoriacea Allen

陆川、大瑶山、扶绥、宁明。

纸叶琼楠

B. pergamentacea Allen

(*B. atrata* Allen)

十万大山。

稠琼楠

B. roxburghiana Nees

(*B. fagifolia* Nees)

大瑶山、龙州。

网脉琼楠

B. tsangii Merr.

苍梧、蒙山。

滇琼楠

B. yunnanensis Hu

那坡、大瑶山、容县天堂山。

无根藤 无头藤

Cassytha filiformis L.

玉林、容县、贵县、梧州、邕宁、南宁、崇左、龙州、十万大山等地。

全株化湿消肿，通淋利尿；治肾炎水肿，尿路结石，尿路感染，跌打，疔肿，湿疹。全株作造纸糊料。

Cinnamomum

毛桂 山桂皮、香桂子

Cinnamomum appelianum Schewe

全州、兴安、龙胜、临桂、灵川、永福、大苗山、凌云、大明山、苍梧。

树皮可代肉桂。木材作一般用材。造纸糊料。

阴香 小桂皮

C. burmanni (Nees) Bl.

(*C. pedunculatum* auct. plur., non Nees)

玉林、梧州、南宁、柳州、桂林等地区。

树皮祛风止痛；治寒性胃痛，腹泻，风湿腰腿痛，跌打，疮疖。

根、树皮、叶可提芳香油。种子可榨脂肪油，供制肥皂等。木材适作细工用材。绿化树种，可作行道树等。可作肉桂砧木。

硬叶樟 米槁、米瓜、沟厚(均壮音)

C. calcarea S.Lee, ined.

大新、龙州、靖西、那坡、平果、凌云、都安、河池、阳朔。

材质坚硬，供建筑，板材作家具用。

樟树

C. camphora (L.) Sieb.

区内各地。

根、皮、叶祛风散寒，消肿止痛，开窍辟秽；治风湿腰腿痛，扭挫伤，感冒头痛，胃寒腹痛。木材、根、叶可蒸取樟脑和樟油，是医药(中枢神经兴奋剂)、化工、香料、防腐原料。种子油可代椰子油，制高级肥皂。树皮和叶可提栲胶。叶为樟蚕饲料和土农药。材质优良，供建筑、车、船、家具、乐器等用。优良绿化树种，公路树种。

*肉桂 筒桂

C. cassia (Nees) Nees et Eberm. ex Bl.

梧州、玉林、钦州、南宁等地区、大瑶山、临桂、桂林。

树皮加工即肉桂，温中补肾，散寒止痛；治腰膝冷痛，虚寒胃痛，慢性消化不良，腹痛吐泻，受寒经闭。嫩枝即桂枝，发汗解肌，温通经脉；治外感，风寒，肩臂肢节酸痛，桂枝煎剂对金黄色葡萄球菌、伤寒杆菌和人型结核杆菌有显著抗菌作用。果实(桂子)治虚寒胃痛。肉桂油祛风健胃；治风湿，皮肤搔痒。枝、叶、果、花梗可蒸取桂油，为合成桂酸等重要香料的原料，亦为香烟和巧克力配料以及其他日用品香料，工业原料。叶研粉，可制熏香原料。

云南樟

***C. glanduliferum* (Wahl.) Nees**

大明山、大瑶山。

枝、叶可提取樟脑和樟油，是医药、化工、香料、防腐等重要原料。木材是很好的建筑、家具用材。种子脂肪油供工业用。

八角樟

***C. ilicioides* A.Chev.**

十万大山、凌云。

野黄桂

***C. jensenianum* H.-M.**

龙胜、大苗山。

嫩叶可代茶。

海南樟

***C. liangii* Allen**

龙州、大苗山。

钝叶樟

***C. obtusifolium* Nees**

靖西、龙州、武鸣、大瑶山。

叶、根、皮可蒸取芳香油。木材供建筑用。

黄樟

C. parthenoxylon (Jack) Nees

十万大山、百色、罗城、融安、大苗山、大瑶山、灌阳、阳朔、贺县、容县。

叶、根、皮、木材可蒸取芳香油，是重要香精原料。种子含脂肪油，供工业用。叶可饲养天蚕和作土农药。木材是优良家具材。

越桂樟

C. simondii H Lec.

十万大山、龙州。

粗脉樟

C. validinerve Hance

十万大山、宁明。

川桂

C. wilsonii Gamble

乐业、罗城。

树皮补肾，散寒祛湿；治风湿筋骨痛，跌打，腹痛吐泻。树皮、枝、叶、果可蒸取芳香油。

厚壳桂

Cryptocarya chinensis (Hance) Hemsl.

苍梧、大瑶山、桂林。

木材轻软致密，供建筑、家具用，又是枕木、杆柱上等木料。

平阳厚壳桂

C. chingii Cheng

苍梧、蒙山、贺县、富川、十万大山、大明山、宁明、龙州、大瑶山、大苗山、三江、阳朔、永福、临桂、龙胜、灵川、恭城。

木材可作建筑、门、窗和一般家具用材；刨片浸水所得粘液，可作发胶。叶含樟油。

黄果厚壳桂 香港厚壳桂

C. concinna Hance

钦州、十万大山、宁明、大明山、大瑶山、苍梧。

木材坚硬耐湿，可供建筑，制家具、桶、架等。

丛花厚壳桂

C. densiflora Bl.

合浦、钦州、十万大山、靖西、大瑶山、罗城。

木材可作建筑、车辆、家具和桁板等用材。

海南厚壳桂

C. hainanensis Merr.

龙州、那坡、田林、隆林、天峨。

白背厚壳桂 白叶厚壳桂

C. maclurei Merr.

(*C. merrilliana* Allen)

十万大山、大瑶山。

狭叶山胡椒

Lindera angustifolia Cheng

临桂。

叶含芳香油，可供食品、肥皂等日用品香精用。果核脂肪油，供工业用。

尾叶山胡椒 尾叶钓樟

L. caudata Benth.

十万大山、宁明、田林、凌云。

枝、叶、鲜果可提芳香油。种子油供工业用。

鼎湖钓樟☆ 白胶木、耙齿钩、木香子

L. chunii Merr.

十万大山、陆川、容县、苍梧、贺县。

Lindera

根可代乌药，止痛消肿，行气健胃；治跌打，风湿骨痛，胃肠胀气。根亦供香料用，又可提取淀粉。

香叶树

L. communis Hemsl.

桂林地区、大苗山、柳城、柳州、大瑶山、贵县、苍梧、梧州、岑溪、贺县、大明山、扶绥、十万大山、钦州等地。

果、叶含芳香油，可提取香精。枝、叶研粉，可作熏香。种子油可制肥皂、油墨等。木材供家具、细工等用。

网叶山胡椒 网脉钓樟

L. dictyophylla Allen

凌云。

红果山胡椒 红果钓樟

L. erythrocarpa Mak.

临桂、兴安、全州。

矮香叶树

L. fruticosa Hemsl.

(*Litsea fruticosa* Gamble)

龙胜。

叶可提芳香油，供调制香料、香精用。种子油供工业用。

峨眉山胡椒☆

L. gambleana Allen

山胡椒 见风消、见风干

L. glauca Bl.

全州、资源、兴安、龙胜、临桂、桂林、大苗山、罗城、南丹。

鲜叶和果皮含芳香油，可供肥皂香精等用。种子油可供制皂等用。叶入药，祛风消肿。根、枝、叶可作兽药。枝、叶可作造纸糊料。

尖叶乌药

L. hemsleyana (Diels) Allen

(**L. strychnifolia F.-Vill.**

var. hemsleyana Diels)

南丹、凌云、乐业、那坡。

广西山胡椒 广西钓樟、唆拷

L. kwangsiensis Chun

龙州、靖西、那坡。

果可提取芳香油。种子油供工业用。

广东山胡椒 广东钓樟、猪母楠

L. kwangtungensis (Liou) Allen

十万大山、宁明、大明山、容县、苍梧、大瑶山、大苗山、环江、永福、临桂、龙胜。

种子油可供制香皂、油墨等用。叶、果可提芳香油。木材造作建筑、水工、桩木、桥梁、造船等用。

龙胜钓樟☆

L. lungshengensis S. Lee, ined.

龙胜。

黑壳楠

L. megaphylla Hemsl.

全州、兴安、临桂、灵川、永福、阳朔、乐业、大瑶山。

果、叶含芳香油。种子油是香皂的优良原料。木材供建筑、造船和制优良家具用。

山钓樟

L. metcalfiana Allen

十万大山、大明山、龙州、田林、隆林、凌云、大瑶山、大苗山、临桂、永福。

Lindera

华南山胡椒

L. nacusua (D. Don) Merr.

(*L. bifaria* Benth. ex Hk. f.)

容县、大瑶山、灵川七分山。

小叶钓樟 吹风散

L. playfairii (Hemsl.) Allen

(*Litsea playfairii* Hemsl.,

Neolitsea playfairii (Hemsl.) Chun,

Litsea alongensis Lec.)

灵山、钦州、合浦、北海、博白、陆川、玉林、梧州。

种子油可供制皂、印色油、鞣皮用油等用。鲜果皮含芳香油。

粉背山胡椒☆

L. prattii Gamble

龙胜。

美丽山胡椒 美丽钓樟

L. pulcherrima (Wall.) Hk. f.

龙胜。

尾叶美丽山胡椒 香粉叶、尾叶美丽钓樟

L. pulcherrima (Wall.) Hk. f.

var. *attenuata* Allen

全州、资源、兴安、龙胜、临桂、灵川、大苗山、东兰、乐业、
贺县、容县。

山姜

L. reflexa Hemsl.

全州、资源、兴安、龙胜、凌云。

种子油可供工业用。枝、叶可驱蚊。

凌云山胡椒☆

L. stewardiana Allen

靖西、田林、凌云、大苗山、大瑶山。

乌药

L. strychnifolia F.-Vill.

梧州、陆川、博白、玉林、南宁等地。

根祛风止痛，消肿散瘀；治胸腹胀痛，风湿性腰腿痛，跌打外伤，充血性头痛，寒疝阴囊肿痛，小便频数。又治牛臃胀症。

果、根、叶含芳香油，可作调配皂用香精等原料。种子油供制皂等用。根、种子研粉作农药，可防治地下害虫、蚜虫、小麦叶锈病，马铃薯晚疫病。

三股筋香

L. thomsonii Allen

那坡。

枝、叶、果含芳香油，可作皂用香精等用。种子油可供制皂等用。

越南山胡椒

L. tonkinensis H.Lec.

十万大山、宁明、龙州、那坡。

尖脉木姜

Litsea acutivena Hay.

十万大山。

黑木姜

L. atrata S.Lee

大瑶山、扶绥、龙州、隆林。

大萼木姜

L. baviensis H.Lec.

(*L. maclurei* Merr.)

大瑶山、隆林。

木材干燥后少开裂，不变形，适作家具及细工用材。种子油可制肥皂。

木姜子 山鸡椒、山苍子、鸡骨香、豆豉姜

L. cubeba (Lour.) Pers.

区内各地。

全株供药用，祛风散寒，行气止痛；治外感头痛，风湿骨痛，跌打，胃痛。果可治血吸虫病。果、叶、花可提山苍子油，是香料和医药工业原料。子榨油治牛癣，根治牛痢。种子油可供制皂等用。油麸可作肥料。枝、叶可提造纸糊料。研粉，可作蚊香原料。叶水煮液作农药，可防治稻螟和棉蚜。

毛叶木姜 黄亮楠、红刨楠

L. elongata (Wall. ex Nees) Benth. et Hk. f.

区内各地。

木材供建筑、水工、造船、车辆、家具等用。种子油供工业用。

驱蚊树 清香木姜子、水苍树

L. euosma W.W.Sm.

全州、灌阳、龙胜、灵川、临桂、大苗山、大瑶山、罗城、龙州、十万大山、贺县。

果祛寒止痛，顺气止呕；治胃寒痛，呕吐，疝气痛。果可提芳香油，供作皂用、食用香精原料，又可驱蚊。

潺槁树 潺槁木姜、山槁树、胶木(潺音蝉)

L. glutinosa (Lour.) C.B. Rob.

博白、玉林、灵山、十万大山、邕宁、大新、宁明、凭祥、龙州、田阳、德保、大瑶山、柳城。

根、皮、叶散瘀消肿止痛；治跌打损伤，疮疖。根皮粘性大，可作粘合剂和赋形剂。木材可作家具；刨成薄片，浸出粘液，可

作发胶。种子油可代椰子油，制高级肥皂等用。

白野槁树

L. glutinosa (Lour.) C.B.Rob.

var. *brideliifolia* (Hay.) Merr.

钦州、百色。

用途参阅潺槁树。

华南木姜☆

L. greenmaniana Allen

大苗山。

鼠刺木姜

L. iteodaphne (Nees) Hk f.

forma *chinensis* Allen

东兴、十万大山、邕宁、扶绥、宁明、龙州、大明山、大瑶山。

大果木姜

L. lancilimba Merr.

十万大山、大明山、容县、大苗山。

木材可供板材、家具、建筑等用。种子油供工业用。

资源木姜☆

L. merrilliana Allen

兴安、灵川、龙胜、资源、大苗山、大瑶山、罗城。

柿叶木姜

L. monopetala (Roxb.) Pers.

(*L. polyantha* Juss.)

博白、大明山、龙州、凭祥、那坡、靖西、德保、田林、隆林、河池、罗城、融水、大瑶山。

木材可制家具。紫胶虫寄主植物。

少脉木姜

L. oligophlebia H.T.Chang

钦州。

竹叶木姜☆

L. pseudoelongata Liou

宁明。

豺皮木姜

L. rotundifolia (Nees) Hemsl.

龙州、大新、博白。

椭圆豺皮木姜 豺皮樟

L. rotundifolia (Nees) Hemsl.

var. *oblongifolia* (Nees) Allen

(*L. chinensis* Bl.,

Actinodaphne chinensis Nees)

钦州、灵山、十万大山、博白、玉林、苍梧、藤县、贺县。

根祛风除湿，行气止痛；治风湿关节炎，胃痛。果、叶含芳香油。种子油可代椰子油，供制高级肥皂及印刷油等用。

黄椿木姜 大烂花

L. variabilis Hemsl.

十万大山、大明山、宁明、龙州、田阳、大瑶山。

木材供建筑、家具用。

槁树 轮叶木姜、过山风

L. verticillata Hance

东兴、十万大山、陆川、博白、北流、容县、贵县、藤县、岑溪、苍梧、大瑶山、桂林。

根祛风除湿；治风湿关节炎，腰腿痛，跌打，蛇伤。

短序润楠(注) 狭叶楠、狭叶香港楠

Machilus breviflora (Benth.) Hemsl.

十万大山、隆林、东兰、南丹。

猪脚楠

M. cathayensis Chun ex H.D.Chang

田阳、大苗山、灵川、临桂。

木材供建筑、家具等用。

华润楠 香港楠木、华桢楠

M. chinensis (Champ.) Hemsl.

(*Alseodaphne chinensis* Champ.)

玉林、大明山。

木材可供建筑、造船、板料、家具等用。

基脉润楠

M. decursinervis Chun

大瑶山、灵川、大苗山。

蒙国润楠

M. gracillima Chun

南丹、大瑶山。

华东润楠

M. leptophylla H.-M.

灵川、临桂、全州、大苗山、大瑶山。

木材供建筑等用。种子油供工业用。

注：过去将桢楠归入 *Machilus* 属，故叫桢楠属。但桢楠 现已归入楠属(*Phoebe*，也叫桢楠属)，为避免两属 属名混淆，现采纳以润楠属为 *Machilus* 的属名，以楠属(桢楠属)为 *Phoebe* 的属名。

两广润楠

M. liangkwangensis Chun

苍梧、大瑶山、扶绥、田阳、隆林。

灵川润楠☆

M. lichingii Chun, ined.

灵川七分山、龙胜。

长梗润楠

M. longipedicellata H. Lec.

龙胜、贺县。

多脉润楠

M. multinervia Liou

龙州。

纳槁润楠

M. nakao S. Lee

扶绥、陆川。

建楠

M. oreophila Hance

灵川。

赛短序润楠

M. parabreviflora H. T. Chang

东兴、十万大山。

刨花润楠 泡花、泡花楠

M. pauhoi Kaneh.

宜山、扶绥。

木材刨成薄片浸水，可得粘液，可用作粘合剂。木材供建筑、家具等用。种子油可制皂、烛；油麸可作肥料。

孔雀润楠

M. phoenicis Dunn

大瑶山、宁明。

扁果润楠

M. platycarpa Chun

兴安、东兴、十万大山。

柳叶润楠 柳楠

M. salicina Hance

东兴、十万大山、大瑶山、大苗山、罗城、龙胜、兴安、全州、
灵川、临桂、永福等地。

可作固堤树种。

十万大山润楠

M. shiwandashanica H T.Chang

十万大山。

红润楠 红楠

M. thunbergii S. et Z.

大苗山、容县。

木材供建筑、家具用。叶可提芳香油，又可浸汁取胶料。树皮可
提栲胶。种子油可制肥皂及润滑油等用。

绒润楠 绒楠

M. velutina Champ.

博白、合浦、十万大山、大瑶山、大苗山、龙胜、兴安、桂林、
临桂、阳朔、昭平等地。

木材可制家具。种子油可作润滑油等用。

信宜润楠☆

M. wangchiana Chun

东兴、十万大山、容县、凌云、罗城。

云南润楠

M. yunnanensis H.Lec.

隆林。

海南新樟

Neocinnamomum hainanense Allen

龙州、扶绥。

新木姜子

Neolitsea aurata (Hay.) Merr.

大瑶山、大苗山、龙胜、兴安、资源、全州。

大新木姜

N. chunii Merr.

容县、苍梧、贺县、恭城、阳朔、永福、灵川、临桂、龙胜、

大苗山、大瑶山、大明山、宁明、龙州、十万大山、隆林。

种子油可供制皂等用。

香果新木姜

N. ellipsoidea Allen

灵川、大苗山。

根治刀伤。种子油可作制皂、油墨等原料。木材宜作高级家具、

胶合板、门板、乐器。

锈叶新木姜

N. ferruginea Merr.

十万大山、宁明、大明山、容县、苍梧、贺县、大瑶山、永福、

恭城、全州。

香港新木姜 辣鸡树

N. hongkongensis (Chun) Allen

(*Actinodaphne hongkongensis* Chun,

N. cambodiana Lec. var. *glabra* Liou)

大明山、百色、东兰、南丹、大苗山。

广西新木姜

***N. kwangsiensis* Liou**

凌云、贺县、大明山。

假肉桂

***N. levinei* Merr.**

容县、贺县、蒙山、临桂、灵川、兴安、龙胜、全州、大瑶山、
大苗山、凌云、那坡、隆林。

木材可造家具等。

长圆叶新木姜

***N. oblongifolia* Merr. et Chun**

宁明。

显脉新木姜

***N. phanerophlebia* Merr.**

十万大山、那坡、隆林金钟山、武鸣、玉林大容山、大瑶山、
大苗山、永福。

光叶显脉木姜

***N. phanerophlebia* Merr.**

forma glabra Liou

钦州、十万大山、大明山、宁明、大新、龙州、德保、大瑶山。
木材作水工、枕木、桩木、桁条、板料、家具等用。

美新木姜

***N. pulchella* (Meissn.) Merr.**

(*Litsea pulchella* Meissn.,

***L. zeylanica* Nees**

var. *chinensis* Benth.)

Neolitsea-Pseudosassafras

十万大山、宁明、大瑶山、永福。

种子油可代椰子油，制高级肥皂等用。

小新木姜

N. umbrosa (Meissn.) Merr.

十万大山、龙州、宁明、隆林金钟山、大瑶山、大苗山、永福、灌阳、龙胜。

***鳄梨 油梨、樟梨**

Persea americana Mill.

桂林、南宁。

果营养价值高，供生食和作蔬菜，果肉又可榨油供食用、医药用。

楠木 兴安楠木

Phoebe blepharopus H.-M.

兴安、大苗山。

木材材质优良，供建筑和高级家具等用。木屑可作熏香。

广西楠

P. kwangsiensis Liou

桂黔交界山区。

白楠

P. neurantha (Hemsl.) Gamble

大苗山、凌云、田林。

紫楠

P. sheareri (Hemsl.) Gamble

全州、资源、兴安、龙胜、临桂、富川。

根、枝、叶可提芳香油。种子油可供制皂等用。木材优良，供上等家具等用。

檫木 半枫樟

Pseudosassafras tzumu (Hemsl.) H.Lec.

(*Sassafras tzumu* Hemsl., 1911)

Pseudosassafras laxiflora Nakai)

兴安、龙胜、融安、大苗山、大瑶山、隆林、大明山、贺县。

根、树皮活血散瘀；治扭挫伤，腰肌劳损。材质优良，用于造船、水车、上等家具等。种子和根含芳香油。

山油樟

Syndiclis montana Chun et S. Lee, ined.

十万大山、那坡。

13A 青 藤 科 ILLIGERACEAE

心叶青藤

Illigera cordata Dunn

隆林、天峨、龙州、上林、贵县、桂平、平南、容县、北流、岑溪、苍梧。

根、茎驱风除湿，散瘀止痛；治风湿骨痛，跌打。

贵州青藤☆

I. dunniana Lévl.

那坡、田林、凌云。

小花青藤 黑九牛

I. parviflora Dunn

十万大山、宁明、龙州、马山、平南、容县、大瑶山、大苗山、河池、临桂。

根驱风除湿；治风湿骨痛。

大青藤

I. platyandra Dunn

(*I. yaoshanensis* Hao)

Illigera-Aconitum

容县、大瑶山、龙州、西林、隆林。

毛青藤

I. rhodantha Hance

博白、容县、十万大山、扶绥、宁明、龙州、那坡、靖西、
田阳、百色、田林、凤山、都安、柳城、阳朔。

14 肉豆蔻科 MYRISTICACEAE

风吹楠 霍而飞

Horsfieldia amydalina (Wall.) Ward.

东兴、宁明、崇左、龙州。

木材轻软，可作家具。

海南风吹楠☆ 海南霍而飞

H. hainanensis Merr.

东兴、宁明、龙州、靖西、田林、巴马。

*肉豆蔻 肉果、玉果

Myristica fragrans Houtt.

著名香料和药物，治虚泻冷痢，脘腹冷痛，呕吐。广东有引种，
我区可考虑试种。

15 毛茛科 RANUNCULACEAE

乌头 川乌、附子

Aconitum carmichaeli Debx.

灵川、临桂、资源、全州；亦有栽培。

根有毒，温中回阳，散寒止痛；治风寒湿痹，关节疼痛，心腹冷
痛，浮肿尿少；根磨酒外敷治鸡眼。

草乌

A. chinensis Paxt.

var. *bodinieri* (Lévl. et Van.)

W.T.Wang et Hsiao, ms.

根有毒，祛风湿，止痛；治风湿痛，神经痛。

打破碗花花 野棉花

***Anemone hupehensis* Lemoine**

全州、资源、兴安、龙胜、大苗山、南丹、凤山、都安、乐业、靖西。

全株有小毒，可杀虫；新鲜茎、叶除四害，杀蛆虫和农业害虫；又治顽癣、疥癣，痢疾。

溪畔银莲花 五倍叶

***A. rivularis* Buch.-Ham.**

隆林、西林、靖西、乐业。

全株供土农药用。根治狗咬伤。

野棉花

***A. vitifolia* Buch.-Ham.**

那坡。

全株供土农药用。根杀虫；治痢疾。

鸭脚黄连

***Asteropyrum cavaleriei* (Lévl. et Van.)**

Drumm et Hutch.

全州、资源、兴安、龙胜。

根清热解毒；治痢疾。

茜芹美花草

***Beesia calthaefolia* (Maxim.) Ulbrich**

(*Cimicifuga calthaefolia* Maxim.,

***Beesia cordata* Balf.f. et W.W.Sm.)**

全州宝顶山。

Clematis

芹叶铁线莲 女娄

Clematis apiifolia DC.

全州、临桂。

有毒植物。茎、叶消食止痢；治肠鸣，泄痢。根皮及茎皮为人造棉及造纸原料。

钝齿芹叶铁线莲

C. apiifolia DC.

var. *obtusidentata* R. et W.

全州、资源、兴安、龙胜、临桂、永福、大苗山、大瑶山、东兰、乐业、武鸣。

有毒植物。茎、叶消食止痢；治肠鸣泄痢。

黄藤通

C. argentea (Lévl. et Van.) R. et W.

(*C. grata* Wall.

var. *argentea* Lévl. et Van.)

临桂、大苗山、那坡。

茎、叶杀虫解毒；治痈疮溃疡。

山木通 小木通

C. armandi Fr.

临桂、柳城、柳州、凌云、乐业、上林。

根止痛活血；治跌打劳伤。

类山木通☆

C. armandi Fr.

var. *biondiana* (Paval.) Rehd.

扶绥。

香铁线莲☆

C. buehneriana DC.

那坡、乐业。

威灵仙 铁脚威灵仙

C. chinensis Osb.

区内各地。

根、藤通经络，祛风湿，行气利尿；治跌打，风湿痛，腰背酸痛，小便不利，骨哽咽喉；亦可作土农药，除四害。

百色威灵仙☆

C. chingii W.T.Wang

百色、桂林。

厚叶铁线莲

C. crassifolia Benth.

兴安、大瑶山、十万大山。

粗柄铁线莲

C. crassipes Chun et How

龙州。

丝铁线莲

C. filamentosa Dunn

龙胜。

拟威灵仙☆

C. finetiana Lévl. et Van.

柳城、宜山。

铁线莲

C. florida Thb.

乐业、阳朔、临桂、桂林、梧州。

根通经络，解毒；治痛风，虫蛇咬伤。

小叶铁线莲

C. gouriana Roxb.

Clematis

百色、阳朔、富川、钟山。

贵州有将此种代木通用。

毛叶铁线莲

C. gratopsis W.T.Wang

(*C. grata* Wall.

var. *lobulata* R. et W.)

临桂、南丹、大瑶山。

宜昌铁线莲☆

C. henryi Oliv.

隆林、灵川、龙胜、资源、贺县。

根祛风止痛；治风湿痛。

金盏藤 齿叶铁线莲

C. leschenaultiana DC.

恭城、灵川、临桂、阳朔、融安、百色。

细齿金盏藤 毛齿叶铁线莲

C. leschenaultiana DC.

var. *denticulata* Merr.

三江、大瑶山、百色。

菝葜叶铁线莲

C. loureiriana DC

大明山、百色。

毛柱铁线莲 老虎须藤

C. meyeniana Walp.

钦州、南宁、玉林、梧州、柳州、桂林等地区。

茎皮纤维供造纸，搓绳。根、茎散瘀消肿；治跌打。

沙叶毛柱铁线莲

C. meyeniana Walp.

var. *granulata* Fin. et Gagn.

容县、玉林、大瑶山、龙州。

山铁线莲 川木通、花木通

C. montana Buch.-Ham.

兴安。

茎利水清热，降火通乳；治肾病水肿，湿热淋症，尿急尿频，妇女经闭，乳汁不通。

苦瓜藤通

C. parviloba Gardn. et Champ.

大瑶山、靖西。

似小叶铁线莲☆

C. peterae H.-M.

桂林。

老虎须 千斤藤、淮木通

C. uncinata Champ. ex Benth.

区内各地。

根祛风止痛；治风湿骨痛。

尾叶铁线莲

C. urophylla Fr.

大瑶山、那坡。

*飞燕草

Consolida ajacis (L.) Schur

(*Delphinium ajacis* L.)

栽培花卉。

有毒；家禽食之能致命；种子催吐，泻下。

Coptis-Dichocarpum

黄连

Coptis chinensis Fr.

全州、大苗山。

根茎清热泻火，解毒，抗菌；治热性病，发热、菌痢、赤眼肿痛，热疖疮毒、烧伤。

短萼黄连

C. chinensis Fr.

var. *brevisepala* W.T.Wang et Hsiao

兴安、龙胜、富川、钟山、大瑶山、凌云、田林。

功能、主治参阅黄连。

走茎黄连

C. chinensis Fr.

var. *stolonifera* D.Fang et N.K.Liang ined.

临桂、龙胜、兴安、资源。

功能、主治参阅黄连。

野彩雀 还亮草

Delphinium anthriscifolium Hance

兴安、临桂、天峨、梧州、融安。

蕨叶人字果

Dichocarpum dalzielii (Drumm. et

Hutch.) W.T.Wang et Hsiao

(*Isopyrum pteridifolium* H.-M.,

I. flaccidum Ulbs.)

全州、兴安、龙胜、临桂、灵川、大瑶山、贺县。

根消肿散毒；治红肿疮毒。

小花人字果

D. franchetii (Fin. et Gagn.)

W.T.Wang et Hsiao

(*Isopyrum franchetii* Fin. et Gagn.)

龙胜。

拿拉藤 锡兰莲

Naravalia pilulifera Hance

大新、宁明、龙州、百色。

根行气止痛。茎、叶治刀伤。

芍药 白芍

Paeonia lactiflora Pall.

栽培。

根养血敛阴，柔肝止痛；治月经不调，痛经，泻痢腹痛，肝旺头痛。栽培花卉。

小回回蒜 梅花草、鬍子草、自扣草

Ranunculus cantoniensis DC.

武鸣、百色、隆林、凌云、东兰、天峨、大瑶山、龙胜、临桂、桂林。

全草有毒，去鬍，截疟，杀虫；外敷治角膜翳，疟疾。又可灭蛆虫和子孓。

华毛茛

R. chinensis Bunge

田阳、隆林。

毛茛 小梅花草

R. japonicus Thb.

梧州、南宁、百色、河池、柳州、桂林地区。

全株有毒，皮肤发泡药，外敷治疟疾。全草可作土农药杀稻螟、蚜虫和蚊、蝇幼虫。

石龙芮

R. scleratus L.

凌云。

Ranunculus-Thalictrum

种子、根皮含白头翁素，治风寒湿痹，恶疮痈肿。

半匍匐毛茛☆

R. sieboldii Miq.

桂林。

有毒。

猫爪草 小毛茛

R. zuccarinii Miq.

(*R. ternatus* Thb.)

恭城、灵川、临桂、桂林、阳朔、融安。

根去火，散痰结；治淋巴腺结核，急性结合膜炎。

天葵 夏无踪、老鼠屎

Semiaquilegia adoxoides (DC.) Mak.

临桂、柳州。

有小毒，块根散结消肿；治淋巴结核，疣子。

尖叶唐松草

Thalictrum acutifolium (Boivin) H.-M.

全州、龙胜、大苗山。

根含小蘗碱，代黄连用。

盾叶唐松草 连钱草

T. ichangensis Lecoyer ex Oliv.

临桂。

全草清湿热，散风寒；治腹痛泻痢，头昏目痛，身发黄。

多枝唐松草

T. ramosum Boivin

凤山。

唐松草

T. umbricola Ulbr.

(*T. guegenii* Boivin)

大瑶山、灵川。

17 金鱼藻科 CERATOPHYLLACEAE

金鱼藻

Ceratophyllum demersum L.

各地水塘中。

作饲养热带鱼、金鱼及其他鱼用。

18 睡莲科 NYMPHAEACEAE

芡

Euryale ferox Salisb.

常生于湖沼、池塘中。

根茎、种仁可食，种子名芡实，健脾益肾，镇痛收敛；治慢性泄泻，小便失禁，遗精，带浊，腰腿关节痛。

*莲荷

Nelumbo nucifera Gaertn.

栽培作物。

地下茎（莲藕）供食用并可提淀粉。藕节止血；治吐血，衄血等出血。种子（莲子）健脾止泻；治脾虚食少。种胚（莲心）清心火，去火除烦。雄蕊（莲须）止血固精；治遗精，白带。花托（莲蓬）消瘀止血；治妇女血崩，尿血等。荷叶消暑解热；治夏、秋暑热。荷花可供观赏。

萍蓬草 水面一盏灯

Nuphar pumilum Smith

临桂、资源。

根、茎调经，止痛；治月经不调，腰腿痛。

19 小 藥 科 BERBERIDACEAE

苗山小藥

Berberis impedita Schneid.

大苗山。

蚝猪刺

B. julianae Schneid.

龙胜、临桂、兴安、灌阳、资源、象州、大瑶山。

根、茎含小蘗碱、非洲防已碱等，清热解毒，抗菌；治菌痢，胃肠炎，扁桃腺炎。

小蘗

B. mingerensis Hay.

大瑶山、罗城、全州。

白粉小蘗

B. pruinosa Fr.

罗城、大苗山、龙胜。

刺黄连

B. virgetorum Schneid.

兴安。

根、茎清热解毒抗菌；治菌痢，胃肠炎。

八角莲

Dysosma chengii (Chien) Keng f.

(*Podophyllum chengii* Chien)

富川、贺县、资源。

功能、主治参阅毛八角莲。

毛八角莲 独脚莲、八角莲

D. hispida (Hao) Chun

(Podophyllum hispida Hao)

大瑶山、大苗山。

地下茎散瘀消肿，止痛；治跌打，筋骨疼痛，蛇伤，痈疖，恶疮及枪伤。

六角莲 八角莲、花叶八角莲

D. pleiantha (Hance) Woods.

(Podophyllum pleianthum Hance,

P. veitchii Hemsl. et Wils.,

P. versipelle Hance)

玉林、容县、富川、贺县、大瑶山、临桂、灵川、兴安、龙胜、全州、资源、凌云、乐业、德保。

功能、主治参阅毛八角莲。

箭叶淫羊藿

Epimedium sagittatum

(S. et Z.) Maxim.

临桂、龙胜、资源、全州。

全株补精壮阳，祛风除湿；治阳痿，目眩耳鸣，腰痛。

阔叶十大功劳 乌不宿

Mahonia bealei Carr.

兴安、龙胜、全州、灵川、临桂、桂林、资源、阳朔、昭平、凤山、靖西、凌云、乐业。

根、茎含小檗碱，可作黄连代用品。

十大功劳

M. fordii Schneid.

龙胜、天峨。

根、茎可作黄连代用品。

细叶十大功劳 土黄连

M. fortunei Mouill.

兴安、临桂、马山、隆林。

根、茎清热解毒抗菌；治火眼，菌痢，水火烫伤，枪伤，预防流感；可作黄连代用品。

北江十大功劳☆

M. shenii Chun

兴安、阳朔、富川、钟山、贺县、罗城、大苗山、大瑶山。

根、茎功能、主治参阅上种。

半覆瓦十大功劳

M. subimbricata Chun et F.Chun

靖西。

南天竹

Nandina domestica Thb.

全州、临桂、桂林、柳城、柳州、罗城、南丹、隆林、马山。

根、茎、叶解热镇咳；治感冒，支气管炎，咳嗽；果镇咳，但有毒，服用宜慎。

21 木 通 科 LARDIZABALACEAE

三叶木通

Akebia trifoliata (Thb.) Koidz.

(*A. lobata* Decne.)

凌云、乐业、南丹、临桂、龙胜、兴安、资源、全州。

果叫预知子，可食和酿酒；入药，利尿通乳，催生，杀虫；主治小便不利，水肿，亦治难产，乳汁不通，月经痛，腰痛。藤可代绳，入药舒筋活络；治风湿关节痛。种子可榨脂肪油。

甜果木通 八月瓜、预知子

A. trifoliata (Thb.) Koidz.

var. *australis* (Diels) Rehd.

隆林、罗城、大瑶山、平乐、临桂、兴安、龙胜、资源、全州、
富川、钟山。

用途参阅三叶木通。

大酸藤

Stauntonia alata Merr.

大瑶山、平南、蒙山、德保。

短药野木瓜

S. brachyanthera H.-M.

龙胜。

西南野木瓜

S. cavaleriense Gagn.

大苗山、龙胜、兴安、全州、临桂、永福、昭平。

野木瓜 假荔枝

S. chinensis DC.

大瑶山、大苗山、永福、临桂、兴安、恭城、龙胜、资源、全州。

果味甜，可生食和制果酱、酿酒。种子可榨油。

瑶山野木瓜

S. dielsiana Wu

大瑶山。

椭圆野木瓜☆

S. elliptica Hance

荔浦、大苗山。

七姐妹藤 那藤、牛藤

S. hexaphylla Decne.

荔浦、临桂、龙胜、资源、大苗山、大瑶山、上思、梧州。
藤止痛；藤及根利尿。果可食。

假野木瓜

S. leucantha Wu

兴安、大苗山、大瑶山、大明山、那坡。

22 大血藤科 SARGENTODOXACEAE

大血藤 槟榔钻、大活血、红藤、血藤

Sargentodoxa cuneata (Oliv.) R. et W.

全州、资源、兴安、龙胜、大苗山、大瑶山、马山、那坡、
隆林、博白等地。

根、藤活血祛风，散瘀止痛，驱虫；治风寒湿痹，筋骨痛，经
痛，小儿惊风，疖肿。兽医治蚂蟥入牛鼻。茎皮为造纸等原
料。藤可供编织物和提栲胶。叶可杀孑孓。根、茎煎水可毒蚜虫。

23 防已科 MENISPERMACEAE

崖藤

Albertisia laurifolia Yamamoto

(*A. peryana* H.L.Li)

十万大山。

樟叶木防已

Cocculus laurifolius DC.

全州、桂林、阳朔、梧州、大新、龙州。

根散瘀消肿，祛风止痛；治风湿腰腿痛，跌打。

木防已 青藤、毛木防已

C. trilobus (Thb.) DC.

(*C. sarmentosus* (Lour.) Diels,

C. sarmentosus (Lour.) Diels

var. *pauciflorus* Wu,

C. mollis Wall.)

临桂、桂林、永福、罗城、隆林、龙州、凭祥、宁明、大明山。
全株祛风除湿，通经活络，利尿消肿；治筋骨酸软，腰膝冷痛，
肾病水肿，淋病，无名肿毒，蛇虫伤。藤坚韧柔软，可供编
物。茎皮纤维可作人造棉原料。根含淀粉，可酿酒。

毛叶轮环藤 金线风

Cyclea barbata (Wall.) Miers

苍梧、贵县、邕宁、桂林、临桂。
用途参阅百解藤。

密花轮环藤

C. densiflora (Yamamoto)

Y.C Tang et S.L.Lo

(*Paracyclea densiflora* Yamamoto)

桂南、隆林。

海南轮环藤

C. hainanensis Merr.

龙州大青山。

百解藤 粉叶轮环藤、山豆根、凉粉藤、金锁匙

C. hypoglauca (Schaner) Diels

区内各地。

根清热解毒，利咽镇痛，利水；治咽喉肿痛，牙痛，蛇虫伤，疔
疖，小便不利。叶可制凉粉。

轮环藤

C. racemosa Oliv.

隆林、灵川。

根顺气止痛，解毒；治发痧腹痛，胃痛，蛇伤。

四川轮环藤

C. sutchuenensis Gagn.

(*Paracyclea sutchuenensis* Yamamoto)

全州、兴安、龙胜、临桂、大瑶山。

广西轮环藤

C. sutchuenensis Gagn.

var. *sessilis* Wu

(*Paracyclea sutchuenensis* Yamamoto

var. *sessilis* (Wu) Yamamoto)

大瑶山。

花防已

Diplocclisia affinis (Oliv.) Diels

龙州。

老茎作兽药，治牛小便不利。茎可编家具、用具。

秤钩风

D. chinensis Merr.

兴安、田阳。

苍白秤钩风 茎花防已、粉绿秤钩风

D. glaucescens (Bl.) Diels

凌云、乐业、凤山、天峨、河池、柳城、兴安、龙胜、玉林、博白。

根茎解毒；治蛇伤效好。

藤黄连 黄藤

Fibraurea tinctoria Lour.

上思、宁明、龙州、崇左、大新、武鸣、上林、天等、马山、南

宁、靖西、凌云、乐业、大瑶山、平南、陆川、博白。

根、茎有小毒，清热解毒；治咽喉炎，结合膜炎，扁桃腺炎，疮

疖，烫火伤。延胡索乙素原料。

细红藤

Hypserpa nitida Miers

十万大山、龙州、富川、钟山、凌云、乐业。

广西粉绿藤☆

Pachygone sinica Diels

大瑶山、兴安。

连蕊藤

Parabaena sagittata Miers

隆林。

细圆藤 车线藤

Pericampylus glaucus (Lam.) Merr.

横县、龙州大青山、大瑶山、那坡、田林、隆林、河池。

藤可取纤维和编物。根可止咳。

防已

Sinomenium acutum (Thb.) R. et W.

龙胜。

根、茎通经络，利尿；治神经痛，关节痛，水肿，膀胱热。藤可编用具。

毛防已

S. acutum (Thb.) R. et W.

var. *cinereum* (Diels) R. et W.

龙胜、乐业。

用途参阅防已。

白线薯

Stephania brachyandra Diels

Stephania

扶绥、田林、田阳、隆林、凌云、龙胜。

块根活血散瘀；治跌打，疮疖。

金线吊乌龟 扣子藤、盘花地不容

S. cepharantha Hay.

(*S. disciflora* H.-M.,

S. tetrandra S. Moore

var. *glabra* Maxim.)

全州、资源、大苗山、罗城、凌云、乐业、龙州、梧州。

块根解毒消肿；治蛇伤，结核病，吐血，无名肿毒。块根含淀粉可酿酒。根，叶作土农药。

黔桂千金藤

S. dielsiana Wu

大瑶山。

雅丽千金藤

S. elegans Hk.f. et Thoms.

西林。

千金藤

S. hernandifolia (Willd.) Walp.

靖西、凌云、乐业。

根有小毒，散血解毒，祛风除湿；治风湿关节炎，痈疖疮毒。

粗毛千金藤

S. hispidula (Yamamoto) Yamamoto

河池。

粪箕笃 蛇头藤

S. longa Lour.

(*S. japonica* sensu Merr., non Miers)

区内各地。

全株祛风活络,利尿消肿;治风湿关节炎,肾盂肾炎,疮疖肿痛,蛇伤,疟疾。

总状千金藤

S. racemosa Oliv.

南丹。

华千金藤 金不换,假散血薯

S. sinica Diels

恭城、临桂、永福、大苗山、大瑶山、平南、凌云、乐业、十万大山、龙州。

块根含延胡索乙素,止痛镇静,消肿解毒;治内外伤疼痛,胃痛,疮疖肿痛。

山乌龟 石蟾蜍、粉防已、大回魂

S. tetrandra S. Moore

梧州、武鸣、大瑶山、大苗山、全州、恭城、龙胜、临桂、凌云、乐业。

块根祛风镇痛,利尿,泻湿热;治风湿痹痛,关节痛,水肿,风肿,痈疖疮肿,蛇伤。

大叶藤 越南大叶藤

Tinomiscium tonkinensis Gagn.

扶绥、靖西、田林。

根散瘀止痛;治跌打损伤。

圆角金果榄

Tinospora capillipes Gagn.

龙州。

用途参阅金果榄。

复耳金果榄☆

T. imbricata S. Y. Hu

临桂、龙胜、三江、大瑶山。

Tinospora-Aristolochia

用途参阅金果榄。

发冷藤

T. mastersii Diels

(*T. crispa* Miers)

龙州有栽培。

茎、叶退烧。

金果榄 青牛胆、山慈菇、地苦胆、九龙胆、金狗胆。

T. sagittata (Oliv.) Gagn.

全州、资源、兴安、龙胜、临桂、桂林、大苗山、大瑶山、乐业、岑溪、苍梧、大新。

块根清热解毒，消炎止痛；治咽喉肿痛，热咳失音，外敷疮疖痈疽，接触性皮炎，蛇伤。茎叶敷烫伤。

宽筋藤 松筋藤、伸筋藤、打不死

T. sinensis (Lour.) Merr.

(*Campylus sinensis* Lour.,

Tinospora malabarica (Lam.) Miers)

靖西、凌云、田林、巴马、龙州、武鸣、临桂、灵川、贵县。
藤舒筋活络，除湿祛风；治风湿痹痛，肌腱挛缩，腰腿痛。

24 马兜铃科 ARISTOLOCHIACEAE

三筒管

Aristolochia championii Merr. et Chun

来宾、大瑶山。

根治蛇伤；作兽药，治猪瘟。

马兜铃 青木香、土青木香、万丈龙、天仙藤

A. debilis S. et Z.

全州、临桂、桂林、兴安、灵川、南宁。

有毒。根行气止痛，解蛇毒；治中暑发痧，胃痛，蛇伤。用油调敷，治皮肤湿疹。藤利尿；治妊娠水肿。果镇咳除痰；治肺热喘咳，气管炎。根、茎可提芳香油。

防已马兜铃

A. fangchi Wu, in herb.

玉林、容县、博白、陆川、大瑶山、昭平。

根祛风除湿；治风湿。果止咳。

通城虎 五虎通城

A. fordiana Hemsl.

桂林、苍梧等地。

有小毒，根开窍，镇痛消肿；治小儿惊风，蛇伤，胃痛，关节痛。

海南马兜铃

A. hainanensis Merr.

上思。

大叶马兜铃☆

A. shukangii Chun et How, ined.

龙州、靖西。

有小毒。根块止痛；治喉痛，胃痛，蛇伤。

耳叶马兜铃 假通城虎

A. tagala Champ.

钦州、南宁、玉林、梧州等地区，靖西。

根清热解毒；治瘰癧，痈疖，疔疮，蛇伤。

清藤香 广防已

A. westlandi Hemsl.

大瑶山、扶绥、靖西。

根祛风利水，泻湿热；水肿，小便不利，痈肿湿疮。

圆叶细辛

Asarum caudigerum Hance

桂林、柳州、河池、百色、南宁、苍梧、玉林地区等地。

根表散风寒，祛痰，止痛；治感冒风寒，头痛，牙痛，咳喘痰多，
口舌生疮，蛇伤。

花叶细辛

A. geophillum Hemsl.

桂林。

用途参阅圆叶细辛。

土细辛

A. insigne Diels

龙胜、全州、兴安、临桂、阳朔、昭平、三江、大瑶山、桂平、
武鸣、宁明、龙州、德保、靖西、百色。

有小毒，全株发汗，祛痰，止痛；治感冒头痛，龋齿痛，咳嗽痰多。

金耳环 一块瓦、长梗细辛

A. longipedunculatum O.C. Schmidt

大苗山、大瑶山。

有小毒，全草祛风散寒，解毒止痛；治蛇伤，小儿抽搐，感冒，
跌打肿痛；对葡萄球菌有抑制作用。

粗根细辛☆

A. thunbergii A.Br.

梧州、玉林、大瑶山。

全草祛风止痛；治跌打，蛇伤。

27 猪笼草科 NEPENTHACEAE

猪笼草

Nepenthes mirabilis (Lour.) Druce

玉林。

全草清热利尿，化石止咳；治尿路结石，百日咳，咳血，胃溃疡疼痛。食虫植物。

28 胡椒科 PIPERACEAE

石蝉草

Peperomia dindygulensis Miq.

天峨、乐业、百色、隆林、靖西、龙州、大瑶山。

全株治水火烫伤，疮疥，小儿疳积。

豆瓣菜 圆叶瓜子菜

P. reflexa (L.f.) A.Dietr.

平南、大瑶山、南丹、百色。

用途同上种。

*青菱 菱叶、槟榔菱

Piper betle L.

梧州、武鸣、龙州等地，栽培。

茎、叶祛风散寒，行气化痰，消肿止痒；治胃寒痛，风寒咳嗽，疮疖，湿疹。叶可提芳香油。

葶叶菱 野胡椒

P. boehmeriaefolium Wall.

龙州、扶绥、宾阳、靖西、那坡、田阳、凤山、罗城、大瑶山、大苗山。

全株祛风除湿；治风湿，跌打。

海南菱

P. hainanense Hemsl.

宁明、那坡等地。

Piper

山菱 石南藤、爬岩香

P. hancei Maxim.

区内各地。

全株行气止痛，祛风消肿；治跌打损伤，风湿关节痛，腰膝无力，咳嗽，蛇伤，止呕。

细叶青菱藤

P. kadsura (Choisy) Ohwi

陆川。

全株祛风止痛；治跌打。

两广菱☆

P. matthewii Dunn

容县、藤县、大瑶山、龙州、靖西。

全株祛风止痛；治风湿骨痛，跌打。

尼泊尔胡椒

P. nepalense Miq.

邕宁。

*胡椒

P. nigrum L.

桂南栽培。

果为调味香料。果、茎、叶健胃祛风，治胃寒痛，呕吐，消化不良，腹胀。

毛菱

P. puberulum (Benth.) Maxim.

(*Chavica puberula* Benth.,

P. hongkongense C.DC.)

邕宁、马山、大明山、靖西、德保、那坡、乐业、罗城、大苗山、大瑶山、贺县、梧州、玉林、容县、博白。

全株止痛行气，活血祛风；治胃痛，外伤疼痛，牙痛，风湿痛等

止痛效好，亦治蛇伤，产后风痛，水肿。叶可制酒饼。

假蒟

P. sarmentosum Roxb.

钦州、博白、玉林、苍梧、大瑶山、南宁、邕宁、武鸣、宁明、大新、龙州、靖西、那坡、百色、凌云、天峨。

全株行气止痛，祛湿消肿；治跌打肿痛，腰腿痛，牙痛，疝气痛，蛇伤。水提液对葡萄球菌、福氏痢疾杆菌有抑制作用。叶切碎生食，为调味香料。

华山菱☆

P. sinense C.DC.

大瑶山。

齐头绒

Zippelia begoniaefolia Bl.

龙州大青山。

29 三白草科 SAURURACEAE

狗笠耳 土细辛

Gymnotheca chinensis Decne.

隆林、凌云、乐业。

全株治跌打。

鱼腥草 蕺菜、臭菜、侧耳根、狗贴耳

Houttynia cordata Thb.

区内各地。

全株清热解毒，排脓消肿，利尿；治肺炎，肺脓疡，百日咳，肺热咳嗽，痈疖，痔疮，尿路感染。又预防蚕豆黄病。叶可供蔬食。全株作农药，能毒杀棉蚜、红蜘蛛和各种青虫。

三白草 塘边藕、过塘藕、白莲藕

Saururus chinensis (Lour.) Baill.

区内各地。

有小毒。全株清热解毒，利尿消肿；治白带，尿路感染及结石，
水肿，疮疖，前列腺炎。亦可作农药。

30 金粟兰科 CHLORANTHACEAE

银线金粟兰 四块瓦、四子莲

Chloranthus fortunei (A.Gray) Solms

龙胜、兴安、临桂、桂林、贺县。

有小毒。全株祛风止痛；治风湿关节痛，蛇伤，跌打，疖肿。

长梗金粟兰 四块瓦

C. henryi Hemsl.

龙胜、全州。

全株消肿止痛；治五步蛇咬伤，跌打。

西南金粟兰

C. holostegius (H.-M.) Pei et Sen

西林、隆林、田林、田阳、天峨、资源。

多穗金粟兰 大四块瓦

C. multistachys (H.-M.) Pei

隆林、东兰、南丹、大苗山、龙胜、兴安、临桂、全州、资源。

滇桂金粟兰

C. officinalis Bl.

凌云。

卵苞金粟兰

C. oldhami Solms

乐业、南丹、临桂、兴安、全州。

全株散瘀活血；治跌打，蛇伤。

及己 四大金刚

C. serratus (Thb.) Roem. et Schult.

临桂、桂林、全州、大苗山、柳州、马山、藤县、玉林。

有毒。全株舒筋活络，祛风止痛；治疔肿，恶疮，搔痒，跌伤，扭伤，骨折。又可杀孑孓、蛆。

• 金粟兰 珍珠兰、珠兰

C. spicatus (Thb.) Mak.

龙州、靖西、田林、凤山、桂林。

鲜花、根、茎可提芳香油。花可薰茶，或掺入茶叶，叫珠兰茶。

根茎外敷治疗疮。多有栽培供观赏。

九节风 接骨金粟兰、草珊瑚、九节茶、鹧鸪茶

Sarcandra glabra (Thb.) Nakai

(*Chloranthus glaber* Thb.,

C. brachystachys Bl.)

区内各地。

全株续筋接骨，止痛退热；治骨折，跌打肿痛，风湿腰腿痛，高热不退，腹胀，偏头痛。也可代茶。

海南草珊瑚

S. hainanensis (Pei) Swamy et Bail.

龙州、靖西、乐业、凤山。

32 罂粟科 PAPAVERACEAE

血水草 兜蓬菜、雪花罂粟

Eomecon chionantha Hance

全州、资源、兴安、临桂、桂林、永福。

全草有毒，清热解毒；治小儿癰疮和胎毒。

Eschscholtzia-Corydalis

*花菱草 金英草

Eschscholtzia californica Champ.

栽培花卉。

博落迴

Macleaya cordata (Willd.) R.Br.

全州、兴安、龙胜、临桂、桂林、鹿寨、柳州、容县。

全草有毒，麻醉镇痛，消肿；治跌打损伤，关节炎，汗斑，恶疮，蜂螫伤。作农药可防治稻椿象、稻苞虫、钉螺等。

*丽春花 赛牡丹、虞美人

Papaver rhoeas L.

栽培花卉。

果有毒，镇痛，止咳，止泻；治咳嗽，痛症，水泻。

*罂粟 鸦片

P. somniferum L.

栽培药物或花卉。

乳汁干燥后即鸦片，麻醉止痛，催眠镇静，止泻止咳；用于各种痛症，咳嗽，腹泻。果壳亦可用。

33 紫堇科 FUMARIACEAE

深山黄堇 黄花鸡距草

Corydalis pallida Pers.

龙胜、桂林、凌云、凤山、扶绥。

根止痛消肿，拔毒；治疮疡肿毒。

黄堇

C. racemosa (Thb.) Pers.

桂林。

根清热利尿；治目赤肿痛。

红花鸡距草 护心胆

C. suaveolens Hance

全州、龙胜、兴安、临桂、桂林、阳朔、永福、柳城、融安、大苗山。

根有小毒，解毒止痛，消肿；治毒蛇咬伤，跌打损伤，风湿关节痛，坐骨神经痛。

多花指蒴草

Dactylicapnos multiflora Hu

凌云。

指叶紫堇 倒劈藤

D. scandens D. Don

百色、凌云。

根茎止痛，止血收敛；治胃痛，关节痛，外伤出血。

36 白花菜科 CAPPARIDACEAE

黔桂槌果藤☆(注)

Capparis bodinieri Lévl.

隆林。

叶、花、果治毒蛇咬伤。

广州槌果藤

C. cantoniensis (Lour.) Merr.

(*C. pumila* Champ.)

梧州、陆川、北流、桂平、平南、大瑶山、临桂、龙胜。

茎、叶作土农药，又治疥癩。

凤山槌果藤☆

C. chingiana B.S. Sun

注：本属多数种类的果和种子有毒，不宜多食。

凤山。

保亭槿果藤☆ 屈头鸡、狛榴橙

C. koi Merr. et Chun

十万大山、北流、陆川、昭平、龙胜。

种子清热止渴；治喉炎，喉痛。

马槟榔 水槟榔

C. masaikai Lévl.

天峨、南丹、凤山、都安、凌云、乐业、隆林、靖西、那坡、德保、龙州、容县、平乐。

种子入药，能解渴；治喉炎，去斑痧，醒酒。

膜叶槿果藤

C. membranacea Gardn. et Champ.

龙州。

根散瘀消肿；治跌打。

翅果槿果藤 水槟榔

C. pterocarpa F.Chun

隆林。

种子清热止渴；治喉痛。

曲枝槿果藤

C. sepiaria L.

龙州。

无柄槿果藤☆ 无柄山柑

C. subsessilis B.S.Sun

龙州。

尾叶槿果藤☆ 尾叶马槟榔

C. urophylla Chun et F.Chun

横县、扶绥、荔浦、永福、阳朔、临桂、桂林、恭城、兴安、大

苗山、融安。

纤枝槿果藤 假黄皮、柳枝山柑

C. viminea Hk.f. et Thoms.

梧州、贵县、大瑶山、南丹、平果、百色、隆林、龙州。

锈色纤枝槿果藤☆ 锈色柳枝山柑

C. viminea Hk.f. et Thoms.

var. *ferruginea* B.S.Sun

浦北、扶绥、田阳、西林。

白花菜

Cleome gynandra L.

(*Gynandropsis gynandra* (L.) Briq.)

龙州、南宁、百色。

种子有小毒，含脂肪油和芳香油；外用消肿止痛；治痔疮，风湿痹痛。

*紫龙须 醉蝶花

C. spinosa L.

(*C. pungens* Willd.)

梧州、南宁、桂林。

栽培花卉，蜜源植物。

毛龙须 臭矢菜

C. viscosa L.

(*C. iconandra* L., *Polanisia iconandra* (L.) W. et A.)

十万大山、博白、贵县、梧州、钟山、平乐、临桂、南宁、武鸣、大新、宁明、龙州、田阳、百色。

赤果鱼木

Crataeva erythrocarpa Gagn.

镰叶鱼木

C. falcata (Lour.) DC.

桂林、阳朔、南丹、上林、钦州、合浦。

刺籽鱼木

C. nurvala Buch.-Ham.

(*C. lophosperma* Kurz)

大青山、那坡、昭平。

鱼木

C. religiosa Forst.f.

龙州、武鸣、桂平。

行道树；干材用，但易蛀蚀。果有毒，又可为胶粘剂；果皮为染料。

罗志藤

Stixis suaveolens (Roxb.) Pierre

那坡。

39 十字花科 CRUCIFERAE

*芥兰 芥蓝

Brassica alboglabra Bail.

栽培蔬菜。

*芥蓝头 球茎甘蓝、擘蓝

B. caulorapa Pasq.

栽培蔬菜。

*青菜 白菜、小白菜

B. chinensis L.

栽培蔬菜。

*油菜 芸苔

B. chinensis L.

var. *oleifera* Mak.

栽培油料作物和蔬菜。种子散瘀消肿；治产后血瘀，热肿。

*全叶芥 苦芥

B. integrifolia (West) O.E.Schulz

栽培蔬菜。

*芥菜

B. juncea (L.) Coss.

栽培蔬菜。种子可榨油和制芥辣粉；入药，作皮肤发赤剂、局部刺激剂；内服可发汗散寒。

*皱叶芥

B. juncea (L.) Coss.

var. *crispifolia* Bail.

栽培蔬菜。

*多裂叶芥

B. juncea (L.) Coss.

var. *multisecta* Bail.

栽培蔬菜。

*大头菜

B. juncea (L.) Coss.

var. *napiformis* Paill. et Bois

(*B. napiformis* Bail.)

栽培蔬菜。

*榨菜 菱角菜、羊角菜

B. juncea (L.) Coss.

var. *tsatsai* Mao

栽培蔬菜。

Brassica-Cardamine

*花椰菜

B. oleracea L.

var. *botrytis* L.

栽培蔬菜。

*包菜 椰菜、莲花白

B. oleracea L.

var. *capitata* L.

栽培蔬菜。

*高脚白菜

B. parachinensis Bail.

栽培蔬菜。

*大白菜 黄芽白

B. pekinensis Rupr.

栽培蔬菜。

*茺青

B. rapa L.

栽培蔬菜。

芥 荠菜

Capsella bursa-pastoris Medic.

区内各地。

全草清热利尿，凉血止血；治尿血，子宫出血，月经过多，视网膜出血，乳糜尿。野菜。

喜钙碎米荠

Cardamine calcicola W.W.Sm.

龙胜。

弯曲碎米荠

C. flexuosa With.

(*C. silvatica* L.)

龙胜、临桂。

碎米荠

C. hirsuta L.

临桂、龙胜。

野菜。全草祛风热毒；治痢疾腹胀。

琴叶碎米荠

C. lyrata Bunge

临桂。

全草治妇女月经不调。

堇叶碎米荠

C. violifolia O.E.Schulz

临桂。

水田芥 西洋菜、豆瓣菜

Nasturtium officinale R. Br.

(*Roripa nasturtium-aquaticum* Hayek)

龙胜、临桂。

西江流域、柳州、桂林等地常栽培作蔬菜。

***萝卜** 莱菔

Raphanus sativus L.

var. *longipinnatus* Bail.

栽培蔬菜。根作蔬菜；又利尿消肿，治浮肿尿少；煮熟外敷，治冻疮。种子消食化痰，下气定喘；治食积腹泻，腹胀，咳嗽痰喘。

***茹菜** 满园花

R. sativus L.

var. *oleiferus* Mak.

绿肥作物。种子可榨油。

Roripa-Viola

圓果蔊菜

Roripa globosa (Turcz.) Thellg.

(*Nasturtium globosum* Turcz.)

南宁、隆林等地。

青蓝菜 印度蔊菜

R. indica (L.) Bail.

(*Nasturtium indicum* (L.) DC.,

Sisymbrium indicum L.)

临桂、南宁等地。

微子蔊菜

R. microsperma (DC.) H.-M.

(*Nasturtium microspermum* DC.)

临桂等地。

蔊菜 塘葛菜

R. montana (Wall.) Small

(*Nasturtium montanum* Wall.)

临桂、东兰、凤山、凌云、乐业、大瑶山、梧州等地。

全草清热利尿，凉血解毒，消肿退黄；治感冒发热，咽喉肿痛，小便不利，黄疸，疔疮痈肿，漆疮。

40 堇菜科 VIOLACEAE

三角车

Rinorea bengalensis (Wall.) O.Ktze.

龙州、大新。

堇菜

Viola alata Burgh.

(V. verecunda Gr.)

临桂、桂林、龙胜、柳江、大瑶山、桂平、陆川、博白、北流、梧州。

全草拔毒去脓，散瘀消肿；治鼠疫，瘰癧，蛇伤。

北堇菜

V. alisoviana Kiss.

临桂、柳州、河池、隆林。

全草拔毒消肿；治疮疖。

小叶犁头草

V. betonicifolia Beck.

全草生肌，清火；外敷疮疖，跌打。

戟叶犁头草

V. betonicifolia Beck.

subsp. nepalensis (Ging) Beck.

隆林、临桂、梧州。

全草拔毒消肿；治疮疖，跌打。

毛堇菜

V. confusa Champ.

临桂、桂林、龙胜。

全草拔毒生肌；治疮疖。

深圆齿堇菜

V. davidi Fr.

(V. smithiana W.Beck.)

龙胜。

蔓茎堇菜 白花犁头草、黄瓜香、匍伏堇

V. diffusa Ging

上思、容县、平南、大瑶山、大苗山、凌云、乐业、阳朔、临桂、

Viola

桂林、龙胜、兴安、全州。

全株清热消肿，生肌拔毒；治结合膜炎，蛇伤，疮毒红肿，巴骨痲。

紫花堇

V. grypceras A.Gr.

临桂。

全草清热消肿；治疮毒，跌打损伤，火眼。

犁头草 紫花地丁、长萼堇菜

V. inconspicua Bl.

区内各地。

全草消炎止痛，清热解毒；治急性结合膜炎，咽喉炎，乳腺炎，疮疖肿毒，食积饱胀。

地丁草

V. japonica Langsd.

柳州。

全草清热解毒，消肿；治疮疖肿毒。鲜全草捣汁两酒杯，解盐卤中毒。

江西堇菜 高脚犁头草

V. kiangsiensis W.Beck.

南丹。

浅圆齿堇菜

V. schneideri W.Beck.

(*V. mucronulifera* H.-M.)

凌云、龙胜、平南、上林。

蔓地犁

V. triangulifolia W.Beck.

龙胜、大瑶山。

全草清热消炎；治结合膜炎。

• 三色堇

V. tricolor L.

var. *hortensis* DC.

栽培花卉。全株清热解毒；治皮肤病。

大叶堇 ☆ 荳(音还)

V. vaginata Max.

龙胜、全州、隆林。

42 远志科 POLYGALACEAE

黄花远志

Polygala arillata

Buch.-Ham. ex D. Don

大瑶山、大苗山、乐业。

根炖肉，滋补强壮；治病后虚弱。树皮泡酒，通经活血。又供观赏。

黄花倒水莲 倒水莲、倒吊黄、白马胎、鸡仔树

P. aureocauda Dunn

上思、十万大山、大明山、马山、玉林、容县、平南、苍梧、贺县、富川、昭平、大瑶山、大苗山、阳朔、荔浦、永福、临桂、灵川、龙胜、兴安、恭城、凤山、隆林。

根滋补强壮，祛风湿，舒筋络；治病后和产后体虚，腰肌劳损，风湿关节痛，跌打损伤，急慢性肝炎，子宫下垂，月经不调。

尾叶远志

P. caudata R. et W.

阳朔、灵川、乐业。

大金不换 紫背金牛、肥儿草、节节花、桧膜草

P. chinensis L.

(*P. glomerata* Lour.)

博白、玉林、容县、苍梧、昭平、十万大山、邕宁、大明山、马山、龙州、田林、百色、凌云、融安、大瑶山、平乐、阳朔、永福、恭城。

全草活血散瘀，止咳祛痰，清热解毒；治肺结核，百日咳，支气管炎，小儿麻痹后遗症，小儿疳积，跌打损伤，急性结合膜炎，蛇伤。

密花远志☆

P. congesta R. et W.

大苗山、那坡。

贵州远志☆

P. dunniana Lévl.

龙胜、全州、大瑶山、大明山。

小远志 瓜子金、小金不换、过路蛇、蓝花草

P. japonica Houtt.

全州、龙胜、临桂、桂林、永福、柳州、大苗山、梧州、横县、马山、凌云、乐业、隆林金钟山。

全草止咳祛痰，安神，强心利尿；治支气管炎，神经衰弱，蛇伤，骨髓炎及脓肿，痈疖疮肿，刀伤。

曲江远志☆

P. koi Merr.

全州、龙胜、临桂。

全株止咳；治咳嗽，又治小儿疳积。

大叶金牛 红背蓝

P. latouchei Fr.

大苗山、大瑶山、大明山、宁明、那坡。

山鼠尾

P. longifolia Poir.

龙州。

长尾远志☆

P. mariesii Hemsl.

灵川、靖西。

辣味根

P. persicariifolia DC.

百色。

岩生远志

P. saxicola Dunn

大瑶山、十万大山。

卵叶远志 西伯利亚远志

P. sibirica L.

龙胜、柳州、马山。

全草镇静安神，化痰，消痈肿；治咳嗽，支气管炎，惊悸，健忘，
疮肿，蛇伤。

小花远志

P. telephioides Willd.

贺县、昭平、临桂、三江、罗城。

全株解毒，祛痰；治蛇伤，风痰。

远志

P. tenuifolia Willd.

全州、资源、龙胜、临桂、大苗山、大瑶山、河池。

根祛痰，镇静安神；治咳嗽痰多，支气管炎，心悸不眠，健忘。

天星吊红

P. triphylla Buch.-Ham.

(*P. furcata* Royle)

恭城、龙胜、临桂、大苗山。

西南远志☆

P. wattersii Hance

大瑶山、临桂、南丹。

树皮舒筋活络；治跌打损伤。

一碗泡 斩蛇剑、过山蛇

Salomonina cantoniensis Lour.

十万大山、龙州、苍梧、昭平、大瑶山、大苗山、临桂、桂林、
龙胜、灌阳。

全株解毒，消肿，止痛；治毒蛇咬伤，无名肿毒。

缘毛一碗泡☆

S. ciliata (L.) DC.

(*Polygala ciliata* L.,

S. oblongifolia DC.)

龙胜、桂林、临桂、昭平、罗城。

蝉翼藤

Securidaca inappendiculata Hassk.

(*S. tavoyana* Wall. ex Benn.,

S. yaoshanensis Hao)

十万大山、北流、玉林、苍梧、南宁、大明山、大瑶山、那坡、
凌云、乐业。

茎皮纤维坚韧，可代麻和作造纸、人造棉原料。

黄叶树 青蓝木

Xanthophyllum hainanensis Hu

钦州、东兴、浦北、十万大山、南宁、宁明、大瑶山。

木材硬重，可供建筑、板材、家具、农具、织布机木棍用。

45 景天科 CRASSULACEAE

*伽蓝菜 鸡爪三七、五爪三七

Kalanchoe laciniata DC.

栽培。

鲜茎、叶清热解毒，散瘀消肿，止血止痛；治跌打，外伤出血，烫火伤，毒蛇咬伤，疮疖脓肿。

*落地生根

K. pinnata Pers.

(*Bryophyllum pinnatum* (Lam.) Oken)

各地常有盆栽。

用途参阅伽蓝菜。

匙叶伽蓝菜 白背子草

K. spathulata DC.

扶绥、凌云、乐业。

鸭仔虫菜

Sedum alfredi Hance

大苗山、龙胜、临桂。

繁缕叶景天☆

S. drymarioides Hance

var. *stellariaefolium* (Fr.) Hamet

柳州。

树枝草

S. grammophyllum Fröd.

容县天堂山、龙胜。

深山佛甲草

S. japonicum Sieb.

全州。

*佛甲草 禾雀鯛

S. lineare Thb.

栽培花草。

全草清热解毒，散瘀止痛，止血；治烫火伤，疮疖肿毒，咽喉口舌肿，急性结合膜炎、跌打损伤、外伤出血，犬虎咬伤。

黄山景天☆

S. mingjiniana Fu

阳朔。

垂盆草 匍茎佛甲草

S. sarmentosum Bunge

临桂、桂林。

全草止血生肌，散瘀消肿；治烫火伤，刀伤，跌打，疮疖肿痛，咽喉红肿，鸡眼。

印度石莲花 蛇舌莲

Sinocrassula indica (Decne.) Berger

(*Crassula indica* Decne.,

Sedum indicum (Decne.) Hamet)

南宁。

全草活血散瘀，止血生肌；治跌打，蛇伤，刀伤。

47 虎耳草科 SAXIFRAGACEAE

华南落新妇☆ 华南升麻(注)

Astilbe austrosinensis H.-M.

全州、龙胜、临桂、大苗山、大瑶山。

注：中药升麻，在我国多数地区用毛茛科升麻，华南地区则用菊科升麻。

大叶猫眼草

Chrysosplenium macrophyllum Oliv.

龙胜。

厚叶梅花草

Parnassia crassifolia Fr.

资源、兴安。

半边碟

P. davidi Fr.

大瑶山。

苍耳七

P. wightiana Wall.

龙胜、兴安。

全草浸酒服，明目补肾；治腰痛，白带。花浸酒或煎水服，治眼翳。

扯根菜

Penthorum chinense Pursh.

临桂。

全草消肿利水，散瘀行气；治水肿，跌打肿痛。野菜。

卵心叶虎耳草

Saxifraga ovatocordata H.-M.

龙胜、大瑶山。

虎耳草 金线吊芙蓉、耳聋草

S. stolonifera Meerb.

(*S. sarmentosa* L.f.)

全州、兴安、龙胜、临桂、桂林、灵川、融水、大苗山、罗城等地。
全草有小毒，清热解毒，凉血止血；治急慢性中耳炎，耳内流脓

Tiarella-Drosera

(捣汁滴耳)，外伤出血，疮疖脓肿，风丹，瘤肿，皮肤红疹，冻疮，痔疮，毒虫刺伤。

紫背金钱

Tiarella polyphylla D. Don

龙胜、兴安、全州。

全草活血去瘀；治跌打损伤。

48 茅膏菜科 DROSERACEAE

锦地罗 落地金钱

Drosera burmanni Vahl

钦州、邕宁。

本属植物是有名的食虫植物。

长叶茅膏菜

D. indica L.

合浦。

茅膏菜 一粒金丹、地下明珠

D. peltata Sm.

var. *lunata* (Buch.-Ham.) C.B. Clarke

龙胜、兴安、临桂、桂林、罗城、大苗山、大瑶山、大明山、梧州。

叶有毒，含腐蚀性色素和氢氰酸。球茎祛风除湿，止痛；外敷治风湿性腰腿痛，跌打损伤，颈淋巴结核，但久敷起泡。全株煎水洗；治身痒。

圆叶茅膏菜

D. rotundifolia L.

桂林。

52 沟繁缕科 ELATINACEAE

田繁缕 蜂刺草

Bergia ammanioides Roxb.

区内各地。

倍蕊田繁缕

B. serrata Blanco

柳州、大瑶山。

53 石竹科 CARYOPHYLLACEAE

细枝蚬壳草

Arenaria leptoclados Guss.

柳州。

蚤缀 鹅不食(注)

A. serpyllifolia L.

十万大山、凌云、乐业、临桂。

短瓣石竹 松筋藤

Brachystemma calycinum D. Don

凌云、乐业、田林、那坡、百色、德保、靖西、龙州。

根舒筋活络；治远年风湿，跌打损伤，白喉。

婆婆指甲菜

Cerastium viscosum L.

桂林。

狗筋蔓 抽筋菜

Cucubalus baccifer L.

注：中草药常用的鹅不食草，是菊科植物，和本种不同。

Dianthus-Drymaria

隆林、凌云、乐业、临桂。

全株活血；治筋骨疼痛。

*五彩石竹

Dianthus barbatus L.

栽培花卉。

*大花石竹 洋丁香

D. caryophyllus L.

栽培花卉。

石竹

D. chinensis L.

各地常有栽培。

全草作瞿麦用。花含芳香油，可调配高级香精。庭园花卉。

*洛阳花 虹石竹

D. chinensis L.

var. *heddewigii* Regel

栽培花卉。

*繸石竹

D. chinensis L.

var. *laciniata* Regel

栽培花卉。

瞿麦

D. superbus L.

桂林。

全草清热利尿，破血通经；治水肿，血淋，痈肿，孕妇忌用。种子

可榨油，供制皂用，亦可食用。花卉。

荷莲豆 水蓝青、水冰片、穿线蛇

Drymaria cordata (L.) Willd.

龙胜、临桂、大瑶山、苍梧、藤县、昭平、凌云、百色、天峨、宁明、龙州。

全株消肿解毒，退热止痛；治急性皮炎并发溃疡，疖肿，瘰疬，毒蛇咬伤，骨髓炎等。常作外用。

星色草 白鼓钉

Polycarpaea corymbosa (L.) Lam.

(*Achyranthes corymbosa* L.)

合浦。

全草清热利尿，解毒除湿；治急性菌痢，肠炎，实症腹水，消化不良。

多莢草

Polycarpon indicum (Retz.) Merr.

邕宁。

漆姑草

Sagina maxima A.Gr.

(*S. sinensis* Hance)

临桂。

*高雪轮 捕虫瞿麦

Silene armeria L.

栽培花卉。

苍蝇花 野蚊子草、银柴胡

S. fortunei Vis

(*S. argyi* Lévl.)

桂林。

根清热，凉血；治虚劳发热，小儿疳积，消瘦发热，心火。

*矮雪轮

S. pendula L.

Stellaria-Mollugo

栽培花卉。

雀舌草 天蓬菜

Stellaria alsine Grimm.

(*S. uliginosa* Murr.)

大苗山。

牛繁缕

S. aquatica (L.) Scop.

临桂、龙胜、全州等地。

繁缕 鹅肠菜

S. media (L.) Cyr.

区内各地多有分布。

全草治疮疥。野菜。

竹枝草

S. saxatilis Buch.-Ham.

临桂、南丹、隆林。

鸡肉菜

S. wushanensis Wils.

龙胜、大苗山、大瑶山、平南、隆林、凌云、乐业。

野菜。

54 粟米草科 MOLLUGINACEAE

粟米草

Mollugo pentaphylla L.

(*M. stricta* L.)

兴安、临桂、桂林、大苗山、柳州、苍梧、十万大山、龙州。

全草抗菌消炎。

56 马齿苋科 PORTULACACEAE

●半枝莲 松叶牡丹

Portulaca grandiflora Hk.

区内城市。

美丽花卉。常用于花坛、花径、盆花。

马齿苋 瓜子菜

P. oleracea L.

区内各地。

全草清热去湿；治菌痢，肠炎，百日咳，急性睾丸炎，乳腺炎，疟疾，急性关节炎。可作蔬菜，家畜饲料，含维生素甲、乙、丙和脂肪等。亦可作农药，防治蚜虫。

多毛马齿苋

P. pilosa L.

贵县。

全株止血消炎；治刀伤，狗咬伤，水火烫伤。

土人参

Talinum patens (L.) Willd.

(*T. paniculatum* Gaertn.)

区内各地。

全株补中益气，润肺生津；治病后体弱，肺燥咳嗽，遗尿，月经不调。鲜叶外敷疮疖。可作蔬菜。

57 蓼科 POLYGONACEAE

●珊瑚藤

Antigonum leptopus Hk. et Arn.

Homalocladium-polygonum

通常栽培。

庭园花卉。

●竹节蓼 扁竹花、飞天蜈蚣、蜈蚣草

Homalocladium platycladum (F.-Muell.) Bail.

(*Muehlenbeckia platyclados* Meissn.)

栽培。

茎、叶拔毒消肿；治毒蛇及蜈蚣咬伤。

篇蓄

Polygonum aviculare L.

全州、桂林、阳朔。

全草利尿通淋，清热，驱虫；治小便不利，湿热淋症，血尿，黄疸，小儿蛔虫。作农药，可防治椿象、菜青虫，灭蛆。

毛蓼

P. barbatum L.

钟山、平乐、柳州、大苗山、都安、南宁、武鸣、宁明、十万大山。

全草拔毒生肌；治疮疖痈肿。

细刺毛蓼 小毛蓼

P. barbatum L.

var. *gracile* (Dans.) (Stew.)

十万大山、龙州、藤县、桂林。

全草散寒活血；鸭绒熨胸背部，治麻疹不现，跌伤后受寒。

簇蓼 红辣蓼

P. caespitosum Bl.

(*P. posumbu* Ham.)

区内各地。

全草治跌打，关节炎，头疮，脚癣。

球花水蓼

***P. caespitosum* Bl.**

var. *longisetum* (De Bruyn) Stew.

贺县、大瑶山、平南。

头花蓼 沙滩子、石莽草、石辣蓼

***P. capitatum* Buch.-Ham. ex D. Don**

贺县、兴安、龙胜、灵川、临桂、桂林、大瑶山、大苗山、罗城、凌云、隆林、靖西。

全草利尿，清热解毒；治尿路感染，尿布皮炎，湿疹，黄水疮。

火炭母

***P. chinense* L.**

区内各地。

全草清热利湿，消肿毒，去腐生肌；治痈疖溃烂，皮炎，湿疹，

肠炎，痢疾，感冒，咽喉炎，跌打扭伤，蛇伤。

伴蛇莲 拳参、草叶蓼

***P. coriaceum* Sam.**

全州、兴安、灌阳、恭城、凌云、乐业。

全草解毒，收敛，生肌；治毒蛇咬伤，烫火伤，痢疾，腹泻。

蓼子草

***P. criopolitanum* Hance**

临桂、昭平、梧州、南宁、龙州。

虎杖 阴阳莲、黄干头、红莲、酸筒杆、马鹿角

***P. cuspidatum* S. et Z.**

区内各地。

根清热解毒，活血散瘀，利尿消肿；治急性风湿性关节炎，跌打

骨折，烫火伤（抗绿脓杆菌），肝炎，肋膜炎，支气管炎，血热

经闭，狂犬病，毒蛇咬伤。作兽药，治牛腹胀病，黄蜂胃等。

Polygonum

作土农药，防治螟虫、蚜虫、青虫。野菜。

野荞麦 酸荞麦、荞麦七

P. cymosum Meissn.

资源、兴安、龙胜、灵川、临桂、大瑶山、忻城、梧州、南宁、武鸣。

根和全草消肿解毒，健脾胃，收敛；治乳腺炎，食欲不振，小儿消化不良，痢疾，腹泻，毒蛇咬伤，跌打损伤，疮疖。叶可作菜。

二歧蓼 大蓼

P. dichotomum Bl.

(*P. strigosum* R.Br.

var. *pedunculare* (Wall.) Stew.)

苍梧、南宁等地。

疏花蓼

P. dissitiflorum Hemsl.

大瑶山。

*荞麦 三角麦、甜荞麦

P. fagopyrum L.

(*Fagopyrum esculentum* Moench.)

区内各地。

栽培粮食作物。果益气止汗；治盗汗，自汗。根、叶外敷，治无名肿毒，蜜源植物。

光蓼

P. glabrum Willd.

南宁、柳州、桂林。

箭叶蓼

P. hastato-sagittatum Mak.

平南、大瑶山、大苗山、昭平、临桂、龙胜、兴安、资源、恭城、乐业、那坡、横县、龙州。

全草治蛇伤。

水蓼 辣蓼、蓼、蓼芽菜、柳辣草

P. hydropiper L.

区内各地。

全草止泻，利尿消肿，止痛；治肠炎，腹泻，跌打，风湿，疮疖，蛇伤，水肿。作土农药，防治稻飞虱、稻苞虫等，又可灭蛆、孑孓。全草含甲氧基蒽醌、凝血性甙，具降血压作用的挥发油，对家畜有毒。

软水蓼☆

P. hydropiper L.

var. *flaccidum* (Meissn.) Stew.

(*P. flaccidum* Meissn.)

梧州、贵县、南宁、柳州等地。

用途参阅水蓼。

粗毛水蓼 小辣蓼

P. hydropiper L.

var. *hispidum* (Meissn.) Stew.

(*P. hispidum* Meissn.)

龙州等地。

蚤缀草

P. japonicum Meissn.

天峨。

山蓼 愉悦蓼

P. jucundum Meissn.

桂林、柳州、河池、南宁、梧州等地区。

Polygonum

全草作农药。

大马蓼

P. lapathifolium L.

钟山、阳朔、天峨、乐业。

果清肺化痰，降气通便，透疹；治咳嗽痰喘，便秘，麻疹不透。

全草作农药，防治稻飞虱、稻苞虫、浮尘子等，亦可灭子子和蛆。

柳叶蓼

P. lapathifolium L.

var. *salicifolium* Sibth.

梧州、大瑶山、大苗山、临桂、天峨、隆林。

用途参阅大马蓼。

小蓼

P. minus Huds.

临桂、柳州。

何首乌 首乌、多花蓼、马肝石

P. multiflorum Thb.

区内各地。

块根生用，通大便，解疮毒；治便秘，肿毒，颈淋巴腺炎。制熟

则补肝肾，益气血；治贫血，衰弱，血虚发白，头昏目花，腰

膝酸软，肝肾阴亏。首乌藤（夜交藤）养心安神；治虚烦不

眠，多梦。叶拔浓；外敷疮疖肿痛。茎、叶煎汤，洗疮疥作痒。

小花蓼

P. muricatum Meissn.

临桂、龙胜、大苗山、罗城。

山谷蓼☆ 尼泊尔蓼

P. nepalense Meissn.

(*P. alatum* Buch.-Ham, mss.)

桂林地区、昭平、容县、大瑶山、大苗山、融安、罗城、东兰、横县、大新、凌云、隆林。

荭草 天蓼、大蓼、木蓼、东方蓼

P. orientale L.

兴安、龙胜、桂林、大苗山、昭平、梧州、南宁、宁明、龙州、马山、灵山。

果(水红花子)清肺化痰，降气通便，软坚消痞；治咳嗽痰喘，便秘，麻疹不透，烦渴，颈淋巴腺炎，痞块腹胀。花散血，消食，止痛。叶、根治毒疮。根治风疹块。种子含淀粉，可制饴糖和酿酒。果序烤熟，可食。

掌叶蓼 屈草

P. palmatum Dunn

大瑶山、十万大山、那坡。

高山蓼

P. paniculatum Bl.

隆林、田林。

毛高山蓼

P. paniculatum Bl.

var. *molle* (Don) Dans.

凌云、那坡。

扛板归 大蜢脚、蛇不过、老虎脚、贯叶蓼、青蛇丹、河白草

P. perfoliatum L.

区内各地。

全草清热解毒，去腐生肌，利尿消肿；治毒蛇咬伤，疮疖脓疡，皮肤湿疹，腹泻，尿路结石。可作农药，防治蔬菜害虫，可熏壁虱。

Polygonum

米子蓼 习见蓼

P. plebeium R Br.

区内各地。

鸭脚蓼☆

P. pseudopalmatum Hoo

博白、北流、岑溪、苍梧。

赤胫散 蛇头蓼、九龙盘、缺腰叶蓼

P. runcinatum D. Don

全州、资源、灌阳、龙胜、大苗山、凌云。

全草消肿解毒；外用治蛇伤，痈疖，无名肿毒。

华赤胫散☆

P. runcinatum D. Don

var. *sinense* Hemsl.

全州、资源、龙胜。

用参参阅赤胫散。

戟叶扛板归

P. sagittifolium Lévl.

(*P. darrissi* Lévl.)

兴安、平乐、乐业、隆林。

廊茵 刺蓼、红花蛇不过

P. senticosum (Meissn) Fr. et Sav.

平乐、桂林。

全草清热解毒；治顽固性痈疖，蛇头疮，蛇咬伤。

糙刺蓼☆ 水湿蓼

P. strigosum R.Br.

柳州、柳城。

戟叶蓼 苦荞麦

P. thunbergii S. et Z.

凌云、大瑶山、藤县。

蓝蓼 蓝

P. tinctorium Ait.

藤县、平南、大瑶山、阳朔、都安、南丹、凤山等地。

叶清热解毒，凉血；治急性热病，喉痛，口舌生疮，痈肿恶疮。
可制蓝色染料。

金线草 九龙盘

P. virginianum L.

(*P. filiforme* Thb., *Tovara virginiana* (L.) Rafin.
var. *filiformis* (Thb.) Stew.)

区内各地。

全草止血；治咳血，崩漏。亦可供观赏。

香蓼

P. viscosum D. Don

大明山、扶绥、宁明。

全草有香气；治风湿。

酸模 莫菜、癣草

Rumex acetosa L.

资源、全州、凌云。

根或全草消炎止血，通便，杀虫；治外伤出血，皮肤病，疥癣，

汗斑，疔疮，五淋，便秘。嫩叶可食，可作猪饲料。全株可作
农药。

皱叶酸模 野当归、羊蹄

R. crispus L.

全州、融安、苍梧、玉林、扶绥、靖西。

Rumex-Phytolacca

根清热通便,杀虫;治便秘,醋磨或酒浸,外搽各种顽癣,疮疡肿痛,白秃,跌打损伤。茎、叶可作猪饲料。

羊蹄

R. japonicus Meissn.

凌云、龙胜、桂林、贺县、玉林、南宁。

根治疥癣,便秘;又含淀粉和单宁。嫩叶可作蔬菜和猪饲料。

土大黄

R. madaio Mak.

(*R. daiwoo* Mak.)

大瑶山、苍梧。

根清热通便,杀虫止痒;治便秘,皮肤慢性溃疡,疥疮,无名肿毒。

假菠菜 长刺酸模、连明子

R. maritimus L.

凌云、凤山、梧州、南宁、合浦。

大叶酸模☆

R. nepalensis Spreng.

(*R. esquirolii* Lévl.)

隆林、龙胜。

绿萼酸模

R. wallichii Meissn.

凌云、河池。

59 商 陆 科 PHYTOLACCACEAE

商陆

Phytolacca acinosa Roxb.

(*P. esculenta* van Houtte)

区内各地。

全株有毒，根最毒，含商陆毒素、羟基酸、皂甙等。根逐水利尿，消肿毒；治水肿，腹水，脚气；外敷痈疖疮毒。孕妇忌服。可作农药。作兽药，外敷，治无名肿毒。

61 藜 科 CHENOPODIACEAE

●**莙荴菜** 猪鬃菜、甜菜、莙菜、牛皮菜

Beta vulgaris L.

var. *cicla* L.

区内各地。

蔬菜。叶带红色的品种，可栽培供观赏。

盐巴米 红盐菜

Chenopodium amaranticolor Coste et Reyn.

凌云、乐业、隆林。

常有栽培。种子含淀粉，可食；嫩苗可作菜。

土荆芥(注) 沙塘香草、鹅脚草、臭藜藿、钩虫草

C. ambrosioides L.

区内各地。

全草有毒，驱虫，止痒；驱钩虫、蛔虫，治脚癣，皮肤湿疹，搔痒，小儿麻疹脱痂(外洗)，毒虫咬伤。

藜 小藜、沙苋菜

C. serotinum L.

(*C. album* sensu Merr. et Chun, non L.)

区内各地。

嫩苗、叶可作蔬菜和猪饲料。外洗疮疖疥癣。

注：本种和唇形科的“土荆芥”不同，不可混用。

Kochia-Achyranthes

地肤 扫帚菜

Kochia scoparis (L.) Schrad.

柳州、百色。

果利尿通淋，清湿热；治小便不利，湿热淋症，皮肤热毒，搔痒流水。又供观赏。

★菠菜 菠薐、角菜

Spinacia oleracea L.

区内各地。

栽培蔬菜。

南方硷蓬

Suaeda australis (R.Br.) Moq.

潮湿海滩上或粘性盐积土上。

盐土指示植物。

63 苋 科 AMARANTHACEAE

土牛膝(注) 倒刺草

Achyranthes aspera L.

区内各地。

全株清热发表，利水通淋，强筋散血；治感冒发热，暑热头痛，尿路结石，肾炎水肿，风湿腰腿痛。

牛膝

A. bidentata Bl.

区内各地。

根生用，活血通经；治产后腹痛，月经不调，经闭，鼻血，虚火牙痛，脚气水肿；熟用，补肝肾，强腰膝；治腰膝酸痛，肝肾亏虚，跌打瘀痛。

注：菊科的兰草亦有称作土牛膝，为治白喉良药，但不能作牛膝用。

长叶牛膝 柳叶牛膝

A. longifolia Mak.

龙胜。

用途和牛膝相同，但功效较次。

无毛白花苋

Aerva glabrata Hk.f.

河池、梧州。

白花苋

A. sanguinolenta (L.) Bl.

(*Achyranthes sanguinolenta* L.,

Aerva scandens (Roxb.) Wall.)

龙州、平果、靖西、那坡、田林、隆林、都安、东兰、河池、天峨、柳州、贵县。

全草可供药用。

虾钳菜 莲子草、节节花、米子草、白花仔

Alternanthera sessilis (L.) R.Br.

区内各地。

全草清热解毒，散瘀止痒，催乳；治蛇伤，疖肿，湿疹，皮炎，热结便秘，乳汁不足，跌打。嫩叶可食和作猪饲料。

*红草 红绿草

A. versicolor Hort. ex Regel

公园或花坛栽培的观赏植物。

水苋菜 老枪谷、红米菜

Amaranthus caudatus L.

都安、隆林、凌云、乐业、桂林、永福。

嫩叶可作蔬菜。又为观赏植物。根滋补强壮；治虚损。

Amaranthus

●白花老枪谷

A. caudatus L.

var. *albiflorus* Hort.

草本花卉。

●红叶老枪谷

A. caudatus L.

var. *atropurpureus* Hort.

草本花卉。

反枝苋

A. retroflexus L.

梧州。

华北地区有将本种作青葙子用。

刺苋 蕺苋菜

A. spinosus L.

区内各地。

全草清热除湿，凉血解毒；治急性菌痢，腹泻，痔疮出血，溶血性毒蛇咬伤，疖肿，预防麻疹等。孕妇忌服。亦可作猪饲料和野菜。

●苋 苋菜

A. tricolor L.

(*A. gangeticus* L.)

栽培蔬菜。

全株清热明目，利大小便。

野苋

A. viridis L.

区内各地。

根治菌痢，蛇伤。茎、叶可作猪饲料和野菜。

青葙 野鸡冠

Celosia argentea L.

区内各地。

种子清肝明目；治眼红肿痛，怕光流泪，急性结膜炎，眼睛生翳，支气管哮喘，皮肤搔痒；煎汁滴鼻，治鼻出血。嫩茎、叶煮去苦味，可作菜和猪饲料。种子含油，可供食用。

*鸡冠花

C. argentea L.

var. *cristata* (L.) Ktze.

(*C. cristata* L.)

栽培花卉。

种子亦作青箱子用。花序、种子止血，收敛止泻；治赤白痢，痔疮出血，肠出血，吐血，衄血，子宫出血。

杯苋

Cyathula prostrata (L.) Bl.

(*Achyranthes prostrata* L.)

梧州、大瑶山、宁明、那坡。

全草治跌打，驳骨。

地灵苋

Deeringia amaranthoides (Lam.) Merr.

南宁、龙州、靖西、那坡、百色、隆林、凌云、凤山、河池。

全株祛风除湿，通经活络；治风湿性关节炎，风湿腰腿痛等；炖猪肉吃，治夜盲。

*千日红 火球花

Gomphrena globosa L.

栽培花卉。

花序治咳嗽，气喘。

• 血苋

Iresine herbstii Hk.f.

栽培花卉，花坛植物。

茎、叶治吐血。桂西农民，有用其叶染红糯米饭。

64 落葵科 BASELLACEAE

落葵 藤菜、红藤菜、豆腐菜

Basella rubra L.

桂林、灵山、梧州、贵县、宁明、那坡、百色；桂南也有栽培。

药用全草和珠芽，滋补强壮，清热润肠，消肿散瘀；治久病体弱，便秘，疖肿，跌打损伤，骨折。花汁清热解毒，解痘毒，治乳头破裂。常栽作蔬菜。本品含维生素A₃、P₂，皂素及胶质。

65 亚麻科 LINACEAE

• 亚麻

Linum usitatissimum L.

纤维和油料作物。种子油供食用或作油漆、涂料和油墨原料。种子入药，治肠燥便秘，病后虚弱，眩晕等症。亚麻油内服为滑润剂，缓泻，可作软膏基质。亚麻纤维长，拉力强，供纺织等用。

• 石海椒

Reinwardtia indica Dum.

(*R. trigyna* Pl.)

桂林有栽培。

木本花卉。

米念芭

Tirpitzia ovoidea Chun et How, ined.

柳州、罗城、巴马、凤山、藤县、武鸣、上林、龙州、大新、靖西、德保。

茎、叶治跌打。

青篱柴 梯苳木、青皮柴

T. sinensis (Hemsl.) Hall.

(*Reinwardtia sinensis* Hemsl.)

临桂、平乐、凤山、天峨、南丹、都安、河池、东兰、凌云、靖西、那坡、德保、田林、隆林。

66 蒺藜科 ZYGOPHYLLACEAE

蒺藜

Tribulus terrestris L.

百色、柳州。

果平肝开郁，散风明目，通乳通经；治肝旺头晕头痛，风火眼红多泪，白瘰风，催乳。种子可榨油，供工业用。茎皮纤维可造纸。

67 牻牛儿苗科 GERANIACEAE

华中老鹳草☆

Geranium franchetii Knuth

隆林、田林、凌云、东兰。

用途参阅南老鹳草。

南老鹳草☆ 老鹳草、尼泊尔老鹳草

G. nepalense Sweet

Geranium-Biophytum

隆林、田林、凌云、那坡、南丹、大苗山。

全草舒筋活络，消肿接骨，抗菌消炎；治风湿麻痹，风湿关节炎，跌打，骨折，外伤出血，久年烂疮，口腔炎，支气管炎。

鼠掌老鹤草☆ 西伯利亚老鹤草

G. sibiricum L.

全州、资源、兴安。

用途参阅南老鹤草。

★香叶

Pelargonium graveolens L. Her.

栽培芳香、药用，观赏植物。

全株含芳香油，可供调配食用、皂用等香精。全草治风湿，阴囊湿疹，疥癣。

★天竺葵 木海棠

P. hortorum Bail.

花卉。

69 酢酱草科 OXALIDACEAE

★阳桃

Averrhoa carambola L.

梧州、藤县、平南、桂平、容县、都安、宁明、龙州、田阳、百色、桂林等地，以桂平、平南、藤县较多。

华南有名水果之一。实生苗的果极酸，可供腌渍或蜜饯。叶利尿，外敷能止痛，散热毒，止血，拔毒生肌；治疮疖。

分枝感应草

Biophytum esquirolii Lévl.

隆林、天峨。

感应草

***B. sensitivum* (L.) DC.**

贵县、邕宁、扶绥、龙州、东兰。

全株消肿；治水肿。

酢酱草

酸味草、黄花酢酱草

***Oxalis corniculata* L.**

(*O. repens* Thb.)

区内各地。

全株清热解毒，利尿，活血，散瘀消肿；治感冒，咽喉肿痛，肠炎腹泻，尿路感染，风湿性关节炎，跌打扭伤肿痛，烫火伤，过敏性皮炎，漆疮，皮肤湿疹，脚癣，疖肿。茎叶含草酸，可擦镜和铜器。

粘酢酱草

***O. corniculata* L.**

var. *viscidula* Wiegld.

罗城。

红花酢酱草

大酸味草

***O. corymbosa* DC.**

(*O. maritima* Zucc)

区内各地。

用途参阅酢酱草。

三角叶酢酱草

***O. griffithii* Edgew. et Hk.f.**

全州、龙胜、大苗山、田林、凌云。

全草治毒疮，拔子弹。

70 金莲花科 TROPAEOLACEAE

*金莲花

Tropaeolum majus L.

栽培花卉。

71 凤仙花科 BALSAMINACEAE

密齿凤仙

Impatiens amabilis Hk f.

大瑶山。

*凤仙花 急性子、指甲花、灯盏花

I. balsimina L.

栽培花卉。

种子(急性子)降气散瘀，软骨哽；治经闭，积块，骨哽卡喉。

根、叶有小毒，也可治骨哽卡喉。花解毒；治蛇伤。

华凤仙

I. chinensis L.

南宁、大明山、马山、柳州等地。

全株清热解毒，消肿；治毒疮。

棒凤仙

I. claviger Hk.f.

凌云、十万大山。

茎、叶治热疮。

杯花凤仙

I. cyathiflora Hk.f.

容县。

毛凤仙

I. lasiophyton Hk.f.

大苗山。

水猪菜

I. mengtziana Hk.f.

容县、阳朔、大苗山、凌云。

红纹凤仙

I. rubro-striata Hk.f.

大瑶山。

水指甲

I. siculifer Hk.f.

罗城。

大叶水指甲

I. siculifer Hk.f.

var. *porphyrea* Hk.f.

大苗山、龙胜、阳朔、凌云。

72 千屈菜科 LYTHRACEAE

浆果水苳 细叶水苳

Ammannia baccifera L.

南宁、钟山、昭平、阳朔、临桂。

尾叶紫薇

Lagerstroemia caudata Chun et How, ined.

全州、灵川、桂林、临桂、阳朔。

木材供家具和建筑用。

紫薇 紫金花

L. indica L.

区内各地。

花美丽,供庭园绿化。叶治产后吐血下血,外洗湿疹;根水煎服,解黄藤毒。

桂林紫薇

L. kweilinensis S.Lee et L.Lau, ined.

桂林、平乐。

庭园绿化植物。

***大花紫薇 大叶紫薇**

L. speciosa (L.) Pers.

梧州。

根、叶收敛解热。花美丽,供庭园绿化。木材坚硬耐腐,为家具、建筑用材。其经济价值足与柚木比拟。

狭瓣紫薇

L. stenoptera Chun

临桂。

南紫薇

L. subcostata Koehne

临桂、灵川、永福、大瑶山、平南、贵县。

花败毒散瘀。木材供建筑、枕木等用。

网脉紫薇☆

L. suprareticulata S.Lee et L.Lau, ined.

大明山、龙州。

***散沫花 指甲花**

Lawsonia inermis L.

宁明、龙州。

花极香，可供绿化。叶可取红色染料。

绒毛千屈菜

Lythrum salicaria L.

var. *tomentosum* DC.

灵川、桂林、临桂。

草本花卉。

普通千屈菜

L. salicaria L.

var. *vulgare* DC.

阳朔、桂林。

草本花卉。

异叶节节菜

Rotala diversifolia Koehne

桂林。

节节菜 碌耳草

R. indica (Willd.) Koehne

(*Ammannia peploides* Spreng.)

宁明、龙州、隆林、大苗山、昭平、苍梧、平南。

全草治热疮。嫩苗可食，又可作猪饲料。

海滨薄瓣节节菜

R. leptopetala Koehne

var. *littorea* Miq.

柳州。

五数薄瓣节节菜

R. leptopetala Koehne

var. *pentamera* Koehne

平南、南宁、百色。

圆叶节节菜 水瓜子、过塘蛇

R. rotundifolia (Buch.-Ham.) Koehne
(*Ammannia rotundifolia* Buch-Ham.)

区内各地。

全草解毒；治蛇伤。

● 虾子花

Woodfordia fruticosa (L.) Kurz

隆林、凌云、东兰。

花收敛；治痢疾，月经不调。树皮可提取栲胶。又可供庭园绿化用。

74 海桑科 SONNERATIACEAE

八宝树 米达栋

Duabunga grandiflora (Roxb. ex DC.) Walp.
(*D. sonneratioides* Buch-Ham.)

宁明、那坡。

75 安石榴科 PUNICACEAE

● 石榴 安石榴

Punica granatum L.

灌阳、全州较多。

果皮、根皮收敛，止泻，驱虫；治久泻久痢，便血，脱肛，驱蛲虫，又可治遗精，白带。花可治吐血，衄血，中耳炎。亦为果树和庭园绿化树木。

*白石榴 白石榴花

P. granatum L.

var. *albescens* DC.

供庭园绿化。

*千瓣白石榴

P. granatum L.

var. *multiplex* Sweet

供庭园绿化。

*千瓣红石榴

P. granatum L.

var. *pleniflora* Hayne

供庭园绿化。

77 柳叶菜科 ONAGRACEAE

露珠草

Circaea cordata Royle

(*C. cardiophylla* Mak.)

全州。

水珠草 虱子草

C. mollis S. et Z.

(*C. quadrisulcata* Fr. et Sav.)

龙胜、大苗山、凌云。

光华柳叶菜

Epilobium cephalostigma Hsskn.

兴安、龙胜、大苗山。

柳叶菜

E. hirsutum L.

灌阳、兴安、灵川、大苗山、东兰。

苗、叶可作蔬菜。

草龙 假水瓜

Jussiaea linifolia Vahl

区内各地。

全株清热拔毒，凉血消肿；治感冒发热，咽喉肿痛，口腔炎，疮疖。

过塘蛇 水龙、鱼泡菜

J. repens L.

区内各地。

全株清热利尿，拔毒消肿；治感冒发热，热淋，疮疖，带状疱疹，蛇伤，狗咬伤。可作鱼饲料。

毛草龙 扫锅草

J. suffruticosa L.

(*J. erecta* L.)

区内各地。

全株清热解毒，凉血消肿；治咽喉肿痛，口腔炎，乳腺炎，天泡疮，发烧。

细花丁香蓼

Ludwigia caryophylla (Lam.) Merr. et Metc.

(*Jussiaea caryophylla* Lam.,

L. parviflora Roxb.)

苍梧、贵县、容县、三江、巴马等地。

丁香蓼

L. prostrata Roxb.

邕宁、南宁、柳州、柳城等地。

全草清热利水；治湿热腹泻，淋病，水肿。

*月见草

Oenantha biennis L.

草本花卉。根和嫩叶可作蔬菜。

*待霄草 夜来香

O. odorata Jacq.

种子含油，可供食用。花含芳香油，为香精原料。茎皮纤维可作人造棉原料。草本花卉。

77A 菱 科 HYDROCARYACEAE

*菱 菱角

Trapa bicornis Osb.

(*T. bispinosa* Roxb.)

区内各地。

果益肾利水；治白浊，遗精，带下，小便失禁。果含淀粉丰富，可生食或熟食，提取的淀粉即“菱粉”，供制糕点，酿酒，熬糖或浆纱。果壳可提取鞣料。全株可作猪饲料。

78 豆瓣草科☆(小二仙科) HALORAGACEAE

黄花船板草☆

Haloragis chinensis (Lour.) Merr.

十万大山、陆川。

全株驳骨。

船板草 小二仙草、豆办草

H. micrantha (Thb.) R.Br. ex S. et Z.

容县、十万大山、武鸣、龙州、昭平、临桂、桂林、龙胜、全州、罗城、大苗山、大瑶山等地。

全草清热解毒，利水除湿，散瘀消肿；治疗瘰，赤痢，水肿，烫伤，跌打，蛇伤。羊的好饲料。

菜

Myriophyllum spicatum L.

区内各地，常生水塘中。

全草清凉解毒；治慢性下痢。

79 水马齿科 CALLITRICHACEAE

水马齿

Callitriche stagnalis Scop.

散见水塘中。

81 瑞香科 THYMELAEACEAE

白木香 沉香、土沉香、牙香树、莞香

Aquilaria sinensis (Lour.) Gilg.

陆川、博白、北流、南宁、崇左、东兴、浦北。

老干或树根受伤后，分泌树脂，日久沉积而成沉香。沉香降气，

温中，暖肾；治心腹痞满疼痛，老年虚寒气逆，呕吐，腰膝虚冷；又可提芳香油，作调香原料。茎皮温中理气，降逆；治百日咳，支气管炎，胃胀气痛。枝皮纤维韧性强，可制人造棉、打字蜡纸、钞票纸。花含芳香油，可制浸膏。种子油供制肥皂、鞣皮油、润滑油。

小叶瑞香

Daphne championi Benth.

三江、大苗山、融安、贵县。

茎皮纤维柔韧，为打字蜡纸、复写纸等高级纸原料，又可制人造棉。

瑞香

D. odora Thb.

var. *atrocaulis* Rehd

龙胜、临桂、桂林、阳朔、三江、百色。

根、皮、叶祛风除湿，活血止痛；治风湿关节痛，坐骨神经痛，跌打，眼痛。枝、叶、花可作农药。茎皮纤维为打字、复写纸等高级纸和人造棉原料。鲜花含芳香油，是名贵香料之一。

白瑞香

D. papyracea Wall.

(*D. cannabina* Wall.)

全州、资源、龙胜、灵川、临桂、桂林、大苗山、大瑶山、宜山、凌云、乐业等地。

根祛风除湿，活血止痛；治风湿关节痛，跌打。茎皮纤维可制打字、复写纸等高级纸，又可制人造棉。

●结香 芫花、三叉树、蒙花(注)

Edgeworthia chrysantha Lindl.

资源、桂林、灵川、融水等地。各地有少量栽培。

根治跌打损伤。茎皮纤维可制打字、复写纸等高级纸，也可制人造棉。剥皮后的枝条，可制提篮等用具。花、叶作兽药，治牛跌打损伤，瘤胃等症。又供观赏。

注：四川、湖北一些地区所叫的“蜜蒙花”为本种的花蕾，也称新蒙花、蒙花球。但现全国大部分地区用的是本草纲目所载的蜜蒙花（又称老蒙花），是马钱科植物，和本种不同。

了哥王 南岭茛花、地棉皮

Wikstroemia indica (L.) C. A. Mey.

区内各地。

全株有毒。药用根、茎、叶，清热解毒，消肿散结；外敷治疗疮，痈疖，指头蜂窝组织炎，跌打损伤；根久煎减低毒性后内服，治风湿骨痛，跌打，支气管哮喘，百日咳，腮腺炎，扁挑体炎。茎皮富含纤维，可制打字、复写纸等高级纸和人造棉。根、叶水煮液或粉剂可防治稻螟、蚜虫、地老虎、天牛等害虫和子子、蝇、蛆；又可毒鱼。种子含油，可供制皂。

北江茛花 山棉皮

W. monnula Hce.

(*W. stenantha* Hemsl.)

全州、龙胜、罗城、大瑶山。

茎皮纤维可制打字、复写纸、浇版纸等高级纸和人造棉。

细轴茛花 地棉麻

W. nutans Champ.

钦州、十万大山、博白、容县、邕宁、大新、宾阳、宁明、德保、柳州。

茎皮纤维可制打字、复写纸、钞票纸和人造棉。

厚轴茛花

W. pachyrachis S. L. Tsai

宁明。

茎皮纤维可制高级用纸和人造棉。

圆锥茛花

W. paniculata H. L. Li

靖西、德保。

茎皮纤维可制纸和人造棉。

83 紫茉莉科 NYCTAGINACEAE

黄细心

Boerhaavia diffusa L.

田林、西林。

*九重葛 宝巾、勒杜鹃、三角花、叶子花

Bougainvillea glabra Choisy

南宁。

花卉。

*美丽叶子花 毛宝巾

B. spectabilis Willd.

南宁。

花卉。

*紫茉莉 胭脂花

Mirabilis jalapa L.

南宁、桂林等地。

花卉。全草有毒。根清热利湿，消肿解毒，活血调经；治尿路感染，前列腺炎，白带，糖尿病，跌打损伤，闭经；根、叶捣烂外敷，治疮疖，乳腺炎，跌打。果实内粉末调水涂抹，治葡萄疮（皮肤起水泡，溃破流黄水）。根、茎和种子均有泻下作用。孕妇忌服。

84 山龙眼科 PROTEACEAE

*银桦

Grevillea robusta Cunn.

原产澳洲，区内各地有少量栽培。

花红美丽，可作行道树或庭园树。木材适作车辆、家具、细工用材。

Helicia

红叶树 越南山龙眼、羊屎果

Helicia cochinchinensis Lour.

区内各地林区。

种子含脂肪油，可提取供食用或制肥皂、润滑油等。又富含淀粉，但有毒，含有氢氰酸，用水浸泡去毒后，才可食。木材可制家具，又是优良薪炭材和蜜源树木。

海南山龙眼

H. hainanensis Hayata

东兴、十万大山、邕宁、靖西、凌云、乐业。

种皮可作染料原料。

长柄山龙眼

H. longipetiolata Merr. et Chun

十万大山。

倒卵叶山龙眼

H. obovatifolia Merr. et Chun

(*H. vestita* W.W.Sm.

var. *mixta* Li, p.p.)

十万大山。

果含淀粉，可供酿酒或提取淀粉供糊料等用。

长倒卵叶山龙眼

H. obovatifolia Merr. et Chun

var. *mixta* (Li) Sleum.

(*H. vestita* W.W.Sm.

var. *mixta* Li, quoad typ.,

H. vestita Li, non W.W.Sm.)

十万大山、大瑶山。

果含淀粉，可供酿酒和提取淀粉供糊料等用。

网脉山龙眼

***H. reticulata* W.T.Wang**

区内各地林区。

果含淀粉，但有毒，含氢氰酸，用水浸泡去毒后，才可食。木材可制家具，亦是薪炭材。

小叶网脉山龙眼

***H. reticulata* W.T.Wang**

var. *parvifolia* W.T.Wang

玉林、十万大山、上林、大瑶山、融安、大苗山、永福、临桂、桂林。

用途参阅网脉山龙眼。

山龙眼

***H. taiwaniana* Hemsl.**

(*H. tsangii* H.L.Li,

H. silvicola auct. non W.W.Sm.,

H. taiwaniana Hemsl.

var. *oblanceolata* Sleum.)

东兴、十万大山、龙州大青山、那坡。

种子含淀粉，但有毒，用水浸泡去毒后，才可食用。

顶序山龙眼

***H. terminalis* Kurz**

十万大山。

假山龙眼

***Heliciopsis henryi* (Diels) W.T.Wang**

(*Helicia henryi* Diels)

百色、十万大山。

调羹树

H. lobata (Merr.) Sleum.

(*Helicia lobata* Merr.,

H. caulifloroides W.T.Wang)

十万大山、龙州。

85 五桠果科(第伦桃科) DILLENACEAE

大花五桠果 山枇杷、大花第伦桃

Dillenia turbinata Fin. et Gagn.

(*D. heterosepala* Fin. et Gagn.)

东兴、浦北、上思、灵山、陆川、博白、北流、玉林、桂平、邕宁、马山、大新、龙州、那坡、田林。

木材稍软而重，适作桩木、矿柱、建筑和家具。果酸甜可食。树皮和叶含单宁，可作鞣料原料。

锡叶藤 涩叶藤、涩沙藤、水车藤

Tetracera asiatica (Lour.) Hoogl.

(*T. scandens* sensu Merr., non Merr.)

灵山、合浦、十万大山、苍梧、梧州、陆川、博白、贵县、横县、邕宁、宁明、龙州等地。

全株收敛止泻，消肿止痛；治肠炎，菌痢，风湿关节痛，子宫脱垂，白带。叶可磨光锡器。茎皮纤维可制绳索，耐水坚韧，常用以捆扎水车和作船缆等。

87 马桑科 CORIARIACEAE

马桑 马鞍子、黑果果

Coriaria sinica Maxim.

河池、天峨、凌云、乐业、隆林、田林、龙胜。

全株有毒,嫩叶、果和种子更毒(注)。根祛风,燥湿,止痒;治风湿麻木,瘰癧。叶收敛,杀虫;干叶研粉调油敷,治烧伤,湿疹,疥癣,毒疮。全株作土农药,水浸液防治蚜虫、螟虫、红蜘蛛、水稻负泥虫、稻螟、稻青虫等,又可杀孑子和蛆。茎、叶含单宁,可提制栲胶。种子油可制油漆、油墨等。

88 海桐花科 PITTOSPORACEAE

绉叶海桐 辣椒木

Pittosporum baileyianum Cowda

十万大山。

短萼海桐

P. brevicalyx (Oliv.) Gagn.

凌云。

光叶海桐 一朵云、崖花子、长果满天香

P. glabratum Lindl.

区内各地。

根祛风活络,消肿解毒,活血止痛;治风湿性关节炎,跌打骨折,产后风瘫,胃痛,毒蛇咬伤,疮疖肿毒。叶研粉外敷,治外伤出血。茎皮纤维可制纸。种子油可制肥皂。

狭叶崖花子☆ 夹竹桃叶崖花子

P. glabratum Lindl.

var. *neriifolium* R. et W.

隆林、乐业、大苗山、兴安。

用途参阅光叶海桐。

注:寄生在马桑上的桑寄生等植物也因马桑有毒而变为有毒,用时宜慎!

Pittosporum

少果海桐

P. illicioides Mak.

(*P. oligocarpum* Hay.,

P. oligospermum Hay.,

P. sahnianum Gowda)

全州、大瑶山。

根活血散瘀；治跌打。

滇桂海桐☆

P. johnstonianum Gowda

大苗山。

西南海桐☆

P. kobuskianum Gowda

全州、兴安、大苗山、大瑶山。

细萼海桐

P. leptosepalum Gowda

全州、临桂、十万大山。

根皮祛风湿；治风湿骨痛。

卵叶海桐

P. ovoideum Gowda

阳朔、永福、临桂、桂林、罗城、大瑶山。

疏花海桐

P. pauciflorum Hk. et Arn.

全州、恭城、兴安、龙胜、临桂、罗城、凌云、大瑶山、宁明。

黄珠子

P. perryanum Gowda

大苗山、河池、凌云。

柄果海桐

P. podocarpum Gagn

凌云、那坡。

狭叶柄果海桐

P. podocarpum Gagn.

var. *angustatum* Gowda

全州。

四子海桐花

P. tetraspermum W. et A.

罗城、南丹、东兰、乐业。

海桐花

P. tobira (Thb.) Ait.

梧州、南宁、柳州、桂林等地有少量栽培。

庭园观赏树木，蜜源植物。

三角果海桐

P. trigonocarpum Lévl.

平头海桐花

P. truncatum Pritz.

南丹。

91 红 木 科 BIXACEAE

* 红木

Bixa orellana L.

南宁、梧州。原产热带美洲。

供观赏用。包裹种子的果瓢含黄色素，即安那多黄，可作糖果等的染料。

93 大风子科 FLACOURTIACEAE

山桂花☆ 短柄本勒木

Bennettiodendron brevipes Merr.

容县、横县、宁明、龙州、田林、河池、南丹、东兰、凤山、阳朔、临桂、恭城。

长柄山桂花☆ 长柄本勒木

B. longipes (Oliv.) Merr.

河池。

疏花山桂花☆ 疏花本勒木

B. pauciflorum C.Y.Wu, ined.

十万大山、宁明、龙州。

刺篱木

Flacourtia indica (Burm.f.) Merr.

(*Gmelina indica* Burm.f.,

Flacourtia parvifolia Merr.)

合浦。

大叶刺篱木 山桩、牛牙果

F. rukam Zoll. et Mor.

邕宁、大新、宁明、龙州、靖西、那坡、百色、天峨、大瑶山、蒙山。

果可食，宜制果酱或蜜饯。木材坚硬，可作杵及农具柄。

海南大风子 米尾加、米亨加、青兰木

Hydnocarpus hainanensis (Merr.) Sleum.

(*Taraktogenos hainanensis* Merr.)

龙州、宁明。

种子有毒，燥湿杀虫，可制成大风子油，治麻风，疥癣，梅毒。

木材可供建筑、桥梁、车辆、造船、家具等用。

广西大风子

H. kwangsiensis Tsiang et Ling

(*H. merrillianus* Li, non Sleum.,

Taraktogenos merrillianus (Li) C.Y.Wu)

龙州、宁明、扶绥、凭祥大青山。

木材供建筑、车船、家具等用。

山桐子 椅、商木

Idesia polycarpa Maxim.

全州、资源、恭城、兴安、龙胜、临桂、桂林、贺县、大瑶山、

大苗山、南丹、凌云、乐业、田林、隆林、扶绥。

韧皮可取纤维。种子油可代桐油。优良庭园树和行道树。木材较软，易加工，供板料、器具、板鞋等用。

伊桐 米稔怀、牛眼果、白身树、嚙当鸣、弄七

Itoa orientalis Hemsl.

恭城、阳朔、蒙山、巴马、龙州、德保、靖西、那坡、百色、田林、隆林。

可作行道树、庭园树。

鲁花 黄杨刺柃

Scolopia buxifolia Gagn.

大瑶山。

刺柃 土乌药

S. chinensis (Lour.) Clos

合浦、十万大山、贵县、博白、玉林、容县、北流、藤县、邕宁、南宁、上林、武鸣、那坡。

全株活血散瘀；治跌打。

Scolopia-Casearia

白皮 广东刺柃

S. saeva Hance

德保。

良好材用树种。

柞木 刺凿

Xylosma congestum (Lour.) Merr.

(*X. racemosum* (S. et Z.) Miq.,

X. japonicum (Walp.) A. Gray,

Flacourtia chinensis Clos)

资源、兴安、临桂、灵川、桂林、阳朔、永福、平乐等地。

叶散瘀消肿；治跌打扭伤，骨折，脱臼。树皮可治黄疸。木材坚

硬，可作油榨楔子、车轴等。种子油可制肥皂。

南岭柞木 米多鸡

X. controversum Clos

桂林专区、大苗山、罗城、东兰、凤山、天峨、南丹、凌云、乐

业、百色、平果、那坡、德保、龙州、大明山、十万大山。

长叶柞木

X. longifolium Clos

合浦、灵山、梧州、邕宁、南宁、那坡。

用途参阅柞木。

94 天料木科 SAMYDACEAE

嘉赐树 鳊鱼脑(苍梧)

Casearia glomerata Roxb.

十万大山、梧州、邕宁、南宁、扶绥、百色。

根、叶治跌打。木材可作箱板、建筑用材。

毛脉嘉赐树

C. glomerata Roxb.

forma *pubinervis* How et Ko

东兴。

用途参阅嘉赐树。

红花木 母生、膜叶嘉赐树

C. membranacea Hance

东兴、十万大山、大瑶山、扶绥。

木材为建筑、板料、器具用材。

毛嘉赐树 脚骨脆

C. villilimba Merr.

东兴、合浦、浦北、十万大山、大瑶山、大明山、扶绥、崇左、

大新、罗城、平果、靖西、那坡、田阳、凌云、大苗山。

短萼天料木

Homalium brevisepalum How et Ko

东兴。

天料木

H. cochinchinense (Lour.) Druce

(*H. fagifolium* Lindl.)

大瑶山、临桂、兴安。

木材可供建筑、造船、制家具等用。

广西天料木

H. kwangsiense How et Ko

龙州。

木材可作家具用材。

柳叶天料木

H. sabiaefolium How et Ko

龙州。

98 怪柳科 TAMARICACEAE

* 怪柳

Tamarix chinensis Lour.

桂林。

嫩枝和叶含槲皮黄醌素等，透表解热，利尿解毒；治感冒，麻疹未透，水痘，解酒毒。亦供观赏。

101 转心莲科(西番莲科) PASSIFLORACEAE

蒴莲

Adenia chevalieri Gagn.

马山、龙州、靖西、都安。

* 转心莲 西番莲、转枝莲、时计草

Passiflora caerulea L.

叶祛风清热；治风热头昏，鼻塞流涕。花卉。

杯叶转心莲☆ 杯叶西番莲、羊蹄草、半截叶、四方台

P. cupiformis Mast.

(*P. franchetiana* Hemsl.,

P. kwangsiensis Li,

P. sequinii Lévl. et Van.)

天峨、南丹、宜山、东兰、凤山、凌云、田林、隆林。

全草和根解毒，散瘀活血；治蛇伤，跌打损伤。

* 鸡蛋果

P. edulis Sims

桂林、南宁、龙州。

果瓤多汁，可生食，亦作蔬菜，饲料，又可加糖等制成芳香饮料。种子油可食，可制皂，制油漆。花美丽，供观赏。

龙珠果

P. foetida L.

北流、南宁、宁明、龙州、田阳、百色。

果味甜，可食。

广东转心莲 广东西番莲

P. kwangtungensis Merr.

全州、罗城、大瑶山。

蝴蝶藤

P. papilio H L.Li

贵县、来宾、武鸣、龙州、乐业。

全草解毒；治蛇伤。

*大转心莲☆ 大西番莲、日本瓜

P. quadrangularis L.

龙州。

果肉可生食或作蔬菜、猪饲料，亦可制成饮料或调味品。

毛蛇王藤☆ 泰国西番莲

P. siamica Craib

桂平十八山。

103 葫 芦 科 CUCURBITACEAE

盒子草

Actinostemma lobatum (Maxim.) Maxim.

邕宁、南宁、龙州。

种子油可供食用、制皂用。

*冬瓜

Benincasa hispida Cogn.

区内各地。

Benincasa-Cucumis

蔬菜。冬瓜皮清热止渴，利尿消肿；治水肿。冬瓜子清热利水，止咳，润肠；治小便淋痛，白浊，白带，水肿，咳嗽。鲜瓜瓢治火药伤。

***节瓜**

***B. hispida* Cogn.**

var. chieh-qua How

区内各地。

蔬菜。

***西瓜**

***Citrullus vulgaris* Schrad.**

区内各地。

水果。西瓜翠(果皮)清热利水，解暑；治肾炎浮肿，小便不利，暑热烦渴，解酒毒。瓜藤可作造纸及人造丝原料。种子食用。

***香瓜 甜瓜**

***Cucumis melo* L.**

区内各地。

水果。种子油供食用、制皂用。

***白瓜 梢瓜、越瓜**

***C. melo* L.**

var. conomon (Thb.) Mak.

区内各地。

蔬菜。

***黄瓜 胡瓜**

***C. sativus* L.**

区内各地。

蔬菜。

*南瓜

Cucurbita moschata Duch.

区内各地。

蔬菜。南瓜子能驱虫、杀虫；治虫积腹痛，对血吸虫有抑制和杀灭作用；和槟榔同用，治绦虫。南瓜蒂外用治疗疮。南瓜子油供食用、制皂用。叶可提取食用绿色素；叶制土农药，可杀蚜虫。瓜藤纤维为人造棉原料。

毒瓜

Diplocyclos palmatus (L.) C. Jeffr.

(*Bryonopsis laciniosa* sensu Merr.,
non Naud. sensu stricto)

龙胜。

果和根有毒，果含欧薯甙。

金瓜 越南裸瓣瓜

Gymnopetalum cochinchinensis (Lour.) Kurz

(*G. chinense* (Lour.) Merr.)

博白、苍梧、龙州、都安、凌云。

三叶绞股蓝

Gymnostemma laxum (Wall.) Cogn.

龙州、大瑶山。

绞股蓝

G. pentaphyllum (Thb.) Mak.

龙州、那坡、都安、大瑶山、大苗山、临桂、灵川、龙胜。

金龟莲 金盆

Hemsleya amabilis Diels

环江。

Hemsleya-Luffa

块根清热解毒，消炎；治咽喉肿痛，虚火牙痛，菌痢，肠炎。

地糍粑 大五月五

H. elongata Kuang, ined.

全州、资源、龙胜、大苗山。

块根含丰富淀粉，可取淀粉和酿酒。

纤花金盆☆

H. graciliflora (Harms) Cogn. vel aff.

百色。

三叶金盆☆

H. trifoliolata Cogn.

容县。

油渣果 油瓜、猪油果

Hodgsonia macrocarpa (Bl.) Cogn.

南宁、百色两地区，凤山、东兰、上思、博白。桂林、柳州等地有栽培。

种子含油丰富，供食用。

*葫芦

Lagenaria siceraria (Molina) Standl.

(*L. leucantha* Rusby;

L. vulgaris Ser.)

区内各地。

嫩果供食用。果壳、种子利尿消肿；治水肿，口渴烦热。坚硬的
老果壳可作饮器、容器、瓢等。种子油可制皂。

*丝瓜 棱角丝瓜

Luffa acutangula Roxb.

区内各地。

嫩果供菜用。老果除去果肉剩下的网状纤维即丝瓜络，清凉利

尿，凉血，通经络，解毒；治便血，血气作痛，崩漏，浮肿，痢疮，又能通乳汁。瓜络又可作鞋、帽衬垫物及供洗擦器物用。种子润燥；治便秘，腰痛。种子油供食用，制皂用。

*水瓜 普通丝瓜（《中国蔬菜栽培学》）

L. cylindrica (L.) Roem.

区内各地。

用途同丝瓜。鲜藤或鲜叶可治气管炎。

茅瓜

Melothria heterophylla (Lour.) Cogn.

博白、苍梧、横县、宾阳、邕宁、上林、武鸣、大新、宁明、

龙州、百色、田林、隆林、天峨、巴马、都安、柳州。

用途同老鼠拉冬瓜。块根含淀粉。

老鼠拉冬瓜 马麂儿

M. indica Lour.

博白、玉林、容县、贺县、昭平、大瑶山、邕宁、南宁、龙州、

桂林、阳朔、永福、兴安。

根或全草清热拔毒，消肿散结；治咽喉肿痛，腮腺炎，结膜炎，

睾丸炎；外用鲜根、叶捣烂或干根研粉调敷，治蜂窝组织炎，

皮肤湿疹，淋巴结核。

山冬瓜

M. javanica (Miq.) Cogn.

容县、龙州。

毛花马麂儿

M. maderaspatana (L.) Cogn.

富川、南宁、宁明、龙州、靖西、百色、隆林、都安。

野杜瓜 钮子瓜

M. maysorensis (W. et A.) Chang

Momordica

(*Bryonia maysorensis* W. et A.,

M. mucronata sensu Merr. non

(L.) Cogn., p.p.)

龙州、靖西、凌云、隆林、大苗山。

* 苦瓜

Momordica charantia L.

区内各地。

果供蔬食，又清热止渴；治烦热口渴，疮疖；鲜花、根治痢疾；叶治疮疖。

木鳖(注)

M. cochinchinensis (Lour.) Spreng.

区内各地有栽培，亦有野生。

种子即中药木鳖子，有毒，散血热，消痈肿；治痈疮，乳腺炎，痔疮，淋巴结核；鲜根捣烂外敷，治痈疮，无名肿毒，淋巴结核。作农药，能杀棉蚜、红蜘蛛、金花虫、菜青虫等，可毒鼠。种子油有毒，可掺和干性油使用。种子含木鳖子素和皂甙。

凹萼木鳖

M. eberhardtii Gagn.

邕宁、南丹、凌云。

* 罗汉果

M. grosvenori Swingle

桂林、永福、龙胜、兴安、资源、全州、融安、大瑶山、蒙山、马山、南宁、苍梧、梧州、玉林。栽培或野生。

果清热止渴，润肺止咳；治咳嗽，喉痛。鲜叶治癣。

注：番木鳖为马钱科植物，与木鳖子不同。

棒槌瓜

Neoalsomitra integrifoliola (Cogn.) Hutch.

(*Gymnostemma integrifoliola* Cogn.,

Alsomitra integrifoliola (Cogn.) Hay.)

宁明。

*手瓜☆ 佛手瓜、準人瓜

Sechium edule Sw.

(*Chayota edulis* Jacq.)

区内各地。

果、嫩苗和块根供蔬食，果亦可作蜜饯。

大苞赤瓟

Thladiantha calcarata (Wall.) C.B.Cl.

大苗山。

野西瓜

T. henryi Hemsl.

龙胜、龙州。

裸花赤瓟

T. nudiflora Hemsl.

龙胜。

蛇瓜

Trichosanthes anguina L.

南宁。

大苞栝楼

T. bracteata (Lam.) Voigt

龙州、凌云、乐业、隆林、天峨、凤山、南丹、河池、阳朔、富川。

天花公 意敬(瑶音)、野金瓜

T. chingiana H.-M.

凌云、田林、隆林、东兰、大明山、龙州、大瑶山、大苗山、
龙胜、资源、灵川、临桂、贺县、富川。

假栝楼 王瓜、山丝瓜藤、鸭屎瓜

T. cucumeroides (Ser.) Maxim.

永福、龙胜、兴安、大瑶山、大苗山、罗城、百色、隆林。

根有小毒(具催吐作用, 用量不宜过大), 清热解毒, 活血散瘀;
治毒蛇咬伤, 咽喉肿痛, 疮疖, 跌打。

栝楼 瓜蒌

T. kirilowii Maxim.

博白、玉林、容县、贺县、富川、永福、临桂、龙胜、全州、大
瑶山、大苗山、南宁、马山、龙州、靖西、东兰等地。

栝楼皮清热化痰, 润肺止咳, 开胸散结; 治肺热咳嗽, 胸脘痞
闷, 胸痹胁痛, 咽喉肿痛, 乳腺炎。种子(栝楼仁)润肠通便;
治大便燥结。根(天花粉)清热生津, 解毒消肿; 治消渴, 黄疸,
热病口渴, 痈肿疮疡, 乳腺炎。

多裂栝楼 多裂瓜蒌

T. multiloba Miq.

天峨、大瑶山、龙州。

果和种子可作药用, 但质量较次。

叉指叶栝楼 土花粉、山苦瓜、石蟾蜍

T. pedata Merr. et Chun

博白、玉林、梧州、昭平、阳朔、大苗山、龙州、宁明。
块根或全草清凉散毒; 治疮疖。

104 秋海棠科 BEGONIACEAE

石上海棠 石上莲

Begonia bretschnideriana Hemsl.

苍梧、宁明、龙州、那坡、大瑶山、阳朔、兴安。

全株解毒；治疮疖，蛇伤。

昌感秋海棠

B. cavaleriei Lévl.

(*B. esquirolii* Lévl.)

龙州。

野海棠

B. circumlobata Hance

陆川、大瑶山、都安、凤山、乐业。

粗喙秋海棠 大半边莲、红半边莲

B. crassirostris Irmsch.

(*B. aptera* sensu Merr. non Bl.)

博白、玉林、横县、龙州、梧州、藤县、永福、恭城、大瑶山、

罗城、河池、都安、凌云、田林、百色。

根和全草消肿止痛，清热解毒；治咽喉炎症，淋巴结核，疮疖，

跌打，蛇伤，烧伤。

三色秋海棠

B. dichroa Chun et F. Chun

南丹、靖西。

*秋海棠

B. evansiana Andr.

花卉。叶敷疮疖：根治蛇伤。

Begonia

紫背天葵 散血子、红叶

B. fimbriatipula Hance

贺县、阳朔、临桂、兴安、灵川、龙胜、大瑶山、大苗山、大明山、马山、凌云。

全草清热解毒，润燥止咳，散瘀消肿；治外感发热，肺热咳嗽，跌打肿痛，疮疖。

香秋海棠 短茎秋海棠

B. handelii Irmsch.

大瑶山、东兰、凤山、凌云。

全草治疮疖。花很香，可供观赏。

掌叶秋海棠

B. hemsleyana Hk. f.

龙州、那坡。

保亭秋海棠

B. howii Merr. et Chun

裂叶秋海棠 红天葵

B. laciniata Roxb.

区内各地。

全草清热解毒，润肺止咳，散瘀消肿；治感冒，急性支气管炎，肺炎，外敷跌打肿痛，疮疖。

*竹节秋海棠 竹节海棠

B. maculata Raddi

桂林、南宁。

观赏花卉，公园、花圃常见栽培。

天葵海棠

B. membranifera Chun et F. Chua

容县、大瑶山。

全草清热润肺；治咳嗽。

睡莲叶秋海棠

B. nymphaeafolia Yu

那坡。

全草清热润肺；治咳嗽。

***蜆肉秋海棠 蜆肉海棠、四季海棠**

B. semperflorens Link et Otto

观赏花卉，公园、花圃常有栽培。

七指莲

B. tetragona Chun et F.Chun

乐业。

根消肿毒；治疮疖。

106 木瓜科 (万寿果科、番木瓜科)

CARICACEAE

***木瓜 番木瓜、万寿果**

Carica papaya L.

桂南。

水果或蔬菜。果助消化，催乳；治产妇乳少，消化不良。干、叶、青果的乳汁可作橡皮糖原料；又可提取木瓜蛋白酶，供药用。

107 仙人掌科 CACTACEAE

***昙花**

Epiphyllum oxypetalum Haw.

城镇公园。

Hylocereus-Adinandra

栽培花卉。

*量天尺 霸王鞭、霸王花

Hylocereus undatus (Haw.) Britt. et Rose

桂南。

花清热润肺，止咳；治肺结核，支气管炎，颈淋巴结核，腮腺炎。常栽作绿篱。花卉。

*仙人掌

Opuntia dillenii (Ker-Gawl.) Haw.

各地有栽培，南部亦有野生。

茎有小毒，消肿解毒，消炎止泻，镇咳；外用治腮腺炎，乳腺炎，汤火伤，疮疡肿毒，蛇伤；内服治急性菌痢，咳嗽，胃痛。果肉可食，从果肉榨出的红紫色汁液，可染糍粑。绿篱。花卉。

*蟹爪兰 锦上添花

Zygocactus truncatus (Haw.) K.Schum.

各地常有栽培。

花卉，常用扦插在量天尺或仙人掌等植物上的方法来繁殖。

108 茶 科 THEACEAE(注)

四川杨桐

Adinandra bockiana Pritz ex Diels

龙州、兴安、大苗山。

木材可作桁条、桅子等。韧皮纤维可代麻，人造棉原料。

注：科名亦有用 *Camelliaceae* 或 *Ternstroemiaceae*

湖南杨桐

A. bockiana Pritz ex Diels

var. *acutifolia* (H.-M.) Kob.

(*A. acutifolia* H.-M.)

十万大山、大明山、大瑶山、大苗山、临桂、兴安、龙胜。

木材可供建筑、枕木、车船、家具等用。韧皮纤维可代麻，人造棉原料。

细柄杨桐

A. filipes Merr. ex Kob.

凌云。

毛杨桐

A. glischroloma H.-M.

容县、大明山、大瑶山、大苗山、罗城、东兰。

海南杨桐 黄板木

A. hainanensis Hay.

东兴、钦州、上思、浦北、陆川、苍梧、龙州。

木材可供建筑等用。

大叶杨桐

A. megaphylla Hu

那坡、靖西、田林、凌云。

杨桐 黄端木、鸡仔茶、黄板叉木

A. millettii (Hk. et Arn.) Benth. et Hk.

十万大山、大瑶山、融安、永福、临桂、兴安。

木材可作建筑、枕木、车船、家具等用。

亮叶杨桐

A. nitida Merr. ex H.L.Li

Adinandra-Camellia

十万大山、大明山、大瑶山、大苗山。

木材可作建筑、枕木、车船、家具等用。

灰木杨桐☆

A. symplocina Chun in Sched.

大瑶山。

红楣 胖婆茶、米勿友(壮音)

Anneslea fragrans Wall.

十万大山、大明山、大瑶山、大苗山、龙胜、灌阳。

木材可供建筑、家具、铅笔杆等用，但不宜作室外用材。

海南红楣

A. hainanensis (Kob.) Hu

十万大山。

木材可供建筑、家具、铅笔杆等用，但忌湿，不宜作室外用材。

尾叶山茶 野山茶子

Camellia caudata Wall.

(*Theopsis caudata* Hu)

容县、苍梧、十万大山、邕宁、宁明、龙州、大瑶山、大苗山、

临桂、龙胜、兴安、东兰等地。

本属植物的种子含油可供利用。

心叶茶

C. cordifolia (Metc.) Nakai

(*Thea cordifolia* Metc.)

蒙山、阳朔、临桂、灵川、大瑶山、三江、东兰、凤山、乐业、

隆林。

黔茶

C. costei Lév.

凌云、乐业、大苗山、兴安、临桂。

尖叶山茶

C. cuspidata (Kochs) Coh.-Stuart

临桂、桂林、龙胜、大苗山、罗城、凌云等地。

博白油茶

C. drupifera Lour.

博白、陆川。

种子油供食用和工业等用。

矜叶油茶☆

C. euryoides Lindl.

阳朔。

昭平山茶 水泡茶、野茶子

C. fluviatilis H.-M.

(*Thea fluviatilis* (H.-M.) Merr.)

昭平。

糙果山茶 博白大果茶

C. furfuracea (Merr.) Coh.-Stuart

(*Thea furfuracea* Merr.)

贺县。

种子油供食用、工业用。

博白大果油茶

C. gigantocarpa Hu et T.C.Huang

博白。

种子油供食用、工业用。

*山茶 茶花

C. japonica L.

(*Thea japonica* Baill.)

花凉血散瘀；治吐血，衄血，便血。种子油可供食用和作润发、

Camellia

钟表油用。观赏树木。

落瓣油茶

C. kissi Wall.

十万大山、大瑶山。

窄叶落瓣油茶

C. kissi Wall.

var. *stenophylla* (Kob.) Sealy

大瑶山。

石果山茶

C. mairei (Lévl.) Melch.

var. *lapidea* (Wu) Sealy

(*C. lapidea* Wu)

十万大山、大明山、大瑶山、融安。

*小叶油茶 小果油茶

C. meiocarpa Hu, ms.

桂北栽培。

用途参阅油茶。

*油茶 茶油树、中果油茶、普通油茶

C. oleifera Abel

(*C. oleosa* (Lour.) Rehd.)

区内各地有栽培。

种子油供食用、润发、制皂、润滑油等用。茶麸可作肥料，又可作农药，防治蛴螬、甘薯小象鼻虫、稻食根金花虫、棉蚜、红蜘蛛、钉螺等，又可醉鱼。果壳可作栲胶、制碱、糠醛、提皂素等原料。木材可作农具柄等。根皮散瘀消肿；治骨折、扭挫伤。

皱果油茶

C. paratuberculata Hu, ms.

龙胜。

平伐山茶☆

C. pitardii Coh.-Stuart

凌云、乐业、大苗山、临桂、灵川、龙胜、全州。

宛田红花油茶

C. polyodonta Chun et How

临桂、龙胜、兴安、灌阳。

种子油可供食用。木材可作农具柄等。

柳叶茶

C. salicifolia Champ. ex Benth.

大瑶山、玉林大容山。

*茶梅

C. sasanqua Thb.

各地公园有栽培。

栽培花木。种子亦可榨取茶油。

岩茶

C. saxaticola Hu, ined.

广宁油茶 南山茶、红花油茶

C. semiserrata C.W.Chi

苍梧。亦有栽培。

种子油供食用和工业用。亦可作观赏树木。

大果广宁油茶 红花大油茶

C. semiserrata C.W.Chi

var. *magnocarpa* Hu et Huang

苍梧、藤县。亦有栽培。

用途同广宁油茶。

Camellia

★茶 茶叶

C. sinensis (L.) O.Ktze.

(*Thea sinensis* L.)

区内各地有栽培，亦有野生。

叶供制茶叶用，除作日常饮料外，又是提咖啡碱的原料。入药，兴奋，利尿，收敛，消宿食；治神疲多眠，头痛目昏，烦渴，腹泻，小便不利。种子油可供食用，作精密仪器润滑油。

越南油茶

C. vietnamensis T.C.Huang ex Hu

在桂南地区，久经栽培，近年在柳城、桂林等地有引种。

种子油供食用及工业用。

锥果红淡

Cleyera concarpa H.T.Chang

十万大山。

肖柃

C. incornuta Y.C.Wu

大瑶山、大苗山。

红淡 小栏木、大茶木

C. japonica Thb.

罗城、大苗山、大瑶山、龙胜、兴安、全州、蒙山、苍梧、十万大山。

倒卵叶红淡

C. obovata H T.Chang

十万大山。

厚叶红淡

C. pachyphylla Chun ex H.T.Chang

龙胜、资源、灌阳、大瑶山、贺县、容县、大明山。

木材供建筑、家具用。

无腺红淡

C. pachyphylla Chun ex H.T.Chang

var. *epunctata* H.T.Chang

大苗山、大明山。

木材供建筑、家具用。

尖叶柃

Eurya acuminatissima Merr. et Chun

(*E. trichocarpa* auct., non Korth.)

容县、贺县、灌阳、恭城、大瑶山、大苗山、大明山。

尖萼毛柃

E. acutisepala Hu et L.K.Lin

(*E. trichocarpa* auct., non Korth.)

全州、灌阳、兴安、龙胜、临桂、贺县、大苗山、大瑶山。

翅柃

E. alata Kob.

大苗山、红水河流域。

金叶柃

E. aurea (Lévl.) Hu et L.K.Lin

(*Rapanea aurea* Lévl.,

E. nitida auct. non Korth.)

龙胜、灵川、大苗山。

短柱柃

E. brevistyla Kob.

龙胜、兴安、资源、灌阳、大苗山。

种子可榨油。

Eurya

平脉柃

E. cavinervis Vesque

十万大山、大瑶山、临桂。

米碎花

E. chinensis R.Br.

南宁、武鸣、大瑶山、大苗山、三江、罗城、临桂、苍梧、陆川、
十万大山、合浦。

华南毛柃

E. ciliata Merr.

容县、贺县、武鸣、龙州、大瑶山。

二列叶柃

E. distichophylla Hemsl.

容县、大新、宁明、那坡、大苗山。

岗柃

E. groffii Merr.

(*E. acuminata* DC.

var. *multiflora* R. et W., p.p., non Bl.,

E. acuminata DC.

var. *groffii* (Merr.) Kob.)

区内各地。

微毛柃 黄命树、老蟹眼

E. hebeclados Link

苍梧、玉林、桂林、柳州、南宁等地区和十万大山、那坡等地。

蒙自柃木

E. henryi Hemsl.

(*E. distichophylla* Hemsl.)

var. *henryi* (Hemsl.) Kob.)

隆林金钟山。

光枝湘黔柃☆

E. huiana Kob.

forma *glaberrima* H.T.Chang

全州、龙胜、灵川、柳州。

凹脉柃 大米碎花

E. impressinervis Kob.

(*E. pseudopolyneura* Chang)

凌云、田林、罗城、大苗山、大瑶山、资源、兴安、龙胜、灵川、

临桂、大明山、容县。

贵州毛柃

E. kueichouensis Hu et L.K.Lin

隆林、凌云、大苗山。

披针叶柃

E. lanciformis Kob.

十万大山。

线叶柃

E. linearis Hu et L.K.Lin

兴安。

长果柃

E. longistyla H.T.Chang

十万大山。

细枝柃 短尾叶柃

E. loquaiana Dunn

区内各地。

Eurya

金叶细枝柃 黄腺短尾叶柃

E. loquaiana Dunn

var. *aureo-punctata* H.T.Chang

兴安、大苗山、容县、大明山、那坡、凌云。

隆林耳叶柃

E. lunglingensis Hu et L.K.Lin

隆林。

黑柃

E. macartneyi Champ.

苍梧、贺县、十万大山、靖西。

大毛果柃 虾勒眼

E. megatrichocarpa H.T.Chang

十万大山、东兴。

细齿叶柃木

E. nitida Korth.

(*E. japonica* Thb.

var. *nitida* Thiselton-Dyer)

兴安、临桂、凌云、大瑶山、十万大山。

木材可作用具。叶、果可取染料。种子可榨油。树皮可提单宁。

黄背叶柃木

E. nitida Korth.

var. *aurescens* (R. et W.) Kob.

兴安、阳朔、永福、大瑶山、大苗山、罗城、玉林、北流、陆川。

种子可榨油。

矩圆叶柃

E. oblonga Yang

(*E. szechuanensis* H.T.Chang)

凌云。

长毛柃

E. patentipila Chun

(*E. parastrigillosa* Hsu)

容县、贺县、昭平、蒙山、大瑶山、兴安、东兰、凌云、大明山、宁明。

多脉柃

E. polyneura Chun

东兰、天峨。

大叶五室柃

E. quinquelocularis Kob.

十万大山、大明山、那坡、大瑶山、罗城。

窄基红褐柃

E. rubiginosa H.T.Chang

var. *attenuata* H.T.Chang

(*E. nitida* Korth.

var. *rigida* H.T.Chang)

昭平、大瑶山、大苗山、大明山、那坡。

岩柃

E. saxicola H.T.Chang

大瑶山。

毛岩柃

E. saxicola H.T.Chang

var. *puberula* H.T.Chang

灵川、灌阳、临桂、大苗山。

半齿 柃

E. semiserrata H.T.Chang

大苗山、龙胜、兴安、资源。

种子可榨油。

窄叶 柃

E. stenophylla Merr.

十万大山、大明山、马山、大瑶山、罗城、龙胜、全州、平乐。

种子可榨油。

长尾窄叶 柃

E. stenophylla Merr.

var. caudata H.T.Chang

十万大山。

毛窄叶 柃

E. stenophylla Merr.

forma pubescens H.T.Chang

十万大山、邕宁、那坡、龙胜。

假杨桐 大叶黄命树

E. subintegra Kob.

十万大山、大瑶山、宁明、凌云。

四角 柃

E. tetragonoclada Merr. et Chun

临桂、龙胜、恭城、昭平、大苗山、大瑶山、罗城、南丹、凌云、
德保、那坡。

毛果 柃 老蟹眼木(十万大山)

E. trichocarpa Korth.

十万大山、宁明、龙州、那坡、大苗山。

单耳桫

E. weissiae Chun

河池、大苗山、龙胜。

猪血木

Eryodendron excelsum H.T.Chang

大瑶山。

心叶船柄茶☆ 心叶赫德木

Hartia cordifolia H.L.Li

大瑶山。

广东船柄茶☆ 马林光(大苗山)、广东赫德木

H. kwangtungensis Chun

十万大山、大明山、大瑶山、大苗山。

木材供建筑、家具、车船等用。

船柄茶☆ 毛叶新材、赫德木

H. sinensis Dunn

那坡、东兰、大苗山。

嫩芽可代茶。树皮可提单宁。

瑶山船柄茶

H. sinii Wu

大瑶山。

上思苦登茶☆

H. theifera Hu, ms.

十万大山。

叶可代茶。

大叶毛船柄茶☆ 大叶毛赫德木

H. villosa (Merr.) Merr.

var. *grandifolia* (Chun) H.T.Chang

Hurtia-Schima

(*H. kwangtungensis* Chun

var. *grandifolia* Chun)

十万大山、大明山、大瑶山。

齿叶船柄茶 锯齿赫德木

H. villosa (Merr.) Merr.

var. *serrata* (Chun) H.T.Chang

(*H. Kwangtungensis* Chun

var. *serrata* Hu)

十万大山、大明山。

大头茶 楠木(上思)

Polyspora axillaris (Roxb.) Sw.

(*Camellia axillaris* Roxb.,

Gordonia axillaris Dietr.,

G. anomala Spreng.)

十万大山、宁明、那坡、田林、大瑶山、大苗山、永福、阳朔、灌阳。

木材供建筑、糖榨、砧板等用。树皮可提单宁。种子可榨油。

银桐木

Schima argentea Pritz.

十万大山、大明山、宁明、龙州、天等、靖西、那坡、田阳、百色、东兰、河池、大瑶山、大苗山、临桂。

用途参阅桐木。

竹叶桐木 竹叶荷树

S. bambusifolia Hu

十万大山。

桐木 何树、木荷

S. superba Gardn. & Champ.

(*S. confertiflora* Merr.,

S. crenata Korth.)

区内各地。

木材供建筑、桥梁、纱锭、旋刨细工、农具等用材。树皮含刺激性物质，与皮肤接触，能引起红肿，发痒；晒干研粉，可以毒鱼，诱杀蟑螂、苍蝇、天牛等。

乌叶桐木 峨眉木荷

S. wallichii Choisy

宁明、德保、百色、田林、隆林、东兰、龙胜。

青皮茶 史拉登茶

Sladenia celastrifolia Kurz

隆林。

天目紫茎 脱皮树

Stewardia gemmata Chien et Cheng

全州、大苗山。

厚皮香 映山红

Ternstroemia gymnanthera (W. et A.) Sprague

(*T. japonica* auct., non Thb.)

区内各地林区。

木材供建筑、车辆、家具、工艺、农具等用材。种子油可制油漆、肥皂、润滑油等。树皮可提单宁和染料。

阔叶厚皮香

T. gymnanthera (W. et A.) Sprague

var. *wightii* (Choisy) H.-M.

十万大山、大瑶山，

用途参阅厚皮香。

瑶山厚皮香

T. insignis Wu

大瑶山。

广东厚皮香

T. kwangtungensis Merr.

大瑶山、兴安、龙胜。

大果厚皮香

T. macrocarpa Wu

十万大山、大明山、大苗山、灵川、龙胜。

亮叶厚皮香 长果猪血木

T. nitida Merr.

永福、灵川、兴安、龙胜、大瑶山、大苗山。

窄叶厚皮香

T. oblancilimba H.T.Chang

十万大山。

假轮叶厚皮香 猪血木

T. pseudoverticillata Merr. et Chun

陆川、博白。

金花茶

Theopsis chrysanthera Hu

邕宁。

长梗连蕊茶

T. longipedicellata Hu

忻城。

石笔木

Tutcheria championi Nakai

(*T. spectabilis* Dunn)

十万大山、玉林、苍梧、大瑶山、大苗山。

种子可榨油。

桉叶石笔木

T. euryoides Chun

大苗山。

薄瓣石笔木 ☆ 格林榻捷木

T. greeniae Chun

十万大山、龙州、苍梧、永福、临桂、龙胜、兴安、全州。

硬毛石笔木

T. hirta (H.-M.) H.L.Li

(*T. villosa* Wu)

大瑶山。

心叶石笔木

T. hirta (H.-M.) H.L.Li

var. *cordatula* H.L.Li

十万大山、大明山。

大花石笔木

T. hirta (H.-M.) H.L.Li

var. *grandiflora* H.L.Li

(*T. villosa* Wu

var. *grandiflora* Wu)

大瑶山。

小果石笔木 山油茶

T. microcarpa Dunn

兴安、阳朔、永福、大苗山、大瑶山。

种子可榨油。

毛石笔木

T. pubifolia Merr. ex H.T.Chang

永福。

108A 五列木科 PENTAPHYLACACEAE

五列木

Pentaphylax euryoides Gardn. et Champ.

(*P. racemosa* Merr. et Chun)

十万大山、大明山、大瑶山、临桂、龙胜、德保。

木材可供建筑、家具、农具、旋刨细工等用材。

112 猕猴桃科 ACTINIDIACEAE

猫合藤

Actinidia asymmetrica F.Chun

十万大山、大明山、凌云、凤山、东兰、罗城、大苗山。

京梨 马奶奶、羊奶奶

A. callosa Lindl.

全州、兴安、龙胜、临桂、灵川、永福、大苗山、南丹、东兰、
凌云、田林、容县。

果可食和酿酒。鲜藤含胶质，可作造纸用胶料。

猕猴桃 藤梨、羊桃

A. chinensis Planch.

全州、兴安、龙胜。

根健胃，催乳，散瘀，活血，消炎；治食道癌，胃癌，消化不良，呕吐，乳汁缺少，跌打，疖肿。果、叶止渴，解烦热。果含丰富的维生素和糖，可食，又可制果酱、果脯和酿酒。熬糖，提制维生素丙的原料。茎、枝纤维可制高级纸。鲜藤或根

浸汁，可作造纸用胶料。茎煮液可治稻螟和茶毛虫。花可提制香精，供糖果等食品工业用。又是优良蜜源植物。

革叶猕猴桃

A. coriacea (Fin. et Gagn.) Dunn

隆林、乐业、南丹。

果香甜，可生食，作果酱和酿酒。花可提芳香油，也是良好的蜜源植物。藤皮可取纤维，嫩枝可作造纸用胶料。

毛冬瓜 毛桃

A. eriantha Benth.

(**A. davidii Fr.**)

兴安、龙胜、灌阳、恭城、临桂、灵川、永福、大苗山、马山、苍梧。

果可生食；作果酱、果脯和酿酒。

粉绿猕猴桃☆ 羊奶奶(龙胜)

A. fortunati Fin. et Gagn.

(**A. glaucophylla F.Chun**)

全州、兴安、龙胜、临桂、灵川、大苗山、环江、罗城、东兰、马山、大明山、横县、宾阳。

果可食。茎皮纤维可制纸。

老猕猴桃

A. henryi Dunn

大苗山、永福。

奶果猕猴桃 牛奶藤

A. henryi Dunn

var. polyodonta H.-M.

龙胜、大苗山、大瑶山、罗城、隆林。

Actinidia

毛杨桃 牛奶藤、大古毛

A. lanata Hemsl.

全州、资源、龙胜、兴安、临桂、永福、三江、大苗山、大瑶山、田林、凌云、东兰、罗城、大明山。

果可食，可制果酱，酿酒，熬糖。茎、枝纤维可制纸。鲜藤浸汁，可作造纸胶料。茎煮液可作土农药。花可提香精。蜜源植物。

硬毛杨桃

A. lanata Hemsl.

var. *hirsuta* (Fin. et Gagn.) C.F.Liang, ined.

隆林、西林、田林、那坡、凌云、东兰、南丹。

阔叶猕猴桃

A. latifolia (Gardn. et Champ.) Merr.

全州、灌阳、恭城、资源、兴安、龙胜、临桂、灵川、荔浦、阳朔、罗城、巴马、百色、大苗山、大瑶山、宾阳、龙州、十万大山、苍梧、贵县、容县。

果可食，酿酒，熬糖。鲜藤浸汁，可作造纸胶料。蜜源植物。

尾叶猕猴桃

A. longicauda F.Chun

全州。

两广猕猴桃

A. melliiana H.-M.

大苗山、大瑶山、荔浦、苍梧、容县。

厚叶猕猴桃

A. pachyphylla Dunn

乐业、大瑶山、容县。

紫果猕猴桃

A. purpurea Rehd.

龙胜、资源、大苗山。

果可酿酒。树皮可取纤维，花可提芳香油。

光叶猕猴桃

A. sabiaefolia Dunn

那坡、宁明、龙州、十万大山。

金花猕猴桃 大羊桃

A. trichogyna Fr.

龙胜、灵川、临桂、容县。

果可食，可酿酒，熬糖。

113 水东哥科 SAURAUACEAE

圆基米花树

Saurauia griffithii Dyer

var. *vietnamica* Gagn.

那坡、田林。

牛嗓管树 米妙(那坡)

S. lantsangensis Hu

德保、靖西、那坡、田林。

树皮接骨，散瘀活血；治骨折，跌打，慢性骨髓炎。野果。

大米花树

S. nepalensis DC.

隆林、田林、凌云、靖西、河池、宁明。

树皮接骨，散瘀活血，生肌止血；治骨折，跌打，慢性骨髓炎，

创伤出血，枪伤。叶可作猪饲料、绿肥。野果。

Saurauia-Hopea

刚毛米花树 ☆

S. oldhami Hemsl.

大瑶山。

大花米花树 ☆ 广西米花树

S. punduana DC.

百色。

米花树 水东哥、水枇杷、水牛奶、棒筒花

S. tristyla DC.

钦州、玉林、梧州、南宁、百色等地区及河池地区西部、大瑶山等地。

叶清热生肌；叶粉调香油外擦，治烫火伤。野果。

114 金莲木科 OCHNACEAE

金莲木

Ochna integerrima (Lour.) Merr.

(*O. harmandii* Lec.)

十万大山。

庭园观赏树木。

线齿木 ☆ 辛木

Sinia rhodoleuca Diels

龙胜、大瑶山、大苗山。

116 龙脑香科 DIPTEROCARPACEAE

窄叶坡垒 米丁怕(壮音)、万年木

Hopea chinensis H.-M.

东兴、十万大山。

木材供建筑、木工、车辆、桩木、器械等用。

118 桃金娘科 MYRTACEAE

肖蒲桃 个药木、火炭木、米拚(壮音)、米查能(壮音)

Acmena acuminatissima (Bl.) Merr.

(*Eugenia subdecurrens* Merr. et Chun,

E. saligna sensu Merr., non Miq.)

陆川、东兴、十万大山、龙州、那坡。

木材耐腐，适作上等家具，亦可供建筑、车船、桥梁等用。果可食。

岗松 扫把枝、石松草

Baeckea frutescens L.

桂南。

全株祛风行气，止痛止痒，通淋利尿；治风湿筋骨痛，胃痛，腹痛，腹泻，小便不利，皮炎，脚癣，皮肤搔痒。枝、叶可提芳香油，供皂、香精等用；又可提制栲胶、土碱。为酸性土指示植物。

短叶岗松

B. frutescens L.

var. *brachyphylla* Merr. et Perry

大瑶山。

★红千层

Callistemon rigidus R.Br.

桂南有栽培。

观赏树木。

水翁 水榕木、水榕

Cleistocalyx operculatus (Roxb.) Merr. et Perry

Decaspermum-Eucalyptus

桂南常见。

花清热解表，消滞；治感冒，消化不良。树皮煎水洗治脚癣，皮肤搔痒。嫩叶捣烂，加酒外敷治乳腺炎。花、叶可作凉茶。树皮可染布。野果。

紫凌木 米碎叶

Decaspermum fruticosum J. R. et G. Forster

十万大山、玉林、横县、龙州、武鸣、靖西、凌云、乐业、隆林、河池、天峨、永福、临桂。

木材可作农具等用。

桑枝米碎叶

D. gracilentum (Hce.) Merr. et Chun

龙州、大新、容县。

*赤桉(注)

Eucalyptus camaldulensis Dehnh.

(*E. rostrata* Schlecht., non Cav.)

梧州、玉林、南宁、柳州、桂林等地。

*柠檬桉

E. citriodora Hk.f.

(*E. maculata* Sm.

var. *citriodora* (Hk.f.) Bailey)

合浦、博白、玉林、容县、梧州、南宁、柳州、桂林等地有栽培。

枝、叶含柠檬桉油，可制薄荷脑等，供工业用。新鲜枝叶可驱蚊。木材坚韧通直，可作桥梁、枕木、建筑、车厢等用。根深，为防风林树种。

注：我国引种的本属树木，可作公路、绿化和材用树种。

* 窿缘桉

E. exerta F.v.Muell.

柳州、桂林、玉林。

* 蓝桉

E. globulus Labill

南宁、柳州、桂林有少量栽培。

叶消炎杀菌，健胃祛风；防治流感、流脑，治女性器官炎症，结膜炎，腮腺炎，腹泻，菌痢，肠炎，化脓性创伤及溃疡，皮肤湿疹，疮疖，烧烫伤，外伤出血。木材宜作车辆、家具、电杆等用材。

* 大桉

E. grandis (Hill.) Maiden

南宁。

* 斜脉胶桉

E. kirtoniana F.v.Muell.

(*E. patentinervis* R.T.Bak.)

南宁。

生长速，萌芽力强，耐瘠薄，材质硬重强韧，纹理不扭，为目前速生用材树种之一。

* 纤脉桉

E. leptophleba F.v.Muell.

南宁。

* 加拉桉

E. marginata Sm.

南宁。

* 伯拉马桉

E. parramattensis C. Hall

Eucalyptus

柳州、南宁。

●斑叶桉

E. punctata DC.

南宁、桂林、柳州等地。

木材坚重，不易施工，适作枕木、矿柱、电杆、桥梁等用。可作桂南右江河谷等地先锋造林树种。

●树胶桉

E. resinifera Sm.

(*E. hemilampra* F.v.Muell.)

南宁、柳州、桂林等地。

●大叶桉 桉树

E. robusta Sm.

区内各地常有栽培。

叶消炎杀菌，防腐止痒；防治流感，流脑，治肠炎，痢疾，疟疾，乳腺炎，丹毒，溃疡，创伤感染，疮疖，神经性皮炎等。15%煎剂对化脓性葡萄球菌、链球菌有较强的抑菌作用。叶和小枝含桉树油，可配制皂用香精、防腐剂等。树皮含单宁和阿拉伯胶。木材可作枕木、家具等用材。

●野桉

E. rudis Endl.

区内各地有栽培。

●柳桉 柳叶桉

E. saligna Sm.

南宁。

●弹帽桉

E. seeana J.H.Maiden

南宁、柳州、桂林。

●谷桉

E. smithii R.T.Bak.

南宁、田阳、玉林。

●细叶桉

E. umbellata (Gaertn.) Domin

(*E. tereticornis* Sm.)

南宁、柳州、桂林。

木材供建筑、车、船、机械、枕木等用。

多枝桉

E. viminalis Labill

南宁。

●番櫻桃 毕当茄、红果仔

Eugenia uniflora L.

桂林，自广州引种。

果肉多汁，可食。又供观赏。

●白千层

Melaleuca leucadendra L.

南宁。

观赏树木。叶可提芳香油即玉树油，为兴奋、防腐、祛痰剂。

番石榴 鸡矢果

Psidium guajava L.

桂南、桂西常有栽培；也有野生。

果味甜，供生食或酿酒。叶收敛止泻，止血；治急性肠胃炎，食滞腹泻；外敷止外伤出血。果皮和未熟果含单宁，可提栲胶。

叶含芳香油，可作调香原料。木材坚实，可作农具等用。

桃金娘 稔子、岗稔、山稔

Rhodomyrtus tomentosa (Ait.) Hassk.

Syzygium

区内各地。

叶收敛止泻，止血，拔脓生肌；治急性肠胃炎，菌痢，外伤出血，疮疖。根通经活络，收敛止泻；治慢性痢疾，风湿骨痛，腰肌劳损，肝炎。果补血安神；治孕妇贫血，病后体虚，神经衰弱，耳鸣，遗精。花治肺结核咳血。根皮、树皮、枝、叶均含单宁，可提制栲胶和黄红色染料。野果，亦可酿酒。

线枝蒲桃 上思蒲桃

Syzygium araiocladum Merr. et Perry

十万大山、横县。

短药蒲桃 梅牢(壮音)

S. brachyantherum Merr. et Perry

十万大山、宁明、龙州、横县。

黑嘴蒲桃

S. bullockii (Hce.) Merr. et Perry

博白、北流。

赤楠蒲桃 瓜子木、假黄杨

S. buxifolium Hk. et Arn.

区内各地。

木材可作农具柄等用。

南赤楠蒲桃

S. buxifolium Hk. et Arn.

var. *austrosinensis* Merr. et Perry

子凌蒲桃 子凌木

S. championii (Bth.) Merr. et Perry

(*Eugenia maclurei* Merr.)

合浦、十万大山、大明山、宁明、靖西、大瑶山。

密脉蒲桃

***S. chunianum* Merr. et Perry**

桂南。

海南蒲桃 楠木(武鸣)、枚拉(壮音)

***S. cumini* (L.) Skeel**

(*Eugenia tsoi* Merr. et Chun)

合浦、博白、横县、邕宁、武鸣、大新、宁明、扶绥、平果、靖西、德保、那坡、田阳、百色、隆林等地。

木材耐腐，宜作造船、船板、车辆、枕木、农具、家具、建筑等用材。果可食，能润肺定喘；治哮喘，肺结核。树皮含褐色染料和深红色树脂。

卫茅叶蒲桃

***S. euonymifolium* (Metc.) Merr. et Perry**

(*Eugenia euonymifolium* Metc.)

十万大山、龙州、昭平。

水竹蒲桃

***S. fluviatile* (Hemsl.) Merr. et Perry**

(*Eugenia fluviatile* Hemsl.)

十万大山、龙州、百色、隆林。

赤兰蒲桃☆ 赤兰

***S. grijsii* (Hce.) Merr. et Perry**

平乐、昭平、罗城。

红鳞蒲桃 车辕木、红车

***S. hancei* (Hce.) Merr. et Perry**

博白、北流、容县、玉林、十万大山、大瑶山、宁明、靖西、隆林。木材耐腐，宜作造船、桥梁、水工、桩木、枕木、机械器具、建筑等用材。

Syzygium

泡鳞蒲桃 ☆

S. handelii Merr. et Perry

东兴、大明山、德保、隆林、河池、大苗山。

中越蒲桃

S. imitans Merr. et Perry

十万大山、东兴。

*蒲桃

S. jambos (L.) Alston

桂南和大瑶山、河池、天峨、百色等地。

栽培果树，又是固堤、固沙树种。

广东蒲桃

S. kwangtungensis (Merr.) Merr. et Perry

十万大山。

阔叶蒲桃

S. latilimbus (Merr.) Merr. et Perry

(*Eugenia latilimba* Merr.)

那坡。

山叶蒲桃 白车

S. levinei (Merr.) Merr. et Perry

(*Eugenia levinei* Merr.)

十万大山、北流。

木材耐腐，宜作建筑、桥梁、车船、枕木、家具等用材。

棱翅蒲桃 小蓉木

S. nienkui Merr. et Perry

大瑶山、大明山、龙州。

香蒲桃

S. odoratum (Lour.) DC.

(*Eugenia millettiana* Hemsl.)

桂西南。

多瓣蒲桃

S. polypetaloides Merr. et Perry

大明山、都安、百色、田阳。

大红鳞蒲桃☆ 红车

S. rhederianum Merr. et Perry

容县、苍梧、十万大山、大明山、大瑶山、南丹、隆林、永福、
阳朔、临桂、龙胜。

*南洋蒲桃 洋蒲桃、金山蒲桃

S. samarangense (Bl.) Merr. et Perry

南宁有栽培。

果有香味，可食。

硬叶蒲桃

S. sterrophyllum Merr. et Perry

十万大山、宁明、百色、隆林。

思茅蒲桃

S. szemaoense Merr. et Perry

龙州。

四角蒲桃

S. tetragonum Wall.

桂西。

狭叶蒲桃

S. tsoongii (Merr.) Merr. et Perry

(*Eugenia tsoongii* Merr.,

E. leucocarpa Gagn.)

平乐、昭平。

*红胶木

Tristania conferta R.Br.

南宁有栽培。原产澳洲。

常绿、耐旱、美丽乔木。可作行道树。木材可供建筑、车轮、船板之用。

120 野牡丹科 MELASTOMACEAE

异形木

Allomorphia balansae Cogn.

十万大山、宁明、大瑶山、大苗山、蒙山。

广西异形木

A. flexuosa H.-M.

乐业、隆林。

阔叶异形木

A. platyphylla Diels

龙州。

藤牡丹

Anplectrum glaucum (Jack) Triana

靖西。

棱果木☆ 芭西

Barthea barthei (Hce.) Krasser

十万大山、大明山、大瑶山、大苗山、龙胜。

黔贵野锦香☆ 黔贵伯拉木

Blastus cavaleriei Lévl. et Van.

资源、兴安、龙胜、临桂、贺县、融安、大苗山、凌云、十万大山。
叶止血。

野锦香☆ 伯拉木、崩疮药

B. cochinchinensis Lour.

(Anplectrum pauciflorum Benth.)

合浦、十万大山、博白、北流、扶绥、宁明、龙州、靖西、百色、东兰、河池、天峨、大苗山、融安、大瑶山、临桂、昭平、贺县、苍梧、藤县。

全株拔毒生肌；治疮疖。根治产后流血不止。根、茎含单宁，可提制栲胶。

金花树

B. dunnianum Lévl.

龙胜、兴安、临桂、蒙山、大苗山、凌云。

长花野锦香☆ 长花柏拉木

B. longiflorus H.-M.

凌云、临桂、永福、大瑶山、武鸣、容县。

浓毛野锦香☆ 浓毛柏拉木

B. mollissimus H.L.Li

大瑶山。

刺毛野锦香☆ 刺毛柏拉木

B. setulosus Diels

大瑶山。

薄叶野锦香☆ 薄叶柏拉木

B. tenuifolius Diels

大瑶山。

绒毛野锦香☆ 茸毛柏拉木

B. tomentosus H.L.Li

十万大山、贺县。

秀丽野海棠

Bredia amoena Diels

大瑶山。

江南野海棠☆

B. fordii (Hce.) Diels

临桂、大瑶山。

小叶野海棠

B. microphylla H.L.Li

临桂、龙胜、兴安。

瑶山野海棠

B. sepalosa Diels

大瑶山、临桂。

全株止血。

上思野海棠

B. sessilifolia (Diels) H.L.Li

容县、十万大山、大明山、宁明。

中华野海棠

B. sinensis (Diels) H.L.Li

大瑶山。

西南野海棠☆

B. tuberculata (Guill.) Diels

十万大山、那坡、大瑶山、苍梧、容县、临桂。

棱茎木 福笛木

Fordiophyton fordii (Oliv) Krass.

武鸣、龙胜。

羊刀尖

F. polystegium H.-M.

龙州、田林、乐业、大苗山、龙胜、兴安、资源。

蓝裂膈牡丹☆ 蓝美丁花

Medinilla caeruleseens Guill.

十万大山、大新、扶绥、龙州、大明山、大瑶山。

北裂膈牡丹☆ 北美丁花

M. septentrionalis Guill.

大瑶山、龙州、百色。

裂膈牡丹☆ 美丁花

M. spirei Guill.

靖西、百色。

野牡丹

Melastoma candidum D. Don

(*M. septemnervium* Lour.)

桂南和桂西。

根、叶消积滞，收敛止血；治消化不良，肠炎腹泻，胃痛，痢疾，便血，衄血；叶捣烂外敷或用干粉，治外伤出血。酸性土指示植物。叶可提栲胶。

地 蕊 铺地锦、山地蕊、地枇杷

M. dodecandrum Lour.

区内各地。

全株涩肠，止痢，舒筋活络，补血安胎，清热燥湿；治肠炎，菌痢，腰腿痛，风湿骨痛，孕妇贫血，胎动不安，月经过多。煎水洗，治疥癣，脚癣，小儿湿疹。根解木薯中毒。果熟可食。茎、枝蔓生，可保持水土。

细叶野牡丹

M. intermedium Dunn

(*M. suffruticosum* Merr.)

十万大山、南宁、苍梧。

肖野牡丹 爆牙郎

M. normale D. Don

桂南、桂西和桂林等地。

全株清积滞，收敛止血，祛瘀消肿；治消化不良，肠炎腹泻，痢疾；捣烂外敷或研粉撒布，治外伤出血，刀枪伤。叶可提制栲胶。

多花野牡丹

M. polyanthum Bl.

龙州、凌云、乐业、大瑶山、大苗山、龙胜、兴安、恭城、阳朔。

全草消积滞，收敛止血，散瘀消肿；治消化不良，肠炎腹泻，痢疾；捣烂外敷或研粉撒布，治外伤出血，刀枪伤。叶可提制栲胶。

毛蕊

M. sanguineum Sims

(*M. decemfidum* Roxb.)

十万大山、上林、武鸣、宁明、龙州、藤县、苍梧、容县。

全株收敛止血，消食止痢；治水泻便血，月经过多。叶研粉外敷，治外伤出血。茎皮含单宁。熟果可吃。

谷木

Memecylon ligustrifolium Champ.

钦州、上思、横县、大瑶山、恭城、凌云、百色。

黑叶谷木

M. nigrescens Hk. et Arn.

梧州。

细叶谷木 盆状谷木

M. scutellatum (Lour.) Naud.

上思、陆川、博白、南宁、都安、凤山、百色。

金锦香 天香炉、金香炉

Osbeckia chinensis L.

区内各地。

全草清热解毒，止血，止咳；治菌痢，肠炎，阑尾炎，风寒咳嗽，衄血，肺结核咯血，血崩，蛇伤。鲜草捣敷，治疔疮肿毒，外伤出血。

朝天罐

O. crinita Benth.

武鸣、大明山、大瑶山、柳州、大苗山、昭平、永福、临桂、恭城、兴安、龙胜、罗城、南丹、凤山、隆林。

全株清热收敛，止血，止咳；治菌痢，肠炎，虚咳，咯血，小便失禁，白带过多。叶可提制栲胶。

云南朝天罐☆

O. crinita Benth.

var. *yunnanensis* Cogn.

凌云。

大叶金锦香

O. nepalensis Hk.f.

凌云。

尖子木

Oxyspora paniculata (Don) DC.

都安、河池、东兰、天峨、凤山、凌云、田林、隆林、西林、百色、靖西、德保、那坡、马山、龙州。

全株清热止痢；治痢疾，腹泻，疮疖。

湘桂锦香草☆

Phyllagathis anisophylla Diels

贺县姑婆山。

锦香草 熊巴耳、铺地毡

P. cavaleriei (Lévl. et Van.) Guill.

(*P. tankahkeei* Mett.)

十万大山、桂平、临桂、兴安、龙胜、资源、全州、大苗山、融安、大瑶山、南丹、罗城、东兰、凌云、乐业、田林、那坡。

瑶山锦香草

P. microplectra Diels

大瑶山。

猪耳草

P. planiscapa Chun

龙胜、南丹。

两广锦香草

P. retrotricha Chun, ined.

凌云、乐业、大明山。

十万锦香草☆

P. setotheca H.L.Li

十万大山。

偏瓣花

Plagiopetalum esquirolii (Lévl.) Rehd.

靖西、那坡、凌云。

美肉穗草

Sarcopyramis delicata C.B.Rob.

大瑶山、藤县。

尼泊尔肉穗草

S. nepalensis Wall.

凌云、大明山、大瑶山、大苗山、罗城、龙胜、临桂、桂平。

茎、叶清肝明目；治耳鸣，耳聋，目雾羞明。

小叶肉穗草

S. parvifolia Merr. ex H.L.Li

十万大山。

卷花丹

Scorpiothyrus xanthostictus (Merr. et Chun) H.L.Li
(*Phyllagathis xanthosticta* Merr. et Chun)

东兴、十万大山。

桑勒草

Sonerila cantonensis Stapf

博白、容县、大瑶山、十万大山、凤山、天峨、乐业、隆林。

全株通经活络；治跌打，翳膜。

溪边桑勒草

S. rivularis Cogn.

乐业、南丹、宁明、十万大山。

全株治枪弹伤。

纤弱桑勒草

S. tenera R.Br.

临桂。

红敷地发

Stapfiophyton elattandrum (Diels) H.L.Li

(*Phyllagathis elattandra* Diels)

玉林、大瑶山、宁明、龙州、靖西、东兰。

全株治劳咳。

121 使君子科 COMBRETACEAE

华风车子

Combretum alfredii Hance

龙胜、临桂、阳朔、荔浦、三江、融安、河池、大瑶山、龙州、
岑溪。

吐健胃驱虫；驱蛔虫、鞭虫。

石风车子

C. incertum H.-M.

大苗山、百色。

广西风车子

C. kwangsiensis H.L.Li

大苗山。

凌云风车子

C. linyenensis H.-M.

凌云。

紫风车子

C. purpurescens H.-M.

凌云、龙州。

盾鳞风车子

C. squamosum Roxb.

十万大山。

西南风车子

C. wallichii DC.

龙州。

榄李

Lumnitzera racemosa Willd.

合浦、东兴。

使君子

***Quisqualis indica* L.**

区内各地。

种子驱虫，消痞积；治蛔虫、蛲虫，小儿痞积。叶健胃，助消化。

• 榄仁树

***Terminalia catappa* L.**

东兴、合浦、南宁。

果可生食。种子油可供食用和药用，亦可制皂，或作机械润滑油等用。油粕为良好饲料。树皮、嫩叶和树汁含单宁，为黑色染料。木材耐朽力强，可供建筑、车船、辘轳、细工等用。

• 诃子 青果

***T. chebula* Retz**

南宁、邕宁。

果敛肺涩肠；治慢性痢疾，赤白痢，喉炎，肠结核，肠出血，哮喘，久咳失音。果皮和树皮含单宁，为制革工业重要原料，又可提取黄色染料。木材可供建筑、车辆、农具、家具等用。

丝毛榄仁☆

***T. franchetii* Gagn.**

隆林。

树皮含单宁，可提制栲胶。

多果榄仁

***T. myriocarpa* Heurck et M.-A.**

龙州。

122 红 树 科 RHIZOPHORACEAE

木 榄

Bruguiera gymnorhiza (L.) Lam.

(*Rhizophora gymnorhiza* L.,

B. conjugata sensu Merr., non L.)

钦州地区沿海一带。

树皮含单宁，可提制栲胶。木材可供桩柱和细工用。

竹节树

Carallia brachiata (Lour.) Merr.

合浦、十万大山、陆川。

木材易施工，但不耐久。

锯叶竹节树 广西鹅山木、人哥(壮音)、百六齿、鱼骨木、铁巴掌

C. diplopetala H.-M.

大苗山、大瑶山、罗城、巴马、梧州、桂平、容县、陆川、十万

大山、横县、大明山、大新、扶绥、宁明、龙州、靖西、田林。

全株通经活络；治风湿，跌打。叶治外伤出血。根治妇女血崩。

大叶竹节树

C. garciniaefolia How et Ho

隆林。

秋茄树

Kandelia candel (L.) Druce

合浦。

树皮含单宁。

123 金 丝 桃 科 HYPERICACEAE

毛叶黄牛木 土茶

Cratoxylon dasyphyllum H-M.

十万大山、崇左。

叶可代茶。枝、叶消肿去毒；治疮疖。

黄牛木 狗牙木、狗芽茶、黄芽木

C. ligustrinum (Spach) Bl.

(*C. polyanthum* Korth.)

合浦、十万大山、博白、玉林、容县、贵县、苍梧、藤县、大瑶山、横县、南宁、大明山、大新、宁明、凭祥、龙州、河池、巴马、凌云、乐业、百色、那坡、德保。

根、树皮清热解暑，消滞祛湿；治感冒发热，肠炎腹泻；嫩叶代茶，可防暑防痢。枝、叶消肿去毒；治疮疖。树皮可提取树脂。叶含芳香油。木材坚致，可作雕刻细工等用材。紫胶虫寄主植物。

湖南连翘 黄海棠、金丝蝴蝶

Hypericum ascyron L.

凌云、乐业、河池、柳州、资源。

全草清热利尿，除湿解毒；治急性肝炎，肠胃炎，腹泻，头疼，吐血，疮疖。

野金丝桃

H. attenuatum Choisy

资源、恭城、灌阳、兴安、龙胜、南丹、天峨、乐业、隆林、容县。

金丝桃

H. chinense L.

Hypericum

临桂、兴安、柳州、罗城、河池、梧州。

全草清热去毒；治疮疖。茎皮含单宁，可提制栲胶。花可供观赏。

遍地金

H. elodeoides Choisy

凌云、隆林。

全株清热祛湿；治水泻，久痢，赤白带。

华西金丝桃

H. hookerianum W. et A.

德保、那坡、隆林、柳州。

田基黄 地耳草、雀舌草

H. japonicum Thb.

区内各地。

全草清热解毒，渗湿利水，消肿散瘀；治急慢性肝炎，早期肝硬化，乳腺炎，肺脓肿，阑尾炎，毒蛇咬伤，恶疮肿毒，外伤出血，刀枪伤，跌打骨折。本品100%溶液对金黄色葡萄球菌、链球菌有抑制作用。

金丝梅

H. patulum Thb.

靖西、田林、河池。

全草清热解毒，凉血止血，止痒；治急慢性肝炎，痢疾，妇女血崩，鼻衄，小儿疳积；外洗皮炎，皮肤搔痒；干叶研粉，撒敷黄水疮。可供观赏。

大花金丝梅

H. patulum Thb.

var. henryi Veitch

乐业。

元宝草 穿心草

H. sampsoni Hance

区内各地。

全草通经活络，止血定痛；治月经不调，衄血，吐血，急性肝炎，腰腿疼痛，跌打扭挫伤，痈肿疔毒，毒蛇咬伤。根泡酒服，可健胃。

126 山竹子科 GUTTIFERAE

薄叶红厚壳 横经席、薄叶胡桐、小果海棠

Calophyllum membranaceum Gardn. et Champ.

东兴、浦北、十万大山、陆川、博白、玉林、梧州、昭平、大瑶山、横县、邕宁、德保。

根祛瘀止痛，补肾强腰；治风湿腰腿痛，跌打损伤，月经不调。叶研末撒敷治外伤出血。

广西山竹子

Garcinia kwangsiensis Merr.

十万大山。

山竹子 多花山竹子、山桔子、竹桔子、木熟果、木竹子、咪枢

G. multiflora Champ.

区内各地，南部较多。

树皮、果消炎止痛，收敛生肌；用树皮或果核粉末撒布，或用果核油涂，治烧伤，烫伤，湿疹，痈疮。用鲜果捣敷，治铁砂入肉不出。种子油供作肥皂或润滑油原料。果熟时酸甜可食，但多食能致腹痛。果皮、树皮均含单宁，可提制栲胶。木材坚重，可供建筑、车船、家具、工艺、雕刻等用。

Garcinia-Burretiodendron

黄牙果 岭南山竹子、岭南倒捻子

G. oblongifolia Champ.

钦州、博白、北流、苍梧、大瑶山、武鸣、大明山、大新、宁明、龙州。

用途参阅山竹子。

金丝李

G. paucinervis Chun et How

龙州、宁明、大新、武鸣、马山、隆安、靖西、那坡、德保、田林、西林、东兰、凤山、都安、河池、忻城。

木材坚重，耐湿耐腐，为栋梁、车船、建筑、糖榨、机座、家具、米斗等良材。果可食。

128 椴树科 TILIACEAE

圆蒴蚬木

Burretiodendron combretoides Chun et How

靖西、那坡、田林。

木材可供建筑、机械、车船等用。

心叶蚬木

B. esquirolii (Lévl) Rehd.

隆林、西林、天峨。

木材可供建筑、机械、车船等用。

蚬木 咪蚬

B. hsienmu Chun et How

武鸣、隆安、大新、宁明、龙州、平果、德保、靖西、那坡、田阳、田东、百色、天峨、巴马。

木材极坚重，为建筑、机械、车船、糖榨、机座、家具、砧板等良材。

长蒴葜木

B. obconicum Chun et How

龙州。

木材极坚重，为建筑、机械、车船、糖榨、机座、砧板等良材。

假黄麻 甜麻

Corchorus acutangulus Lam.

区内各地。

种子和叶含强心甙。茎皮纤维可代黄麻作麻织品和造纸原料。嫩叶可清凉解暑。

*黄麻

C. capsularis L.

栽培作物。

叶含强心甙。茎皮纤维可制麻袋，编绳，或混纺织布。

长蒴黄麻 小麻

C. olitorius L.

南部和东兰、田阳等地；亦有栽培。

叶含强心甙。茎皮纤维可织麻袋，编绳，作造纸原料。叶揉碎取汁，可代肥皂。

蒴麻叶扁担杆 葵叶扁担杆

Grewia abutilifolia Vent. ex Juss.

扶绥、宁明、龙州、那坡、田林、平果、百色、隆林、都安、柳州。

叶止泻痢。茎皮纤维可代麻，可作人造棉原料。

扁担杆 二裂解宝叶

G. biloba G. Don

(*G. glabrescens* Benth.)

Grewia

临桂、恭城、凤山、田林、凌云、乐业、西林。

茎皮纤维色白，质软，作人造棉原料。

小花扁担杆

G. biloba G. Don

var. *parviflora* (Bunge) H - M.

全州、灌阳、临桂。

毛果扁担杆

G. eriocarpa Juss.

龙州、百色、田林、隆林。

茎皮纤维可织麻袋、麻布。

西南扁担杆☆

G. henryi Burr.

大新、龙州、靖西、那坡、田林、百色、凌云、隆林、天峨。

茎皮纤维可代麻，可作造纸原料。

刚毛扁担杆

G. hirsuta Vahl

龙州。

大瓣扁担杆

G. macropetala Burr.

少蕊扁担杆

G. oligandra Pierre

贵县、上思、邕宁、南宁、武鸣、龙州、田东、田阳、百色。

根皮治痢疾，疮疖。

无柄扁担杆

G. sessilifolia Gagn.

宁明、凭祥、龙州。

茎皮纤维可织麻袋，编绳。

椴叶扁担杆

G. tiliaefolia Vahl

野棉叶扁担杆

G. urenifolia (Pierre) Gagn.

鹿寨、大苗山、百色。

海南椴

Hainania trichosperma Merr.

大新、宁明、龙州。

茎皮纤维可供编绳等用。

破布叶 解宝叶、布渣叶、火布茶

Microcos paniculata L.

陆川、玉林、容县、贵县、苍梧、十万大山、横县、南宁、大新、龙州、都安、那坡、田林、百色、凌云、西林。

叶清热毒，消炎，止泻；治感冒，食滞，蜈蚣咬伤，黄疸型肝炎；亦用作凉茶。茎皮纤维可作人造棉和代麻原料，编绳等。

种子可榨油。木材可制家具、农具柄等。

庐山椴

Tilia breviradiata (Rehd.) Hu et Cheng

(*T. tuan* Szyszyl.

var. *breviradiata* Rehd.,

T. chingiana Hu et Cheng)

资源、兴安。

茎皮纤维可制人造棉，造纸，编绳。

海棠椴

T. croizatii Chun et Wong

(*T. begoniifolia* Chun et Wong, non Stevens)

全州、灌阳、大苗山。

Tilia-Triumfetta

广东椴

T. kwangtungensis Chun et Wong

全州。

淡色椴

T. tristis Chun et Wong

全州。

椴树

T. tuan Szyszyl.

大苗山。

枝皮纤维可制人造棉，代麻，造纸，编绳，编草鞋，亦可作火药导引线。花可提芳香油。叶可作猪饲料。木材可作箱、盒、家具、乐器、乒乓球拍、火柴杆、火柴盒、蜂房、胶合板等。

小刺蒴麻

Triumfetta annua L.

兴安。

茎皮纤维较粗，宜制麻袋和绳。

刺蒴麻

T. bartramia L.

玉林、梧州、贺县、邕宁、南宁、龙州、百色等地。

茎、叶解毒清热；治毒疮。根清热；治痢疾。茎皮纤维可制麻袋，编绳。

长钩刺蒴麻

T. pilosa Roth.

贺县、昭平、平乐、大瑶山、融安、上思、宁明、龙州、靖西、百色、凌云、隆林。

茎皮纤维可代麻，制麻线、人造棉，织麻袋，编绳等。

毛刺蒴麻

T. tomentosa Bojer

博白、藤县、昭平、大瑶山、柳州、巴马、河池、天峨、大明山、扶绥、龙州、德保、靖西、百色、隆林。

叶解热清毒；治白痢。茎皮纤维可代麻，织麻袋，编绳等。

128A 杜英科(胆八树科) ELAEOCARPACEAE

冬桃 柑橄果

Elaeocarpus assimilis Chun

永福、临桂、龙胜、兴安、恭城、全州、大瑶山、大苗山、罗城、宜山、那坡、凌云、乐业、容县。

木材可培养香菇。

小冬桃 羊屎木、野杜英

E. chinensis (Gardn. et Champ.) Hk. f.

苍梧、大瑶山、永福、恭城、桂林、龙胜。

树皮和果皮含单宁，可提制栲胶。木材可培养香菇、白木耳。

杜英 梅擦饭(壮音)

E. decipiens Hemsl.

钦州、十万大山。

木材为良好板材。

乌口果 香信木、高山望

E. decurvatus Diels

上思、龙州、南宁、北流、贺县、蒙山、大瑶山。

木材可培养香菇。

山模果

E. dubia A.DC.

十万大山、武鸣、大瑶山、百色。

Elaeocarpus

木材可供建筑、板材、家具等用。

广西杜英

***E. duclouxii* Gagn.**

全州、罗城、大瑶山。

黄冠毛杜英

***E. flavicoma* Chun, ined.**

十万大山、大瑶山。

毛杜英

***E. flavicoma* Chun**

var. *pubescens* How, ined.

罗城、南丹、凌云、乐业。

薯豆杜英☆ 薯豆、球果胆八树、豆翁树、高山望

***E. japonicus* S. et Z.**

(*E. yunnanensis* Brandis,

***E. kobanmochi* Koidz.)**

贺县、十万大山、大明山、大瑶山、大苗山、永福、临桂、灵川、兴安、龙胜、资源、恭城、全州、隆林。

木材可培养香菇。

狭叶杜英 剑叶杜英、冬桃

***E. lanceaefolius* Roxb.**

大明山、大苗山、龙胜、资源、凌云、乐业、隆林、靖西、种子油可供制皂和作润滑油。

毛叶杜英 野冬桃

***E. limitaneus* H.-M.**

容县、十万大山、邕宁、永福、桂林、龙胜、大苗山。

亮叶杜英 滑光杜英

***E. nitentifolius* Merr. et Chun**

钦州、十万大山、大瑶山。

木材宜作桁、桷、门、窗、天花板、家具、器具等用材。

长柄杜英

E. petiolatus (Jack) Wall.

罗城、大苗山、容县天堂山。

圆果杜英

E. subglobosus Merr.

龙州。

木材宜作桁、桷、天花板、门、窗、家具等用材。

山杜英 杜英、胆八树

E. sylvestris (Lour.) Poir.

(*E. henryi* Hce.,

E. glabripetalus Merr.,

E. kwangtungensis Hu,

E. subsessilis H.-M.)

恭城、兴安、龙胜、临桂、桂林、永福、阳朔、荔浦、大苗山、
罗城、大瑶山、容县、十万大山、龙州、德保、靖西、那坡、
百色、天峨。

木材可供建筑、桁、桷、门、窗、家具、细工等用材。树皮含鞣
质，可提制栲胶。树皮纤维可制纸。

绿叶山杜英

E. sylvestris (Lour.) Poir.

var. *viridescens* Chun et How

大苗山、临桂、十万大山。

用途参阅山杜英。

云南杜英 龙山果、大叶香信木

E. varunua Buch.-Ham.

Sloanea

上思、大瑶山、那坡。

木材可培养香菇。

·**华西猴欢喜**☆ 飞天蚧

Sloanea assamica (Benth.) R. et W.

南丹。

·**百色猴欢喜**

S. chingiana Hu

百色、武鸣、大瑶山、容县。

·**细柄猴欢喜** 小叶猴欢喜

S. elegans Chun

容县、阳朔、临桂、兴安、龙胜、大苗山、大瑶山、武鸣、那坡、隆林。

·**仿栗**

S. hemsleyana (Ito) R. et W.

(*S. hanceana* Hemsl.)

天峨、凤山、乐业、德保。

·**香港猴欢喜**

S. hongkongensis Hemsl.

灵川。

·**细果猴欢喜**

S. leptocarpa Diels

大瑶山。

·**靖西猴欢喜**

S. mollis Gagn.

var. *chinghsiensis* Chun et How

靖西、龙州、容县天堂山。

疏脉猴欢喜

S. oligophlebia Chun et Ting

(*S. sign* Merr. et Chun, non K.Schum.)

那坡、靖西。

猴欢喜

S. sinensis (Hance) Hemsl.

全州、灌阳、兴安、龙胜、灵川、临桂、永福、荔浦、大苗山、

大瑶山、贺县、苍梧、容县、田阳。

木材硬度适中，干时不开裂，宜作船板、车厢、建筑板材、家具等用材。可培养香菰。

思茅猴欢喜

S. tomentosa (Benth.) R. et W.

十万大山。

贵州猴欢喜

S. tsiangiana Hu

隆林、龙胜、临桂、阳朔、大瑶山、六万大山、大明山。

130 梧桐科 STERCULIACEAE

昂天莲 假芙蓉

Abroma augusta (L.) L.f.

藤县、桂平、十万大山、龙州、那坡、百色、田林、凌云、乐业、东兰、南丹、都安、天峨。

根通经，接骨；治月经不调，跌打骨折。茎皮纤维可制麻线，织麻布、麻袋，造纸。

刺果藤 大滑藤

Burretia aspera Colebr.

北流、梧州、大瑶山、忻城、十万大山、邕宁、龙州、田林、凌

Commersonia-Firmiana

云、乐业、天峨。

根、茎补血，祛风，消肿接骨；治风湿痛，跌打骨折。茎皮纤维可织麻袋，制绳索。

山麻树

Commersonia bartramia (L.) Merr.

钦州地区、博白。

茎皮纤维可织麻布，制麻袋，编绳。

毛果田麻

Corchoropsis tomentosa (Thb.) Mak.

(*Corchorus tomentosa* Thb.,

Corchoropsis crenata S. et Z.)

恭城、桂林、灵川、昭平、贺县。

根解毒；治疮疥。茎皮纤维可织麻袋，制绳。

广西芒木 米良、米烂麻、米丹弄、米炯（均壮音）、大芒木

Eriolaena kwangsiensis H.-M.

南宁、大新、宁明、龙州、都安、东兰、凌云、乐业、田林、隆林、西林、百色、平果、德保。

枝皮纤维可作人造棉、造纸、制绳原料。木材可作桁条、犁、耙、船舵等用材。紫胶虫寄主植物。

芒木

E. spectabilis (DC.) Planch.

田林、隆林。

茎皮纤维可代麻。紫胶虫寄主植物。

美丽梧桐 米波

Firmiana pulcherrima Hsue

靖西、上思。

• 梧桐

F. simplex (L.) F.W.Wight

区内各地有栽培。

根、叶祛风除湿，清热解毒；治风湿骨痛，跌打骨折，疮毒。鲜花捣烂外敷治火伤。种子(注)和胃，补肾；治胃痛，外感发热，口疮。茎皮驱蛔虫。初落的叶煎饮，据云有催生作用。树皮纤维可制麻织品，作打字纸、制绳等原料。种子油可制皂，精制后可供食用。树皮及木材粘液可作造纸糊料。木材轻韧，宜作乐器、声学仪器、家具等。根作兽药，治牛跌伤，骨折，痢疾等。嫩叶可作猪饲料。又是常见庭园树和行道树。

山芝麻 坡油麻、坡油菜

Helicteres angustifolia L.

区内各地，桂林以北较少。

根清热解毒，滑肠泻火，止血止痒；治感冒高热不退，扁桃体炎，咽喉炎，腮腺炎，肠炎腹泻，毒蛇咬伤，刀伤出血，皮肤湿疹。亦为凉茶配料。

长角山芝麻

H. elongata Wall.

横县、都安、田林。

茎皮纤维为人造棉、制绳原料。

光叶山芝麻

H. glabriuscula Wall.

南宁、邕宁、大新、崇左、龙州、巴马、凤山、那坡、百色、田林。

茎皮纤维可作人造棉或制绳原料。

硬毛山芝麻 肖婆麻

H. hirsuta Lour.

(**H. spicata Colebr.**)

注：种子含有咖啡硷、阿拉伯胶素等。

Helicteres-Pterospermum

合浦、博白、北流、宁明、龙州。

茎皮纤维可和麻混纺麻布，织麻袋，制绳。

剑叶山芝麻

H. lanceolata DC.

博白、北流、藤县、上思、扶绥、宁明、龙州、那坡、隆林、凤山、柳州。

根清热解毒；治感冒，麻疹。茎皮纤维可制人造棉，织麻袋，制绳。

鹧鸪麻

Kleinhovia hospita L.

博白。

茎皮纤维可代麻。树皮粘液可作造纸糊料。

马松子

Melochia corchorifolia L.

梧州、贺县、钟山、临桂、龙胜、柳州、宜山、邕宁、龙州。

韧皮纤维比黄麻好，可织麻布、麻袋，又是人造棉、造纸原料。

*午时花

Pentapetes phoenicea L.

栽培花卉。

翻白叶树 米新、米纸、仙黄麻、异叶翅子树、半枫荷

Pterospermum heterophyllum Hance

(**P. levinei Merr.**)

陆川、博白、玉林、平南、藤县、苍梧、梧州、贺县、昭平、南宁、龙州、百色、都安、融安、临桂、桂林、平乐、恭城。

根祛风除湿，舒筋活血；治风湿骨痛，腰肌劳损，手足麻痹，产后风瘫，跌打肿痛。叶捣烂外敷或焙干研粉撒布，治外伤出血。

树皮纤维为织麻袋、麻布、草鞋、人造棉、造纸等原料，也可与棉、羊毛混纺，织成半毛织品。木材在广州称“线木”，

供建筑、板料、船桅、家具等用，较适于作室内用材。

翅子树

P. lanceaefolium Roxb.

博白、上思、那坡。

截裂翻白叶树☆ 米仙（壮音）

P. truncatolobatum Gagn.

宁明、龙州。

生长迅速。木材可供建筑用。

瑶山梭罗树☆ 九层皮

Reevesia glaucophylla Hsue

大瑶山、阳朔、桂林。

茎皮纤维可代麻。

广西梭罗树☆

R. kwangsiensis Hsue

龙胜。

长柄梭罗树 茉莉茜、海南梭罗树

R. longipetiolata Merr. et Chun

十万大山。

树皮纤维可供纺织、造纸、制绳用。木材硬重，但不耐腐，适作门、窗、天花板、家具、用具、箱板、板鞋等用材。

隆林梭罗树☆

R. lunglingensis Hsue, ined.

隆林。

薄叶梭罗树

R. membranacea Hsue

大瑶山。

Reevesia-Sterculia

毛梭罗树

R. pubescens Masters

大瑶山、大苗山、临桂、靖西、田林。

茎皮纤维可代麻，制纸，制绳。

上思梭罗树

R. shangszeensis Hsue

十万大山。

两广梭罗树 复序利末花

R. thyrsoidea Lindl.

容县、贺县、十万大山。

茎皮纤维可代麻，又是上等纸原料。种子油可供点灯用。木材不耐腐，适作一般板料、轻木工用材，又可作造纸原料。

绒毛梭罗树

R. tomentosa H.L.Li

大苗山。

粉苹婆

Sterculia euosma W.W.Sm.

宾阳、武鸣、龙州、田阳、靖西、凌云、乐业、都安、天峨、平乐。

树皮纤维可为麻袋、绳索、造纸原料。

香苹婆

S. foetida L.

龙州。

种子煮熟可食，味如栗子。

小苹婆

S. hainanensis Merr. et Chun

龙州。

假苹婆 赛苹婆

***S. lanceolata* Cav.**

钦州、玉林、梧州、南宁、百色等地区、河池地区西部、大瑶山等地。

茎皮纤维可为制绳索、织麻袋、麻布、造纸原料，亦可和棉花混纺，作人造棉用。种子煮熟可食，或提取淀粉供食用，或作糊料原料，种子油可制肥皂。皮、叶作兽药，治牛劳伤。

苹婆 鸡冠子、七姐妹、凤眼果

***S. nobilis* Smith**

灵山、上思、博白、北流、容县、大新、宁明、上林、龙州、天等、百色、隆林、凌云、河池等地。南部各地有零星栽培。

种子煮熟可食，味如栗子。树皮为制绳、织麻袋、造纸原料。木材可作箱板、器具、夹板等用料。

家麻树 哥波(壮音)、复叶苹婆、绒毛苹婆、千层皮

***S. pexa* Pierre**

武鸣、上林、扶绥、龙州、德保、靖西、田阳、百色。

韧皮纤维坚韧耐水，为制绳、造纸原料。种子煮熟可食。木材可制家具。

● **胖大海**

***S. scaphigera* Wall.**

东兴。

种子清热利咽，解毒；治咽喉肿痛，干咳无痰，咳嗽音哑，吐血，衄血，痔疮肿毒等。

蛇婆子

***Waltheria americana* L**

梧州、龙州、田阳。

韧皮纤维可织麻袋，造纸，制绳。全株作兽药，治牛、猪黄疸，

Ceiba-Ochroma

腹泻，眼热红肿。水土保持植物。

131 木 棉 科 BOMBACACEAE

★爪哇木棉 吉贝、美洲木棉

Ceiba pentandra (L.) Gaertn.

(*Bombax pentandrum* L.)

南宁、龙州。

果内棉毛为救生圈、救生衣、床垫、椅垫、枕头等优良填充材料。

又用于飞机等作防冷、隔音的绝缘材料。种子油供点灯、制皂用。木材可作木箱、火柴梗等。

木棉 红棉

Gossampinus malabarica (DC.) Merr.

(*Bombax malabaricum* DC.,

B. ceiba auctt., non L.,

Salmalia malabarica (DC) Schott et Endl)

桂南、桂西和红水河谷。桂林有少量栽培。

花清热除湿；治菌痢，肠炎，胃痛。根皮祛风湿，理跌打。树脂为滋补药，亦用于治痢疾和月经过多。种子棉毛可作枕、褥、救生圈等填充材料。种子油可作润滑油、制皂等用。木材可作箱板、火柴梗、造纸等用。行道树、绿化树种。鲜枝搅水，能使浊水澄清。

★轻木

Ochroma lagopus Swartz

南宁。

木材极轻，可制救生器，亦为冰箱绝缘材料。

132 锦葵科 MALVACEAE

山芙蓉 山尖茶、假芙蓉、白背木

Abelmoschus crinitus Wall.

(*Hibiscus crinitus* (Wall.) G. Don

A. hainanensis S. Y Hu)

博白、玉林、上思、武鸣、龙州、百色、凌云。

韧皮纤维可代麻。

咖啡黄葵 羊角豆、咖啡葵、木丝瓜

A. esculentus (L.) Moench

庭园花卉。嫩果可作蔬菜食用，亦可制成罐头。成熟种子可充咖啡代用品。

黄蜀葵 秋葵、水葵

A. manihot (L.) Medic.

(*Hibiscus manihot* L.)

凌云、钟山、藤县、大瑶山。

根、叶清热润肠，消肿止痛；治高热不退，便秘，外敷疮疖痈疽，骨折，烫火伤。根含粘胶质，可作造纸胶料。又为栽培花卉。

黄葵 野油麻、野棉、芙蓉麻

A. moschatus (L.) Medic.

博白、贵县、桂平、平南、梧州、昭平、兴安、大瑶山、南宁、武鸣、龙州、隆林。

花为治疮伤要药，浸油，涂烫火伤。根、叶亦可敷疮拔脓。种子有催生功效，果含芳香油，为很有价值的调香原料，可用于优质皂的香精中。韧皮纤维可编绳，织麻布、麻袋，亦为人造棉和造纸原料。根的粘胶质可作造纸糊料。又为栽培花卉。

Abelmoschus-Althaea

箭叶黄葵 红花参

A. sagittifolius (Kurz) Merr.

(*Hibiscus sagittifolius* Kurz,

Abelmoschus esquirolii (Lévl.) S.Y.Hu,

A. coccineus S.Y.Hu,

A. coccineus S.Y.Hu

var. *acerifolius* S.Y.Hu)

武鸣、邕宁。

根补血气；叶解毒消肿；治毒疮。

苘麻

Abutilon avicennae Gaertn.

阳朔、柳州等地；亦有栽培。

种子明目，止痢，利尿润肠，通乳消炎；治赤白痢，痈肿，眼生翳膜，小便不利，大便燥结，乳汁缺少，乳腺炎，胎盘不脱落等症。种子油可制肥皂、油漆、润滑油、木材防腐剂等用。茎皮纤维耐水湿，常用作汲绳、牛索、雨衣、草鞋等，也可制麻袋、人造棉。叶可作猪饲料。

磨盘草 耳响草、金花草

A. indicum (L.) G.Don

玉林、北流、贵县、梧州、来宾、忻城、桂林、都安、马山、邕宁、武鸣、宁明、龙州、田东、凌云、百色、田林、隆林。

全草散风清热，升清降浊；治感冒，腮腺炎，中耳炎，耳聋，耳鸣等症。韧皮纤维可制绳，织麻布，作人造棉原料。

• 蜀葵

Althaea rosea Cav.

茎皮纤维可作麻袋、绳索、人造棉原料。栽培花卉。

● **树棉** 印度棉、亚洲棉

Gossypium arboreum L.

种子棉毛即棉花。纤维虽较粗短，但风土适应性较大。鲜根通经；治月经不调。种子催乳；治乳汁缺少。棉子和棉子油等用途参阅陆地棉。

海岛棉

G. barbadense L.

原产南美洲。

种子棉毛即棉花，棉纤维特别细长，可供纺高级细纱织品，产量亦高，有发展前途。茎皮纤维可织麻袋等，又为造纸原料。棉子和棉子油等用途参阅陆地棉。

● **巴西棉**

G. brasiliense Macf.

(**G. barbadense L.**

var. brasiliense Hutch., Silow et Stevens)

种子棉毛即棉花，棉纤维细长，可供纺高级细纱织品。茎皮纤维可织麻袋等，又为造纸原料。棉子和棉子油等用途参阅陆地棉。

● **草棉** 非洲棉、小棉

G. herbaceum L.

种子棉毛即棉花。根皮强壮，镇静。治神经衰弱，月经不调。

● **陆地棉** 高地棉

G. hirsutum L.

种子棉毛即棉花，可制棉纱、棉线、棉布，以及传动带、胶布、电线皮线、轮胎帘子线和作絮棉等制品。根皮通经；治月经不调。根止咳；治气管炎。种子催乳；治乳汁缺少。棉子油精炼后可供食用，又可制成人造奶油，作药剂调制材料、灯油、润滑油、

Hibiscus

皂用油。油麸可制成洗涤粉、肥皂，又可提制甘油、脂肪酸供制造人造革、唱片、防雨布等用。棉子粉可作饲料。棉子壳可作提制碳酸钾、丙酮、醋酸、甲醇、糠醛、活性炭等原料。棉子壳上的短绒可纺低级纱，是很好的造纸原料，又是高级纸张、玻璃纸、塑料原料。棉秆可制绳，又可作纤维板原料。叶可提制柠檬酸。

• 槿麻 洋麻

Hibiscus cannabinus L.

韧皮纤维可织麻袋、麻布、鱼网和绳索等。种子油可制肥皂。油麸可作肥料、饲料。麻屑可造纸。

• 木芙蓉 醉酒芙蓉、芙蓉花

H. mutabilis L.

区内各地。

叶、花清热，消炎止痛，消肿排脓；治疗疮痈肿，乳腺炎，毒蛇咬伤。花治月经过多，白带，肺燥咳血。韧皮纤维洁白耐水，可供造纸，编绳，制蓑衣。紫胶虫寄主植物和庭园绿化植物。

• 大红花 朱槿、扶桑

H. rosa-sinensis L.

根皮调经，止咳；治月经不调，白带，宫颈炎，支气管炎。叶、花消炎；治痈疽，疮毒，腮腺炎。韧皮纤维代麻，可制绳，织麻袋。庭园绿化植物。

• 玫瑰茄

H. sabdariffa L.

韧皮纤维可供编绳，织麻袋等。花萼和总苞肉质，可制果酱。

• 吊灯花 假西藏红花

H. schizopetalus (Mast) Hk.f.

庭园绿化植物。

✿ 华木槿

H. sino-syriacus Bailey

庭园绿化植物。

✿ 木槿 朝开暮落花、盖碗花

H. syriacus L.

叶、花利尿消肿，除湿热；治菌痢，腹痛。皮、根清热止血，杀虫止痒，收敛；治血崩，便血，痔疮，白带，疥、癣。果治偏正头痛。花、嫩叶可打汤做菜。韧皮纤维可制纸。庭园绿化和绿篱植物。叶作农药，可治蚜虫。

黄槿 海麻、海罗麻、弓背树

H. tiliaceus L.

东兴、钦州、合浦等地。

海滨防风、防潮、防砂树种。木材坚实耐朽，可供造船，建筑，制家具等用。韧皮纤维耐水湿，可作鱼网、测量绳、麻袋、粗布、造纸等。嫩叶、嫩枝可供蔬食。

毛槿 芙蓉木槿、庐山芙蓉

H. venustus Bl.

藤县、大瑶山、南宁、宁明、龙州、百色、凌云、乐业、隆林、全州。

韧皮纤维可编绳和作造纸原料。种子油可制肥皂。叶可作绿肥。庭园绿化植物。

光叶云南槿

Kydia glabrescens Mast.

田林、隆林。

✿ 锦葵

Malva sylvestris L.

var. *mauritiana* (L.) Boiss.

Malvastrum-Sida

花卉。花含锦葵红色素。花煎汤可作喉头炎的含漱剂。

赛葵

Malvastrum coromandelinum (L) Garcke

南宁、大瑶山、临桂、隆林。

全草清热利湿，去瘀消肿；治黄疸，痢疾，疟疾，肺热咳嗽，喉头炎；外敷疮疖肿痛，跌打肿痛。

★悬铃花

Malvaviscus arboreus Cav.

var. **penduliflorus Schery**

庭园绿化植物。

黄花稔

Sida acuta Burm.f.

田阳、田东、百色等地。

韧皮纤维可编绳。叶、根活血消肿，生肌解毒；外敷疮疡肿毒。

心叶黄花稔 假黄草

S. cordifolia L.

北流、陆川、苍梧、龙州、百色等地。

全株清热消炎；治淋病，小儿腹泻。韧皮纤维可编绳，织麻袋，也是人造棉、造纸原料。

大花黄花稔 榛叶黄花稔

S. corylifolia Wall. ex Mast.

贺县、宁明、龙州、那坡、凌云、乐业。

韧皮纤维供编绳、织麻袋等用。

羊麻

S. fallax Walp.

北海。

粘毛黄花稔

S. mysorensis W. et A.

宁明。

韧皮纤维可供编绳、造纸等用。

小叶黄花稔

S. retusa L.

(*S. rhombifolia* L.

var. *retusa* (L.) Mast.)

容县、平南、南宁、宁明、田阳、柳江、罗城、临桂。

全株清热利湿，拔脓消肿；治黄疸，痢疾，外敷疗疮肿毒。韧皮纤维可作编绳、造纸等原料。

白背黄花稔

S. rhombifolia L.

区内各地。

全株疏风解表，清热利湿，散瘀拔毒，排脓生肌；治感冒，扁桃腺炎，肠炎，菌痢，黄疸，外敷痈疽疔疮。韧皮纤维细韧，拉力强，有光泽，可作织麻袋、麻布、造纸等原料。

四川黄花稔 拔毒散

S. szechuensis Mats.

百色。

全株消炎，拔毒生肌；治急性乳腺炎，急性扁桃腺炎，肠炎，菌痢，外敷痈疽疔疮，跌打损伤。韧皮纤维可作搓绳、造纸等原料。

云南黄花稔 川滇钗花

S. yunnanensis S.Y.Hu

肖槿 麻桐、棉桐

Thespesia lampas (Cav.) Dalz. et Gibs.

(*Hibiscus lampas* Cav.)

Urena-Aspidopterys

龙州、百色。

韧皮纤维可织麻布，搓绳，造纸。嫩枝和花可食。

地桃花 肖梵天花

Urena lobata L.

区内各地。

根、叶祛风利湿，清热解毒；治风湿痹痛，肠炎，痢疾，疮疡肿毒，跌打损伤。韧皮纤维可织麻布、鱼网、麻袋，制人造棉，亦为优良的造纸原料。种子油可制肥皂，作润滑油等。

粗叶地桃花 粗叶梵天花

U. lobata L.

var. *scabriuscula* DC.

南宁、龙州、来宾、柳州、南丹。

根解毒，外敷疮毒。韧皮纤维可代麻和作造纸原料。

狗脚迹

U. lobata L.

var. *sinuata* (L.) Gagn.

(*U. sinuata* L.)

陆川、博白、富川、龙胜、大瑶山、来宾、龙州。

根或全株解毒消炎，散瘀消肿，化痰止咳；治痢疾，毒蛇咬伤，风湿痹痛，腰肌劳损，跌打肿痛，肺热咳嗽，疮疡肿毒。韧皮纤维可代麻和作造纸原料。

133 金虎尾科 MALPIGHIACEAE

盾翅果

Aspidopterys concava (Wall.) Juss.

上林、宁明、龙州、靖西、柳州。

贵州盾翅藤

A. esquirolii Lév.

桂西北。

光盾翅藤

A. glabriuscula (Wall.) A. Juss.

宁明、龙州、那坡、百色。

风车藤 狗角藤

Hiptage benghalensis Kurz

十万大山、武鸣、扶绥、田阳、隆林、柳州、桂林。

龙州风车藤

H. stellata Chun

龙州。

135 古柯科 ERYTHROXYLACEAE

★古柯 玻利维亚古柯

Erythroxylum coca Lam.

东兴。

叶含古柯碱、桂皮酰古柯碱等生物碱，为提取古柯碱（可卡因）的原料。可卡因是局部麻醉剂和表面麻醉剂。叶亦为兴奋剂，咀嚼叶可恢复疲劳。

钓丝红 东方古柯、麦果

E. kunthianum (Wall.) Kurz

资源、全州、龙胜、灵川、临桂、阳朔、昭平、贺县、苍梧、大苗山、大瑶山、容县、十万大山、武鸣、大明山、大新、那坡。

★爪哇古柯

E. novogranatense (Morris) Hieron

南宁。

Erythroxylum-Acalypha

叶为兴奋剂,咀嚼叶可恢复疲劳,亦可提古柯碱,作局部麻醉剂用。
华古柯

E. sinense Wu

大瑶山、大苗山、大明山。

135A 粘木科 IXONANTHACEAE

粘木

Ixonanthes chinensis Champ.

钦州、合浦、浦北、十万大山、陆川、永福、大瑶山、龙州、德保、南丹。

木材供建筑、家具等用。

136 大戟科 EUPHORBIACEAE

人苋 铁苋菜、含珠草、海蚌含珠、叶里含珠、猫眼草

Acalypha australis L.

区内各地。

全草抗菌解毒,散血止血;治痢疾,肠炎,咯血,小儿疳积,外洗治皮肤湿疹。

短穗铁苋菜 鸡眼草

A. brachystachys Horn.

凌云、罗城。

全草治痢疾。

●狗尾红

A. hispida Burm f.

花卉。

●红桑

A. wikesiana M.-A.

绿化植物，又可作绿篱。

●金边桑

A. wikesiana M.-A.

var. *marginata* W. Mill.

绿化植物。

山麻杆

Alchornea rugosa (Lour.) M.-A.

区内各地。

椴叶山麻杆

A. tiliaefolia (Benth.) M.-A.

十万大山、大瑶山、南丹。

红背山麻杆 红背娘、新妇木、红帽顶

A. trewioides M.-A.

区内各地。

根除湿解毒，止血；治血崩，白带，腹泻，痢疾，尿路结石或尿路炎症。叶煎水洗，治风疹。叶可作绿肥。韧皮纤维可作造纸和人造棉原料。

●光桐 三年桐、油桐

Aleurites fordii Hemsl.

区内各地。

重要木本油料植物。种子油即桐油，为干性油，供油漆等用。桐壳可制碳酸钾、活性炭等。桐壳灰可作肥料。木材轻软，不易生虫；可供家具、床板、建筑等用。叶可饲养白蜡虫。桐油可治疥癣。

●石栗 铁桐

A. moluccana (L.) Willd

桂东南及桂南各地有栽培。

Aleurites-Antidesma

种子油可代替桐油。生长速，可作我区南部行道和绿化树种。木材可作板材和家具用。

*皱桐 千年桐、皱果桐、木油树

A. montana (Lour) Wils.

区内各地。

种子油也叫桐油。用途参阅光桐。

五月茶

Antidesma bunius (L) Spreng

龙州、靖西、田林、隆林、西林、凌云。

木材可作箱板材。叶治小儿头疮。

细柄五月茶

A. filipes H-M.

兴安、大苗山。

黄毛五月茶 旱禾子树

A. fordii Hemsl.

(*A. yunnanensis* Pax et Hoffm)

十万大山、陆川、博白、苍梧、贺县、蒙山、大瑶山、巴马、南丹、横县、武鸣、扶绥、龙州、百色、隆林。

叶可洗疮。

方叶五月茶

A. ghaesembilla Gaertn.

横县、邕宁、宁明、龙州、田林、百色。

海南五月茶

A. hainanense Merr.

酸味子 五味子木

A. japonicum S et Z.

(*A. gracile* Hemsl.)

区内各地。

小叶五月茶

A. microphyllum Hemsl.

罗城、天峨、河池、都安、隆林、那坡。

全株祛风湿，治吐血。

山五月茶

A. montanum Bl.

(*A. henryi* Hemsl.,

A. apiculatum Hemsl.)

大新、龙州、田林、隆林、西林、凌云、东兰、天峨、南丹、河池、都安、巴马。

广西五月茶

A. morsei Chun

桂西北。

沙濂木

A. venosum Tul.

那坡、百色、田林、隆林、乐业、南丹。

根治小儿麻疹。

大沙叶 银柴、厚皮稔

Aporosa chinensis (Champ.) Merr.

(*A. leptostachya* Benth.)

合浦、十万大山、陆川、博白、玉林、苍梧、梧州、大瑶山、扶绥、宁明、龙州、百色、田林、西林、隆林。

云南大沙叶 小甜糖木

A. yunnanensis (Pax et Hoffm.) Metc.

靖西、百色、东兰、南丹、大瑶山、苍梧、陆川。

毛大沙叶☆ 毛银柴

A. villosa (Lindl.) Baill.

Baccaurea-Breynia

合浦。

火果 铁东木、唛吠、枝花木奶果

Baccaurea ramiflora Lour.

(*B. cauliflora* Lour.)

东兴、上思、崇左、大新、扶绥、宁明、龙州、那坡、靖西。

野果。木材可作家具和细工用材。

秋枫 常绿重阳木、大果重阳木

Bischofia javanica Bl.

(*B. trifoliata* Hk.f.)

在梧州、大瑶山、河池、天峨一线以南和以西，偶见于大苗山和昭平。

根祛风，消肿活血；治暗伤，风湿骨痛，赤白痢。叶外敷治无名肿毒。木材坚重，耐朽耐湿，为建筑、桥梁、车辆、造船、床板、枕木等用材。种子油精制后可供食用和作润滑油。果肉可酿酒。叶可作绿肥。树皮可提红色染料。适作防堤树种，又常栽培作风景树和行道树。

重阳木 水蚬木

B. racemosa Cheng et C.D.Chu

桂林、临桂、灵山、全州。

用途同秋枫。

黑面叶 螺掩叶、米宾宁(壮音)、青凡木、黑面神、鬼画符、细青七树

Breynia fruticosa (L.) Hk.f.

区内各地。

根、叶清热解毒，破瘀止痛，收敛止血；治湿热腹泻，扁桃腺炎，咽喉炎，风湿骨痛，支气管炎；叶捣汁涂，治湿疹，皮炎，搔痒，烫伤。孕妇忌服。内服过量会引起呕吐。枝、叶、

树皮可提制栲胶。种子含有脂肪油。木材可供细工用材。

小叶黑面叶☆ 小叶鬼画符、红子仔

B. hyposauropus Croiz.

藤县、平南、桂平、贵县、阳朔、临桂、大瑶山、来宾、忻城、柳州、柳城、南宁、武鸣、上林、龙州、靖西、平果、田阳、隆林、凌云、乐业、东兰。

根、叶祛瘀解毒；治蛇伤，咳嗽，乳痈。叶治刀伤。

尾叶黑面叶☆ 尾叶黑面神

B. rostrata Merr.

大瑶山。

禾串树 猪牙木

Bridelia balansae Tutchet

桂平、贺县、大瑶山、十万大山、武鸣、宁明、龙州、靖西、那坡、凌云、乐业、都安、东兰、天峨、桂林、全州。

树皮可提制栲胶。

虾公木

B. fordii Hemsl.

龙州、靖西、凌云、乐业、东兰、南丹、永福、阳朔、桂林、贺县。

土密树 逼迫子

B. monoica (Lour.) Merr.

钦州、博白、陆川、北流、容县、平南、贵县、藤县、苍梧、梧州、南宁、扶绥、宁明、龙州、田东、隆林。

根皮治神经衰弱，月经不调。茎、叶清心泻火；治狂犬咬伤。叶治跌打骨折。树皮可提制栲胶。叶可作绿肥。韧皮纤维可作混纺麻布原料。木材可供细工用。

托叶土密树 狗舌果

B. stipularis (L.) Bl.

Cladogynos-Codiaeum

龙州、百色、田林、凌云。

越南枝实

Cladogynos orientalis Zipp.

var. *tonkinensis* Gagn.

龙州、大新、武鸣、宁明、德保、靖西。

白桐树 宝炉木、丢了棒

Claoxylon polot (Burm.f.) Merr.

梧州、南宁、扶绥、大新、宁明、龙州。

根、叶祛风除湿，散瘀止痛；治风湿关节痛，跌打瘀肿，支气管炎。韧皮纤维可代麻，织麻布、麻袋和编绳。

闭花

Cleistanthus saichikii Merr.

(*Paracleisthus subgracilis* Gagn.)

博白、十万大山、宁明、龙州、天等、田林。

木材硬而稍重，耐腐，是工业良材，尤适于水工、桥梁、造船、车辆、桩木等用，亦可作建筑、机械器具、窗、地板、农具、上等家具等用材。种子油可供点灯、制皂用。树皮可提制栲胶。

异萼粗毛藤

Cnesmone anisosepala (Merr. et Chun) Croiz.

(*Tragia anisosepala* Merr. et Chun,

T. involucrata sensu Merr., non L.)

龙州。

有毒，人接触叶或藤，可引起搔痒，烧痛，红肿。

洒金榕 变叶木

Codiaeum variegatum (L.) Bl.

叶绿色，常间有白色、黄色或红色斑点或斑纹。庭园绿化植物。

●细叶洒金榕 细叶变叶木

C. variegatum (L.) Bl.

forma *taeniosum* M.-A.

庭园绿化植物。

土茛香 银叶巴豆

Croton cascarilloides Raeusch.

龙州。

根祛风，壮筋骨；治瘰癧，咽喉肿痛。

鸡骨香

C. crassifolius Geisel.

合浦、阳朔。

根行气止痛，舒筋活络；治胃痛，腹痛，黄疸，咽喉肿痛，腰腿痛，淋巴结核。种子等作土农药，参阅巴豆。

广西巴豆

C. kwangsiensis Croiz.

灵川。

毛果巴豆 穿珠林(恭城)

C. lachnocarpus Benth.

恭城、兴安、桂林、临桂、蒙山、昭平、大瑶山。

根、叶祛风散寒，破瘀活血；治跌打损伤，风寒湿痹，蛇伤，产后风瘫。

巴豆 大叶双眼龙、八百力

C. tiglium L.

区内各地。

全株有毒，种子油有剧毒。种子峻泻行水，杀虫解毒；治水肿，顽固便秘。全株祛风，消肿止痛；治蛇伤，风湿腰腿痛，跌打损伤。种子、叶、茎为良好土农药，可杀玉米螟、蚜虫、子子、

蝇蛆等害虫，亦可毒鱼。

越南巴豆

C. tonkinensis Gagn.

桂西南。

用途参阅巴豆。

弧脉核实

Drypetes arcuatinervia Merr. et Chun

苍梧、容县、龙州。

全叶核实 打炮子

D. integrifolia Merr. et Chun

龙州、苍梧。

广西核实

D. kwangsiensis Merr.

十万大山。

网脉核实☆ 米查、米家、白梨么

D. perreticulata Gagn.

龙州。

黄桐

Endospermum chinense Benth.

钦州、东兴、合浦、十万大山、北流、陆川、容县、六万大山、大新、龙州、巴马、大瑶山。

速生用材树种，树干通直，材质轻软，易加工，适作箱板、家具、建筑、模型、火柴杆、板鞋等用。树皮治疟疾(合浦)。

★火殃勒

Euphorbia antiquorum L.

鲜茎、叶有毒，消肿止痛，拔毒止痒；治疥癣，恶疮，无名肿毒，跌打，肝硬化腹水。乳汁有毒，不可入眼，内服过量会下痢。常栽

作篱笆。

猫眼草

E. esula L.

柳州、临桂。

泽漆

E. helioscopia L.

全州。

全草利尿消肿；治淋巴结核及四肢、面目浮肿。茎、叶有杀虫作用，可试作农药。

*猩猩草 草本一品红

E. heterophylla L.

庭园绿化植物。叶治疥癣。

飞扬草 大飞扬、奶母草、奶汁草

E. hirta L.

区内各地。

全草抗菌收敛，镇痛止痒；治痢疾，肾盂肾炎，小儿消化不良，急性支气管炎，脓疱疮，足癣，皮癣，瘰疬。可解断肠草毒。

通奶草

E. indica Lam.

区内各地。

南大戟☆ 上莲下柳、铁挂牌

E. jolkini Boiss.

全州、资源、龙胜、临桂、桂林、柳州、融安、南丹、靖西、平果、天等、大新、南宁、博白。

全草清热凉血，润肺止咳；治风湿，跌打，消化不良，感冒咳嗽。

续随子 千金子

E. lathyris L.

Euphorbia

全州、龙胜、临桂、凌云、大瑶山。

种子下水破瘀；治腹水蛊毒，疥癣，大小便不利。叶消肿催乳。

种子油有毒，不能食，可制肥皂或高级软皂和润滑油。种子捣烂水浸液可作农药。

*铁海棠 狮子髯、麒麟花

E. milii Ch. des Moulins

(*E. splendens* Hk.)

花卉。可作绿篱。叶可拔竹、木刺。

大戟 上莲下柳、残虫草

E. pekinensis Rupr.

桂林、临桂、大苗山、南宁。

根峻下利尿；治腹水，全身水肿。体弱及孕妇忌服。叶催乳，又治黄疸。根作农药，可治斜纹夜蛾。全株作兽药，可治牛染疗火热症，通秘结。

铺地草

E. prostrata Ait.

柳州、桂林。

全株治小儿胎毒和疳积。

*一片红☆ 一品红、猩猩木

E. pulcherrima Willd.

庭园绿化植物。茎、叶消肿；治跌打。

千根草 小飞扬

E. thymifolia L.

玉林、平南、桂平、岑溪、昭平、南宁、武鸣、桂林、天峨。

全草清热利湿，收敛止痒；主治菌痢，肠炎，腹泻，乙型脑炎，痔疮出血，产后乳少，皮炎，湿疹。

*绿玉树

E. tirucalli L.

庭园绿化植物。

海漆 土沉香

Excoecaria agallocha L.

东兴、北海、合浦。

海岸林树种之一，常混生在红树林中。树皮含单宁，可供制革。

树皮分泌的乳汁可使皮肤红肿，更不能入眼。木材中的一部分可作薰香。

*红背桂

E. cochinchinensis Lour.

多为栽培。

庭园绿化植物。叶止血；治吐血。全株治风湿，跌打。

绿背桂

E. cochinchinensis Lour.

var. *viridis* (Pax et Hoffm.) Merr.

龙州、百色。

庭园绿化植物。

白饭树

Fluggea virosa (Willd.) Baill.

苍梧、北流、贵县、横县、南宁、大明山、宁明、龙州、隆安、靖西、那坡、平果、田林、隆林、都安、东兰、天峨、柳州、大苗山、阳朔、永福、临桂。

枝、叶拔脓杀虫；治黄疱疹。

红算盘子

Glochidion coccineum M.-A.

(*Phyllanthus coccineus* (M.-A.) M.-A.)

Glochidion

邕宁、宾阳、大瑶山、东兰。

厚叶算盘子 水泡木

G. dasyphyllum K.Koch

北流、桂平、平南、藤县、梧州、大明山、天等、龙州、平果、凌云、柳州。

根治风湿跌打，脱肛，子宫脱垂。叶消肿杀虫，止齿痛。树皮可提制栲胶。

毛果算盘子 漆姑木、漆大伯

G. eriocarpum Champ.

钦州、玉林、南宁、梧州、柳州、百色、河池等地区。

根、叶祛湿止痒，收敛止泻，解漆毒；外洗治漆树过敏，皮炎，荨麻疹；煎服治肠炎，痢疾，跌打，牙痛。

栗叶算盘子 山甘树

G. fagifolium Miq.

十万大山、藤县、上林、宁明、龙州、靖西、那坡、百色、凌云、乐业。

叶治刀伤。树皮可提制栲胶。

香港算盘子 大红心、大叶馒头果

G. hongkongense M.-A.

(*G. littorale* sensu Benth., non Bl.)

陆川、博白、北流、容县、横县、龙州、隆林、凌云。

根治治咳嗽。树皮、叶治腹痛，鼻出血。树皮可提制栲胶。

果盒子

G. hypoleucum Hay.

大瑶山。

大叶算盘子

G. macrophyllum Benth.

广西南部，柳州偶见。

茎、叶散瘀消炎；治跌打，牙龈炎，口腔炎。根治黄疸。树皮可提制栲胶。

甜叶算盘子 菲岛算盘子、甜叶木

G. philippinense (Cav.) Benth.

(*G. philippicum* (Cav.) C.B.Rob.)

十万大山、容县、宁明、靖西、平果、百色、隆林、天峨、柳州。
叶可代茶。

算盘子 馒头果、鸡头蒡

G. puberum (L.) Hutch.

(*G. sinicum* (Gaertn.) Hk. et Arn.,

G. obscurum sensu Forbes et Hemsl., non Bl.)

区内各地。

根(或全株)清热，消滞，活血，止泻；治感冒发热，咳嗽，喉痛，食滞腹痛，腹泻，痢疾，小便不利，湿热腰痛，跌打损伤。果治疝气。全株可提制栲胶。种子油可制肥皂和固化油，点灯。叶可作绿肥。枝叶可作农药；治螟虫、蚜虫、菜虫。叶捣烂撒粪池中可杀蛆。

庐山算盘子☆ 庐山馒头果

G. wilsonii Hutch.

武鸣。

白背算盘子

G. wrightii Benth.

(*G. breynioides* sensu Merr., non C.B.Rob.)

梧州、横县、大明山、扶绥、龙州、凌云。
树皮和叶可提制栲胶。种子油供工业用。

Glochidion-Jatropha

槿柱算盘子 锡兰算盘子

G. zeylanicum A.Juss.

宁明、田阳、德保。

*橡胶树 三叶胶树、巴西橡胶树

Hevea brasiliensis (HBK.) M.-A.

桂南有栽培。

世界著名的橡胶植物，树干皮层流出的橡胶液是国防、民用橡胶工业的重要原料。种子油可制肥皂和固化油。

水柳 水椎木

Homonoia riparia Lour.

十万大山、邕宁、武鸣、宁明、龙州、那坡、田阳、百色、田林、隆林、凌云、东兰。

根清热利胆，消炎解毒，利尿；治急、慢性肝炎，胆囊结石，膀胱结石，淋病梅毒，跌打，痔疮。

*佛肚树

Jatropha podagrica Hk.

区内间有栽培。

庭园绿化树木，茎部肉质膨大，所以有此名。

木花生 假花生、麻风树、油芦子、黄肿木。

J. curcas L.

钦州、博白、容县、苍梧、南宁、邕宁、宁明、龙州、百色、凌云、都安。

有毒树木，种子有毒，枝、叶较次。种子泻下，可作催泻剂。根散瘀消肿，止血，杀虫止痒；治跌打骨折，疥癣，顽疮。种子油可制肥皂。油麸含蛋白质多，可作农药和肥料。叶可养蚕。常栽作绿篱。

大苞血桐

Macaranga bracteata Merr.

十万大山、陆川。

中平树

M. denticulata (Bl.) M.-A.

十万大山、扶绥、龙州、靖西、那坡、平果、田林、凌云、东兰、都安。

根治黄疸。

海南血桐

M. hemsleyana Pax et Hoffm.

龙州。

盾叶木

M. henricorum Hemsl.

十万大山、大瑶山、龙州、德保、那坡、百色、田林、隆林、都安、巴马。

血桐

M. henryi (Pax et Hoffm.) Rehd.

(*Mallotus henryi* Pax et Hoffm.)

十万大山、大明山、大新、那坡、靖西、凌云、南丹、罗城、大苗山、融安、永福、大瑶山、桂平、蒙山。

滇桂血桐☆

M. kurzii (O.Ktze.) Pax et Hoffm.

东兰、百色、靖西、龙州、扶绥、大瑶山。

广西血桐

M. rosuliflora Croiz.

十万大山。

Macaranga-Mallotus

鼎湖血桐

M. sampsoni Hance

十万大山、北流、苍梧、大瑶山、罗城。

白背桐 白桐、野桐、白吊粟

Mallotus apelta (Lour.) M.-A.

区内各地。

根舒肝活血，清热去湿，收敛固脱；治慢性肝炎，子宫脱垂，脱肛，白带，肠炎腹泻，产后风瘫。叶止血；治刀伤出血。韧皮纤维可织麻袋，编绳，制人造棉，造纸等。种子油可制肥皂、润滑油、油墨、鞣革等用。木材可作细工用材。

广西白背桐

M. apelta (Lour.) M.-A.

var. kwangsiensis Metc.

龙州、靖西。

毛桐

M. barbatus (Wall.) M.-A.

区内各地。

全株清热，止泻；治膀胱炎，白浊，子宫脱垂，消化不良。叶治癣。韧皮纤维可作编绳、人造棉、造纸原料。种子油可制肥皂和润滑油。

白叶子

M. cochinchinensis Lour.

北流、博白、桂平。

根治赤白痢，白带，子宫脱垂。韧皮纤维可作绳索、麻袋、麻布、造纸原料。种子油可供点灯用。

桂野桐

M. conspurcatus Croiz.

靖西。

两广野桐

***M. croizatianus* Metc.**

龙州、东兰、天峨。

粤黔野桐☆

***M. furetianus* (Baill.) M.-A.**

(*M. maclurei* Merr.

***Hancea muricata* Benth.)**

凌云。

据载：叶可作茶叶，且带有零陵香豆的香味。

大齿野桐

***M. grossedentatus* Merr. et Chun**

龙州、百色、田林、隆林。

粗毛野桐

***M. hookerianus* (Seem.) M.-A.**

十万大山、博白。

假新妇木

***M. illudens* Croiz.**

(*M. contubernalis* Pax et Hoffm., non Hance)

桂林、柳州、梧州、南宁、河池、百色等地区各地。

野梧桐 止血木

***M. japonicus* (Thb.) M.-A.**

资源、全州、龙胜、临桂、大苗山、大瑶山、贺县、容县、平南、博白、北流。

全株消肿驳骨，止血；治刀伤。根、叶、花治血尿。叶、种子含赤色染料。

Mallotus

东南野桐☆

M. lianus Croiz.

恭城、龙胜、永福、大瑶山、容县。

罗定白桐

M. lotingensis Metc.

(**M. barbatus M.-A.**

var. congestus Metc.)

苍梧、藤县、容县、宁明。

罗城白桐

M. luchenensis Metc.

罗城、南丹、天峨、百色、隆林、龙州、陆川。

褐毛野桐☆

M. metcalfianus Croiz.

十万大山。

小果白桐

M. microcarpus M.-A.

龙州。

滇黔野桐☆

M. millettii Lévl.

武鸣、龙州、那坡、西林、隆林、乐业、凤山、南丹。

光野桐

M. millettii Lévl.

var. atricha Croiz.

龙州、凌云、乐业、河池。

广东野桐

M. nepalensis M.-A.

var. kwangtungensis Croiz.

全州。

韧皮纤维可作麻袋、人造棉、蜡纸原料。种子油可作油漆、肥皂、蜡烛原料。叶可作饲料。

白楸

M. paniculatus (Lam.) M.-A.

(*M. cochinchinensis* Lour.)

合浦、十万大山、大瑶山、邕宁、宁明、龙州、靖西、德保、临桂。

韧皮纤维可作制绳、麻袋、麻布、棉絮、造纸等原料。种子油可供点灯等用。

粗糠柴 铁面将军、将军树

M. philippinensis (Lam.) M.-A.

区内各地。

果毛（果皮外面的红色腺毛）有毒，能引起恶心，强烈下泻，呕吐；入药为驱虫剂，驱蛔虫、蛲虫、绦虫，又治烂疮，跌打，风湿。果毛亦系红色染料。树皮、叶含单宁，可提取栲胶。韧皮纤维可制绳，作造纸原料等。种子油可制肥皂、润滑油。木材坚韧，可作车辆、家具、用具用材。紫胶虫寄主植物。又可作庭园绿化树种。

石岩枫

M. repandus (Willd.) M.-A.

全州、临桂、柳州、大瑶山、苍梧、天峨、东兰、那坡、龙州等地。

全株有毒。祛风活血，舒筋止痛；治风湿骨痛，腰肌劳损，产后风瘫。叶治疝气，腹痛。果毛驱虫；治绦虫。韧皮纤维可制绳。种子油可作油漆、油墨原料。全株能毒鱼，也叫“毒鱼药”，亦可作农药。

Mallotus-Ostodes

野桐

M. tenuifolius Pax

龙胜、凌云。

韧皮纤维可织麻袋，制绳，作人造棉、造纸原料。种子油可制油漆、肥皂、润滑油等用。

云南白桐

M. yunnanensis Pax et Hoffm.

龙州、大新、靖西、德保、田阳、凌云、乐业、凤山。

•木薯

Manihot esculenta Crantz

(**M. utilissima Pohl**)

栽培作物。

块根含淀粉，除经水泡去毒后供食用和饲料用外，在工业上用途很多。叶可饲木薯蚕。

小盘木

Microdesmis caseariaefolia Planch.

苍梧、横县、十万大山、武鸣、扶绥、百色、凌云、田林。

树汁治齿痛。

肥牛树

Muricococcum sinense Chun et How

宁明、凭祥、龙州、大新、隆安、天等、靖西等地。

叶和嫩株营养价值很高，牛很喜吃，是牛的优良饲料。在桂西南一带石灰岩山地适生地区，可经营饲料林。木材坚重，可作机械工业、建筑和家具用材。种子油可供工业用。也适作风景树。

叶轮木

Ostodes paniculatus Bl.

●扭曲草 红雀珊瑚、拖鞋花

Pedilanthus tithymaloides (L.) Poir.

全草有小毒。清热消炎，止血止痛；治跌打损伤，外伤出血，腰痛，眼红肿痛，疖肿疮疡。庭园绿化植物。

叶珠木☆

Phyllanthodendron anthopotamicus (H.-M.) Croiz.

凌云、乐业。

越南叶下珠

Phyllanthus cochinchinensis Spreng.

合浦、博白。

余甘子 油甘子

P. emblica L.

桂西、桂南分布普遍，桂北少见。

果生津止渴，可生食或渍制。入药，润肺化痰；治喉痛，牙痛，咳嗽。根解郁定痛，清湿热，降血压；治哮喘，高血压，骨痛，心胃气痛。叶治水肿，皮肤湿疹。树皮浓液可作皮肤消毒剂。虫瘿治梦遗，胃痛，小儿咳嗽。树皮可提制栲胶。种子油可制肥皂。木材坚实耐朽，富弹性，可作室内装饰和家具、细工用材。又是良好薪炭材。耐旱，耐瘠薄土壤，是桂西、桂南绿化荒山的优良先锋树种。

海南余甘子

P. hainanensis Merr.

隆林。

全株治眼发炎。

珠子草

P. niruri L.

Phyllanthus-Ricinus

区内各地。

全株治小儿疳积。根治黄疸。

小叶余甘子

P. parvifolius Buch.-Ham.

苍梧。

烂头钵 红鱼眼

P. reticulata Poir.

区内各地。

全株治风湿，跌打。

黄珠子草

P. simplex Retz.

区内各地。

全株治淋病，骨哽，小儿疳积。根治乳房脓肿。

叶下珠

P. urinaria L.

区内各地。

全草清肝明目，渗湿利水；治小儿疳积，肾炎水肿，尿路感染，
尿路结石，肠炎腹泻，肝炎，黄疸，小儿咳嗽。

菩黍树

Prosartema stellaris Gagn.

十万大山、龙州、隆林。

*蓖麻

Ricinus communis L.

区内各地。

种子油即蓖麻油，精炼的蓖麻子油，在医药上是缓泻剂，在工业
上用途极广，可作飞机或机器润滑油，又可制皂、发油、印刷

油、纺织印染工业的助染剂、皮革保护油等等。榨油后的油粕(麸饼)可作照相软片原料和作肥料、家畜饲料、活性炭。叶可饲养蓖麻蚕。种子和叶作农药,可防治蛱蝶、水稻螟、棉蚜、红蜘蛛、金龟子、蝼蛄、蟋蟀、松毛虫等,又可杀孑孓;蓖麻子的毒效较好。韧皮纤维可作人造棉、造纸原料。根治风湿骨痛,跌打肿痛。叶治疮疡肿痛,癣疥湿毒。种子含蓖麻毒素,有毒,未经加热处理不得内服。外敷治口眼歪斜,淋巴结核。

桂林乌柏☆

Sapium chihsinianum S.Lee

桂林。

木材可作家具、车辆、雕刻等用材。

山乌柏 红乌柏

S. discolor (Champ.) M.-A.

区内各地。

种子油可制肥皂、蜡烛和点灯用。木材耐朽力弱,可作火柴杆、茶箱等用。保土树种。根皮、叶利尿通便,散瘀消肿,解毒;治跌打扭伤,毒蛇咬伤,便秘,淋沥,腹水;叶外敷乳痈肿痛、痈疮,皮肤湿疹。

白木乌柏 白乳木

S. japonicum (S. et Z.) Pax et Hoffm.

全州、灌阳、临桂、大苗山。

种子油可制油漆、肥皂、硬化油、蜡烛、点灯等用。

圆叶乌柏

S. rotundifolium Hemsl.

全州、兴安、临桂、桂林、平乐、贺县、柳州、大苗山、宜山、罗城、南丹、天峨、凌云、乐业、那坡、靖西、容县。

Sapium-Sauropus

叶、果解毒消肿，杀虫；治蛇伤，疮毒，疥癣。种子油可作机械润滑油、蜡烛、制皂等用。木材宜作室内载荷小的用材。石山绿化树种。

凹尖圆叶乌柏

S. rotundifolium Hemsl.

var. *obcordatum* S.Lee

桂林。

乌柏

S. sebiferum (L.) Roxb.

区内各地。

种子表面的蜡质即“皮油”或“柏蜡”，可作制肥皂、蜡烛、硬脂酸、油酸等原料。从除去蜡层的种子榨出的油，叫“柏油”或“梓油”，可作油漆、油墨、油酸、皮肤防裂油，熬制中药、膏药、蜡纸等原料。用带蜡层的种子榨出的油，叫“木油”，多用作制肥皂和蜡烛。根、叶清热解毒，利尿通便，活血止痛；治血吸虫腹水，大小便不通，蛇伤，跌打肿痛，湿疹疥癣，阴道炎。嫩枝乳汁可治蜈蚣伤。叶可饲养柏蚕，又可提黑色染料。树皮和叶可提制栲胶。种子外壳可提制碳酸钾。叶可作绿肥。油麸是良好肥料。木材坚而白，可制车辆、家具，又是良好的雕刻细工材。叶浸出液作农药，可杀棉蚜、红蜘蛛、金花虫等。蜜源植物。夏季树冠浓绿，秋季叶色变红，可作绿化和行道树种。

细青漆木

Sauropus breynioides Merr.

武鸣、扶绥、德保。

离萼守宫木

S. chorisepalus Merr. et Chun

大瑶山、大苗山、南丹、凤山、凌云、隆林、大明山。

●龙脷叶

S. rostratus Miq.

苍梧、贵县、南宁。

叶清热止咳，润肺化痰；治急性支气管炎，支气管哮喘，上呼吸道炎。

坡荔枝

Sebastiania chamaelea M.-A.

(*S. chamaelea* M.-A.

var. *asperococcum* (F. v. M.) Pax)

龙州。

蝴蝶果

Sinopimelodendron kwangsiense Tsiang, ined.

宁明、龙州、马山、靖西、凌云、巴马、浦北。

种子含脂肪油和淀粉，经处理后可食。

广东地构叶

Speranskia cantoniensis (Hce.) Pax et Hoffm.

贺县、富川、临桂、全州、罗城。

全株治寒热痧症，跌打。

继萼木☆

Strophoblachia fimbriicalyx Boerl.

(*S. glandulosa* Pax)

龙州。

叶治疥疮。

滑桃树 红背叶

Trewia nudiflora L.

龙州。

叶治疥疮。

三宝木

Trigonostemon chinensis Merr.

(*T. fungii* Merr.)

龙州、东兴。

136A 虎皮楠科(交让木科)

DAPHNIPHYLLACEAE

牛耳枫 南岭虎皮楠、猪络木

Daphniphyllum calycinum Benth.

区内各地。

根、叶活血散瘀，消肿止痛，清热解毒；治跌打肿痛，骨折，感冒发热，中暑，扁桃体炎，脾大，毒蛇咬伤。嫩茎、叶可作绿肥。果可榨油，供制皂、润滑油用。油渣作肥料。

虎皮楠 交让木

D. glaucescens Bl.

临桂、灵川、兴安、龙胜、全州、灌阳、永福、恭城、三江、大苗山、大瑶山、宜山、大明山、那坡、凌云、贺县、昭平、苍梧。种子油可制肥皂。叶煎液作土农药，杀蚜虫。庭园绿化树种。

江南虎皮楠

D. longeracemosum Rosenth.

武鸣、大明山、宾阳、平南、大苗山、大瑶山、凌云。

广西虎皮楠 长柱虎皮楠

D. longistylum Chien

大明山、大苗山、平南、全州、龙胜、永福、桂林。

木材供家具、车辆等用。庭园绿化树种。

交让木

D. macropodum Miq.

龙胜、资源、全州、兴安、临桂、灌阳。

两广虎皮楠☆

D. marchandii (Lévl.) Croiz. et Metc.

邕宁、上思、全州、桂林。

木材可供制梳等用。

南宁虎皮楠

D. oldhami (Hemsl.) Rosenth.

临桂、龙胜、全州、苍梧、容县、平南、凤山、南丹、大瑶山、

大苗山、象州、靖西、百色、德保、那坡、邕宁、龙州、上思。

峨眉虎皮楠

D. paxianum Rosenth.

大苗山。

柳叶虎皮楠☆ 小叶虎皮楠

D. salicifolium Chien

十万大山。

139 鼠 刺 科 ESCALLONIACEAE

秀丽鼠刺

Itea amoena Chun

十万大山。

鼠刺 老鼠刺、石山杠

I. chinensis Hk. et Arn.

武鸣、大新、横县、龙州、上思、西林、容县、平南、苍梧、贺县、昭平、大瑶山、象州、桂林、临桂、永福、龙胜、恭城。

木材供细工、农具等用材。

Itea

狭叶鼠刺

I. chinensis Hk. et Arn.

forma *angustata* Wu

大瑶山。

根治风湿，跌打。

长圆叶鼠刺

I. chinensis Hk. et Arn.

var. *oblonga* (H.-M.) Wu

全州、兴安、临桂、永福、大瑶山、大苗山、罗城、平南、陆川、
苍梧、蒙山、昭平、钟山、贺县、横县。

根治跌打、骨折。木材供农具、车辆等用。

毛脉鼠刺

I. chinensis Hk. et Arn.

var. *pubinervia* H.T.Chang

贺县、桂平、临桂、桂林、大瑶山、大苗山。

厚叶鼠刺

I. coriacea Wu

灌阳、龙胜、全州、兴安、临桂、灵山、阳朔、大瑶山、大苗山、
象州、贺县、武鸣、大明山、靖西。

腺鼠刺

I. glutinosa H.-M.

兴安、龙胜、临桂。

叶捣烂敷刀伤。

毛鼠刺

I. homalioides H.T.Chang

大苗山、隆林、龙胜。

广西鼠刺

I. kwangsiensis H T.Chang

罗城、龙胜、临桂、凌云。

大叶鼠刺

I. macrophylla Wall.

武鸣、大明山、凤山、凌云。

滇鼠刺

I. yunnanensis Fr.

隆林。

多香木

Polyosma cambodiana Gagn.

十万大山。

141 醋 栗 科 GROSSULARIACEAE

南醋栗

Ribes ambiguum Maxim.

全州宝顶山。

种子通经，利尿；治水肿。果供食用及酿酒。

142 绣球花科 HYDRANGEACEAE

人心药

Cardiandra moellendorffii (Hance) H.L.Li

资源、龙胜。

四川溲疏 夏季石藤

Deutzia setchuenensis Fr.

上林、武鸣、南丹、上思。

Dichroa-Hydrangea

庭园绿化植物。

大明常山

Dichroa daimingshanensis Wu

武鸣、大明山、上林、宁明、大瑶山、南丹。

常山 黄常山

D. febrifuga Lour.

区内各地。

根、茎、叶截疟，催吐。治疟疾，跌打劳伤，支气管炎。叶煎液作土农药，可杀地老虎等害虫。

瑶山常山

D. yaoshanensis Wu

那坡、凌云、田林、都安、大瑶山、灵川、贺县。

根治风湿骨痛。

冠盖绣球 奇形绣球

Hydrangea anomala D. Don

龙胜、全州、资源、大苗山。

内树皮作收敛药。

珠光绣球

H. candida Chun

十万大山。

中国绣球

H. chinensis Maxim.

大瑶山、象州、永福、临桂。

绿瓣绣球

H. chloroleuca Diels

龙胜、临桂。

马边绣球

H. davidii Fr.

大苗山、凌云、龙胜。

根、叶治疟疾。髓心治麻疹，小便不通。

白皮绣球

H. hedyotidea Chun

贺县。

永福绣球

H. kuochingii Chun et How, ined.

永福。

广西绣球

H. kwangsiensis Hu

融安、大苗山。

椭圆广东绣球

H. kwangtungensis Merr.

var. *elliptica* Chun

十万大山。

临桂绣球

H. linkweiensis Chun

兴安、龙胜、临桂。

庭园绿化植物。

绣球花 粉团

H. macrophylla (Thb.) DC.

forma *hortensia* Wils.

桂林、苍梧等地有栽培。

庭园绿化植物。花清凉，抗疟疾。

Hydrangea

圆锥绣球 糊浚疏、水亚木

H. paniculata Sieb.

龙胜、灌阳、兴安、全州、资源、恭城、永福、临桂、大苗山、
大瑶山、象州、九万大山、大明山、贺县、富川。

根接骨；叶治疮疥。枝干、内皮可取糊料。

南川绣球☆

H. rosthornii Diels

龙胜、临桂、全州、凌云、田林、大苗山。

泽八绣球

H. serrata (Thb.) DC.

forma *acuminata* (S. et Z.) Wils.

兴安。

上思绣球☆

H. shaochingii Chun

十万大山。

紫枝柳叶绣球

H. stenophylla Merr. et Chun

var. *decorticata* Chun

大苗山。

蜡莲绣球

H. strigosa Rehd.

临桂、灵川、全州、兴安、大苗山。

茎可提取橡胶。根消食积，解热毒，除胸腹满；治疟疾，擦皮
癣。

阔叶蜡莲绣球

H. strigosa Rehd.

var. *macrophylla* Rehd.

龙胜。

繖花绣球

H. umbellata Rehd.

全州、龙胜、临桂、凌云、容县。

柔毛绣球

H. villosa Rehd.

资源、兴安、河池、南丹、大苗山、隆林。

川桂柔毛绣球☆

H. villosa Rehd.

forma sterilis Rehd.

南丹。

卵形柔毛绣球

H. villosa Rehd.

var. velutina Chun

兴安。

云南绣球 滇绣球

H. yunnanensis Rehd.

大苗山、陆川。

星毛冠盖藤

Pileostegia tomentella H.-M.

龙胜、临桂、桂林、永福、平乐、三江、平南、北流、上思。

冠盖藤

P. viburnoides Hk f. et Thoms.

兴安、全州、灌阳、资源、龙胜、临桂、荔浦、贺县、昭平、大瑶山、大苗山、象州、罗城、隆林、上思、容县。

Schizophragma-Chaenomeles

灵川钻地风

Schizophragma choufenianum Chun

资源、兴安、龙胜、灵川、乐业、容县天堂山。

粉绿钻地风

S. glaucescens (Rehd.) Chun

龙胜。

钻地风

S. integrifolium Oliver

大瑶山、象州、龙胜。

根皮祛风活血；治筋骨疼痛，丝虫病。叶可提单宁。

143 薔 薇 科 ROSACEAE

龙芽草 仙鹤草、脱力草

Agrimonia viscidula Bunge

区内各地。

全草收敛，止血，活血，凉血；治各种内外出血，产后瘀血不尽痢疾等。又可作农药。

假升麻

Aruncus silvester Kostel.

资源、大苗山。

庭园绿化植物。

川木瓜 木瓜、贴梗海棠

Chaenomeles lagenaria (Loisel.) Koidz.

桂林、兴安、全州、资源、龙胜、阳朔、乐业。

干燥的果实舒筋活络，驱风镇痛，和胃化湿；治腹痛腹泻，关节酸痛，脚气湿痹，麻木，小儿疳积。

光皮木瓜 檳楂、木李、海棠、木瓜

C. sinensis (Thouin) Koehne

桂林、龙胜、全州、岑溪。

用途参阅川木瓜。

粉绿栒子

Cotoneaster glaucophylla Fr.

田林、凌云、乐业。

野山楂 小山楂、南山楂

Crataegus cuneata S. et Z.

临桂、全州、桂林。

果消积化滞，助消化；治食积停滞，胸腹胀痛，泻痢，疝气，高血压等。焦山楂煎剂对赤痢杆菌、绿脓杆菌有抑菌作用。

粗叶栒 大果山楂、酸岭果、山楂果

C. scabrifolia (Fr.) Rehd.

隆林、田林、靖西、宁明、上思、玉林、苍梧。

果做山楂糕。叶清暑热。

皱果蛇莓

Duchesnea chrysantha (Zoll. et Mor.) Miq.

茎叶捣烂敷疮，蛇伤，烫火伤。

蛇莓 落地杨梅

D. indica (Andr.) Focke

区内各地。

全草清热解毒，通经，散瘀；治菌痢，感冒发热，咽喉肿痛，咳嗽，腮腺炎，毒蛇伤，烫火伤，痈肿，口中生疮，支气管炎，并可解雷公藤、砒霜中毒。果可酿酒、制果酱。全株还可作农药，灭子孓，杀蛆。

野枇杷

Eriobotrya cavaleriei (Lévl.) Rehd.

龙胜、兴安、全州、临桂、永福、平乐、阳朔、资源、大苗山、大瑶山、大明山、上林、武鸣、都安、隆林、那坡、上思、苍梧、贺县。

广东野枇杷

***E. cavaleriei* (Lévl.) Rehd.**

var. *brackloi* (H.-M.) Rehd.

十万大山。

果可食用、酿酒。

山枇杷

***E. fragrans* Champ.**

上思、容县、大瑶山。

果可食、酿酒。材用。

●枇杷

***E. japonica* (Thb.) Lindl.**

区内各地多有栽培。

果为水果。叶为中药（枇杷叶），化痰止咳，和胃降气；治咳嗽，痰粘不爽，胃热恶心呕吐，口渴。木材坚硬，可作刀斧柄和其他器具。

白蘼

***Fragaria nilgerrensis* Schlecht.**

柳州、忻城、鹿寨、凤山、凌云、平南、藤县。

全株解毒，调经，凉血；治红白痢，小儿疳积，刀伤。

水杨梅

***Geum japonicum* Thb.**

var. *chinense* F.Bolle

南丹、乐业。

全草解表散寒，壮阳补虚；治劳伤虚弱，肾阳虚，头眩晕，感

冒；外敷治疮疖。嫩叶可食。

棣棠花

Kerria japonica (L.) DC.

栽培花木。临桂。

全株治久咳，消化不良，风湿关节痛，水肿；外洗小儿麻疹。

湖北海棠 花红茶、茶海棠

Malus hupehensis (Pamp.) Rehd.

(*M. theifera* Rehd.)

十万大山、兴安、临桂。

果可食，酿酒；嫩叶可代茶。

尖嘴林檎

M. melliana (H.-M.) Rehd.

罗城、大苗山、大瑶山、兴安、临桂、阳朔、灌阳、荔浦、北流、玉林、容县、梧州、贺县、昭平、宁明。

果可食，可酿酒，制山楂片。幼树可作苹果砧木。

*苹果

M. pumila Mill.

柳州、岑溪和本所有少量栽培，但结果少，品质差。

为著名的温带果树。

三叶海棠

M. sieboldii (Reg.) Rehd.

全州、兴安、资源、龙胜、灌阳、大苗山、罗城。

可作苹果砧木。

*海棠花 海棠、海红

M. spectabilis (Ait.) Borkh.

桂林有少量栽培。

庭园绿化树种。

台湾海棠

M. taiwaniana (Kaw. et Koidz.) Kaw. et Koidz.

兴安、全州、平乐、贺县、大苗山、陆川、容县、宁明。

果加工做山楂片、山楂糕。药用有收敛、强壮、治腰痛之效。

齿苞绣线梅

Neillia serratisepala H.L.Li

那坡、靖西、大苗山。

绣线梅

N. sinensis Oliv.

临桂、龙胜、贺县、大苗山、东兰、凌云、乐业。

腺绣线梅

N. sinensis Oliv.

forma glanduligera (Hemsl.) Rehd.

隆林、凌云、乐业、东兰、南丹、龙胜、兴安、临桂、全州、资源。

聚繖花绣线梅

N. thyrsoflora D.Don

靖西。

西南石斑木

Photinia amphidoxa (Schneid.) R. et W.

大苗山、东兰、南丹。

果可酿酒。

凌云山杠木 广西石斑木

P. amphidoxa (Schneid.) R. et W.

var. kwangsiensis Metc.

凌云。

假思桃 琴忌郎、野思桃

P. beauverdiana Schneid.

临桂、永福、资源、龙胜、全州、恭城、富川、容县、大苗山、
大瑶山、隆林、田林、凌云、乐业、东兰、武鸣、横县。

窄叶石楠 窄叶石斑木

P. benthamiana (Hance) Maxim.

var. salicifolia Cardot

天峨、隆林、田林、十万大山、横县。

农具用材。

硬质石楠 硬质石斑木

P. callosa Chun

龙胜、大苗山、大瑶山、田林、乐业、德保、容县、北流、大明
山、十万大山。

农具用材。

桂林石楠☆

P. chihsiniana Kuan

桂林、临桂。

农具用材。

宜山石楠

P. chingiana H.-M.

宜山。

农具用材。

厚叶石楠

P. crassifolia Lévl.

那坡、隆林、凌云。

农具用材。

Photinia

刺楸

P. davidsoniae R. et W.

龙胜、临桂、平南、大瑶山、田林、十万大山。

农具用材。

山杠木 光叶石楠

P. glabra (Thb.) Maxim.

龙胜、临桂、灵川、兴安、资源、全州、阳朔、灌阳、大瑶山、大苗山、象州、三江、南丹、凌云、武鸣、上林、大明山、龙州、平南、容县、昭平、贺县。

木材坚硬，可作农具、车辆、船舶用材。种子油可制肥皂或润滑油。

青篙木

P. impressivena Hayata

(*P. euphlebia* Merr. et Chun)

大瑶山、三江、永福、临桂、阳朔、南宁、平南。

农具用材。

全缘石楠

P. integrifolia Lindl.

那坡。

农具用材。

广西山杠木

P. kwangsiensis H.L.Li

象州、大瑶山、横县、荔浦。

叶治风湿痛。

罗城石楠

P. lochengensis Yü

罗城。

小叶石楠 秤锤子

P. parvifolia (Pritz.) Schneid.

桂林、临桂、灵川、阳朔、永福、兴安、龙胜、全州、恭城、荔浦、平乐、钟山、昭平、贺县、梧州、苍梧、藤县、柳州、大苗山、大瑶山、三江、融安、罗城、南丹、武鸣、上林、大明山、上思。

白绒石楠

P. podocarpifolia Yü

田林、隆林、百色、天峨。

樱叶石楠 山杠木、石笔木

P. prunifolia (Hk. et A.) Lindl.

临桂、兴安、永福、恭城、阳朔、平乐、富川、大瑶山、大苗山、罗城、武鸣、大新、横县、上思、北流、陆川、容县、藤县、昭平。

假山杠木

P. prunifolia (Hk. et A.) Lindl.

var. *consimilis* (H.-M.) Yü

(*P. consimilis* H.-M.)

临桂、全州、恭城、平南、大瑶山、十万大山。

农具用材。

齿叶樱叶石楠

P. prunifolia (Hk. et A.) Lindl.

var. *denticulata* Yü

兴安。

饶平石楠

P. raupingensis Kuan

十万大山。

鄂西石楠☆

P. schneideriana R. et W.

Photinia-Potentilla

龙胜、兴安。

石楠 苗木

P. serrulata Lindl.

桂林、临桂、阳朔、全州、兴安、平乐、贵县、桂平、三江。

枝叶祛风寒，强腰膝，补虚，镇痛，解热。木材坚密可制车轮、农具用。果可酿酒，制果酱。种子油供工业用。苗木可作枇杷砧木。

狭叶石楠

P. stenophylla H.-M.

大苗山。

庐山石楠

P. villosa (Thb.) DC.

var. *sinica* R. et W.

罗城、柳州、大瑶山、资源、兴安。

种子油可制肥皂，作机械润滑油，制油漆。木材制器具。果可食。

鸡爪根 翻白草

Potentilla discolor Bunge

柳州、桂林、临桂。

根和全草凉血止血，祛风止痛，清热止咳；治肺热咳血，鼻衄，便血，血崩，腰痛，肺病，痢疾等。

落地杨梅 落地蜘蛛

P. fragarioides L.

隆林、乐业、玉林。

全草治疮毒，止血痢。

蛇含 五匹风

P. kleiniana W. et A.

上林、龙州、隆林、凌云、乐业、龙胜、临桂、桂林。

全草清热解表，润肺止咳；治风热感冒头痛无汗，支气管炎，百

日咳，小儿惊癇，跌打等。其汁含漱可治喉炎。

两广樱桃

Prunus adenodonta Merr.

大苗山、大瑶山、凌云、乐业、容县、平南、蒙山、贺县。

*杏

P. armeniaca L.

南宁。

果为生果。种仁祛痰止咳，定喘，润肠；主治外感咳嗽，气喘，
胸胁胀满，喉痹，便秘。

短柄樱桃

P. brachypoda Batal.

龙胜。

稍秃樱桃

P. buergeriana Miq.

var. *nudiuscula* Koehne

龙胜。

福建樱桃

P. campanulata Maxim.

阳朔、临桂、桂林、灵川、龙胜、兴安、大瑶山、凌云、乐业。
果可食。绿化树种。

四川樱桃

P. droseracea Koehne

龙胜。

无齿樱桃

P. edentata H.-M.

桂西北。

Prunus

大叶野樱

P. macrophylla S. et Z.

阳朔、临桂、永福、蒙山、靖西。

木材为农具用材。

毛大叶野樱

P. macrophylla S. et Z.

var. puberifolia Koehne

阳朔、临桂、九万大山、大瑶山、田林。

*梅

P. mume (Sieb.) S. et Z.

果可制青梅、乌梅、话梅、陈皮梅等。乌梅敛肺涩肠，生津止渴，驱蛔止痢；治慢性泻痢脱肛，蛔虫，久咳等。乌梅肉和盐、醋外敷治胼胝。果为染色媒染剂。又为有名的观赏植物。

*白梅花

P. mume (Sieb.) S. et Z.

forma alba (Carr.) Rehd.

花白色，重瓣，芳香。庭园绿化树种。

*红梅花

P. mume (Sieb.) S. et Z.

forma alphonandii Rehd.

花粉红色，重瓣，芳香。庭园绿化树种。

*绿萼梅

P. mume (Sieb.) S. et Z.

var. viridicalyx Mak.

花萼绿色，重瓣，芳香。庭园绿化树种。

●桃

P. persica (L.) Batsch.

区内各地。

果除生食外，可制罐头或果脯。种仁名“桃仁”，活血散瘀，润燥滑肠；治血瘀经闭，产后瘀血不下，跌打瘀血，便秘，慢性阑尾炎等。也可作杏仁代用品。桃花利大小便；治便秘，水肿。鲜树枝治间日疟。桃叶煎水洗治湿疹，又可作土农药，杀蚜虫、蛆、孑孓。鲜叶可防跳蚤。韧皮纤维可造纸和人造棉。桃胶可作粘接剂或赋形剂。桃树又是有名的绿化植物。

●白碧桃 千瓣白碧桃

P. persica (L.) Batsch.

forma albo-plena Schneid.

花白色，大朵，重瓣。庭园绿化植物。

●红碧桃

P. persica (L.) Batsch.

forma rubro-plena Schneid.

花红色，大朵，重瓣。庭园绿化树种。

●五彩桃 花碧桃

P. persica (L.) Batsch.

forma versicolor (Vanh) Voss

花瓣有红白相间的条纹。庭园绿化树种。

腺叶野樱

P. phaeosticta (Hance) Maxim.

区内各地。

全株活血行瘀，镇咳，利尿；种子活血行瘀，润燥滑肠；治经闭，痈疽，大便燥结。种子油点灯，制皂、油漆。

Prunus

●李

P. salicina Lindl.

区内各地。

· 果树。根入药，主治消渴，心烦逆，小儿暴热，解丹毒，止牙痛。

樱花

P. serrulata Lindl.

桂林、龙胜。

庭园绿化。

赞桃

P. serrulata Lindl.

var. *pubescens* (Mak.) Wils.

灵川、永福。

庭园绿化。

小刺樱花

P. spinulosa S. et Z.

永福、阳朔、灌阳、灵川、兴安。

华中樱花 苦桃树

P. wilsonii (Diels) Koehne

龙胜、桂林、大苗山、凌云、田林、隆林。

●日本樱花

P. yedoensis Mats.

南宁。

庭园绿化。

云南樱花

P. yunnanensis Fr.

龙胜、临桂。

思茅臀形果

Pygeum henryi Dunn

龙胜、阳朔、临桂、龙州。

臀形果

P. topengii Merr.

上思、那坡、百色、龙州、宁明、阳朔。

材质优良，可制家具、器具。

全缘火棘 鸟仔刺

Pyracantha atalantioides (Hance) Stapf

临桂、平乐、龙胜、全州、灌阳、阳朔、柳州、大瑶山、大苗山、
贺县、富川。

细圆齿火棘

P. crenulata (D.Don) Roem.

临桂。

密花火棘

P. densiflora Yü

隆林、那坡。

火棘 火把果、救军粮、救荒粮

P. fortuneana (Maxim.) H.L.Li

(*P. crenato-serrata* (Hance) Rehd.)

天峨、南丹、隆林、凌云、乐业、桂林、兴安。

叶、种子明目，助消化；治筋骨痛，痢疾，妇女崩漏，跌打。果
含糖和淀粉，可生食、酿酒或磨粉作代食品。根皮可提栲胶。

野梨 豆梨

Pyrus calleryana Decne.

桂林、临桂、永福、龙胜、恭城、全州、大瑶山、大苗山、隆林、
凌云、乐业、贺县、昭平、藤县、苍梧、容县、博白、南宁、

Pyrus-Raphiolepis

宁明、龙州。

果可生食。苗木可作梨的砧木，能增强抵抗病虫害能力，并能使果味更美。

棠梨

P. calleryana Decne.

var. *koehnei* (Schneid.) Yü

区内各地。

用途参阅上一种。

*梨

P. pyrifolia (Burm f.) Nakai

区内各地。

栽培果树。

麻梨

P. serrulata Rehd.

临桂、罗城。

果可食，常作沙梨砧木。木材造农具。

锈毛石斑木

Raphiolepis ferruginea Metc.

齿叶锈毛石斑木

R. ferruginea Metc.

var. *serrata* Metc.

大新、武鸣大明山。

春花木 石斑木、山花木、石棠木、车轮梅

R. indica Lindl.

区内各地林区。

木材带红色，质重坚硬，可做雕刻、磨齿、农具、手杖等用材。

叶治刀伤，炮码伤。根驱风，散热。果可食。

广西车轮梅

R. kwangsiensis Hu

十万大山、龙州、苍梧、贺县、那坡、博白。

狭叶车轮梅

R. lanceolata Hu

十万大山、上思。

鸡麻

Rhodotypos scandens (Thb.) Makino

(*R. tetrapetala* (Sieb.) Makino)

全州。

观赏。

七姐妹 华蔷薇、野玫瑰

Rosa cathayensis (R. et W.) Bail.

(*R. multiflora* Thb.

var. *cathayensis* R. et W.)

桂林、临桂、大苗山、南丹、乐业。

观赏花木。

★月季花 月月红

R. chinensis Jacq.

各地栽培。

庭园绿化。花提芳香油制香水、香皂。花、根调经止痛，活血消肿；治慢性腰腿痛，痛经，月经不调，赤白带下。嫩叶捣烂外敷治跌打损伤。

小果蔷薇 白花刺

R. cymosa Tratt.

(*R. microcarpa* Lindl.)

桂林、临桂、苍梧、龙州、东兰、乐业、大瑶山。

Rosa

根为栲胶原料，药用消肿止痛，祛风除湿，健胃止泻，止血；治跌打，风湿关节炎，疮疖，烫火伤。果补血。花提芳香油。蜜源植物。

华中蔷薇☆

R. henryi Bouleng.

临桂。

广西蔷薇

R. kwangsiensis H.L.Li

资源。

广东蔷薇

R. kwangtungensis Yü et Tsai

var. *mollis* Metc.

玉林。

金樱子 刺糖果

R. laevigata Michx.

区内各地。

根能收敛抗菌；主治烫火伤，子宫脱垂，腹泻，痢疾，脱肛等。果能补肾益精，止咳；主治神经衰弱，遗精，遗尿，白带等。又可熬糖，酿酒。根皮为栲胶原料。本品 1 : 3000 水溶液对流感病毒有抑制作用。

毛萼蔷薇

R. lasiosepala Metc.

大苗山。

毛野蔷薇

R. multiflora Thb.

var. *villosula* Metc.

十万大山。

花籽利尿泻下，又治月经不调。

少刺蔷薇☆

R. paucispinosa H.L.Li

野刺梨 刺梨

R. roxburghii Tratt.

forma normalis R. et W.

隆林、乐业、南丹。

根能清热，收敛；治血崩白带，红白痢疾，痔疮，烫火伤。果含淀粉，可酿酒。

★玫瑰

R. rugosa Thb.

区内各地。

花理气，行血；治月经不调，肝胃气痛，乳痈肿毒，风湿痹痛，跌打损伤。花提芳香油制香水、香精。

云南蔷薇

R. yunnanensis Bouleng.

大苗山。

粗叶悬钩子 大叶泡

Rubus alceaefolius Poir.

区内各地。

茎、叶解毒，去瘀，生新；治疮疥，跌打暗伤，驳骨。根治腹泻，痢疾。

周毛悬钩子

R. amphidasys Focke

苍梧。

根能接骨。

粗糙悬钩子☆

R. asper Wall.

Rubus

隆林、恭城。

寒莓

R. buergeri Miq.

龙胜、荔浦、宁明、大瑶山。

果可食，止渴助消化。

绿花寒莓

R. buergeri Miq.

var. *viridiflorus* H.-M.

罗城。

掌叶复盆子

R. chingii Hu

大瑶山。

紫萼莓

R. chroosepalus Focke

融安。

红鞑钩

R. cochinchinensis Tratt.

博白、上思、龙州、武鸣。

根散瘀活血，祛风湿。

三叶吊杆泡

R. columellaris Tutch.

临桂、龙胜、大瑶山、大苗山、东兰、南丹、上林、武鸣、龙州。

黄泡刺

R. columellaris Tutch.

var. *etropicus* (H.-M.) Metc.

资源、大苗山。

吊杆泡 山莓

R. corchorifolius L.f.

区内各地。

根治吐血，痔出血，月经不调，下死胎，遗精，肾亏，虫牙痛，跌打。根可制栲胶。果可食。

长叶悬钩子☆

R. dolichophylla H.-M.

凌云、乐业

凌云悬钩子☆

R. echinoides Metc.

凌云、乐业

黄泡

R. ellipticus Sm.

var. *obcordatus* (Fr.) Focke

全草解毒，消炎；治水泻，风湿痛。根皮为栲胶原料。

黔桂悬钩子☆

R. feddei Lévl. et Van.

隆林、凌云、那坡、德保、龙州。

根叶止血。

西江悬钩子☆

R. fordii Hance

桂林、临桂、阳朔、罗城、柳州。

乌泡

R. gentilianus Lévl. et Van.

龙胜、资源、大苗山、天峨、东兰、南丹、隆林、乐业、梧州。果可食。根皮作染料。

Rubus

淡黄悬钩子☆

R. gilvus Focke

容县。

根清热利湿，凉血，止痛；治吐血，全身血斑，腹泻，劳伤疼痛。

六果悬钩子☆

R. hexagynus Roxb.

大瑶山。

黄蘗子

R. ichangensis Hemsl. et Kuntze

凌云、乐业、大苗山。

根止痛，利尿，杀虫。

白叶莓

R. innominatus S.Moore

南丹、凌云、乐业、大瑶山、龙州、桂林、龙胜、资源。

早谷莓 早谷泡

R. innominatus S.Moore

var. *kuntzeanus* (Hemsl.) Bail.

大苗山。

地五泡藤

R. irenaeus Focke

全州、罗城。

根、叶理气止痛、散毒生肌；治气痞腹痛，口角疮。

广西悬钩子

R. kwangsiensis H L. Li

资源、兴安。

根、叶治牙痛、哮喘。

细烟筒子 高粱泡

R. lambertianus Ser.

桂林、临桂、平南、贺县、大瑶山、风山、河池。

果可食、酿酒。种子作强壮剂。叶生津止渴。

上思悬钩子☆

R. latoauriculatus Metc.

十万大山。

白花悬钩子

R. leucanthus Hance

苍梧、容县、上思、龙州、武鸣、大苗山。

根治腹泻、赤痢。果可食。

裂叶悬钩子

R. lobophyllus Shih ex Metc.

大苗山。

海棠叶莓 羊鸟泡

R. malifolius Focke

大苗山、大瑶山、凌云、龙胜。

根皮为栲胶原料。

小花悬钩子

R. micranthus D Don

隆林、田林、凌云、乐业、田阳、靖西、龙胜、大瑶山。

多苞片悬钩子☆

R. multibracteatus Lévl. et Van.

隆林、田林、大瑶山。

悬钩子 甜茶

R. palmatus Thb.

大瑶山。

Rubus

果解酒，止渴，除痰，补肾；治肺结核。未成熟果实可当复盆子入药，作强壮剂；治阳痿，遗尿等症。根治痢疾，水泻。叶代茶。

琴叶悬钩子☆

R. panduratus H.-M.

龙胜、大瑶山。

假琴叶悬钩子☆

R. panduratus H.-M.

var. *etomentosus* H.-M.

大苗山。

刺萼悬钩子☆

R. paniculatus Sm.

田林。

茅莓 三月泡、铺地蛇

R. parvifolius L.

区内各地。

根活血通经，解毒止痛，收敛利水；主治月经不调，痢疾，腹泻，糖尿，肾炎水肿，胃病，风湿痛，湿疹，咽喉炎，尿道炎，皮肤急性化脓性炎症，恶疮，奶疮。

川黔悬钩子☆

R. pinfaensis Lévl. et Van.

大苗山、凌云。

梨叶悬钩子

R. pirifolius Sm.

阳朔、临桂、大瑶山、大苗山、贺县、上思、龙州。

全草强筋骨；治寒湿腹痛。

阔萼悬钩子

R. platysepalus H.-M.

十万大山。

山烟筒子

R. reflexus Ker.

兴安、临桂、大瑶山、罗城、龙州、凌云、乐业、容县、藤县。

根治风湿痛。果可食。

红泡刺

R. reflexus Ker.

var. *lanceoloba* Metc.

大苗山、大瑶山。

蔷薇莓 白烟筒

R. rosaefolius Sm.

桂林、临桂、苍梧、大瑶山、大苗山、上林、玉林。

根驳骨，治痢疾，腹痛，发热头重。

红苞悬钩子☆

R. rubibracteatus Metc.

大苗山。

七裂悬钩子☆

R. septemlobus H L.Li

大瑶山。

川莓

R. setchuenensis Burr. et Fr.

凌云、乐业、隆林。

果可食。根皮作栲胶原料。茎皮为造纸原料。

桂北悬钩子☆

R. shihae Metc.

桂北。

虎泡

R. sumatranus Miq.

全州、龙胜、大瑶山、大苗山、凌云。

根清热，解毒，利水。根皮磨酒滴耳内，治急性耳炎。

湖北悬钩子☆

R. swinhoei Hance

大苗山、龙胜、全州。

葵叶莓 灰山泡

R. tephrodes Hance

桂林、临桂。

根治痢疾。叶治牙痛。

黔桂葵叶莓

R. tephrodes Hance

var. *setosissimus* H - M.

河池。

两广悬钩子

R. wangii Metc

容县、武鸣、大瑶山。

根收敛止血；治痢疾。

地榆

Sanguisorba officinalis L.

桂林、临桂、柳州、来宾、大苗山、宜山、桂平、钟山、贺县。

根凉血止血，抗菌收敛；治创伤出血，肠胃出血，血尿，烫火伤。

子宫出血，痔出血，久痢，下血，狂犬病。根可酿酒和提栲胶。

毛背花楸

Sorbus aronioides Rehd.

临桂、龙胜、大瑶山、大苗山。

美脉花楸 小棠梨

S. caloneura (Stapf) Rehd.

临桂、兴安、全州、龙胜、资源、灌阳、融安、大苗山、大瑶山、
象州、武鸣、大明山、十万大山。

材用。

石灰树 牛筋木

S. folgeneri (Schneid.) Rehd

桂林、临桂、灵川、兴安、全州、龙胜、阳朔、荔浦、永福、大
苗山、武鸣。

木材可制秤杆木。果可酿酒。

圆果花楸

S. globosa Yü et Tsai

南部。

疣果花楸

S. granulosa (Bert.) Rehd.

荔浦、龙胜、灌阳、大瑶山、大苗山、德保、上思。

果可食。

江南花楸

S. hemsleyi (Schneid.) Rehd.

临桂、资源、龙胜、贺县、大苗山、大瑶山、武鸣、大明山。

毛序花楸

S. keissleri (Schneid.) Rehd.

资源、龙胜、全州、贺县、大明山、大瑶山、大苗山。

大果花楸

S. megalocarpa Rehd.

龙胜、全州、资源。

材用。果可食。

泡吹叶花楸

S. meliosmifolia Rehd.

兴安。

滇缅花楸

S. thomsonii (King) Rehd.

大苗山、大瑶山、平南、上林。

华西花楸 饭香木

S. wilsoniana Schneid.

资源、兴安。

长果花楸

S. zahlbruckneri Schneid.

桂北。

绣球绣线菊 珍珠梅

Spiraea blumei G. Don

桂林、临桂。

绿化。叶可代茶。

麻叶绣线菊 麻叶绣球

S. cantoniensis Lour.

桂林、富川。

庭园绿化，枝叶治疥癩。

中华绣线菊

S. chinensis Maxim.

桂林、临桂、灵川、全州、柳州。

枝叶洗疮疥。庭园绿化。

狭叶绣线菊

S. japonica L.f.

var. *acuminata* Fr.

大苗山。

庭园绿化。

大绣线菊

S. japonica L.f.

var. *fortunei* (Pl.) Rehd.

田林、凌云、临桂、兴安、资源、龙胜、大苗山。

庭园绿化。

广西绣线菊

S. kwangsiensis Yü

临桂、灵山七分山、阳朔、罗城、乐业。

庭园绿化。

毛枝绣线菊

S. martinii Lévl.

百色、德保、乐业、凤山。

庭园绿化。

菱叶绣线菊

S. vanhouttei (Briot) Zabel

庭园绿化。

中华野珠兰 华空木

Stephanandra chinensis Hance

龙胜、全州。

毛萼红果树

Stranvaesia amphidoxa Schneid.

(*Photinia amphidoxa* (Schneid.) Rehd.)

龙胜、灌阳、资源、全州、大瑶山、大苗山、东兰、南丹。

湘桂毛萼红果树

S. amphidoxa Schneid.

var. *amphilea* (H.-M.) Yü

Stranvaesia-Dichapetalum

临桂、灵川、兴安、龙胜、资源、灌阳、罗城。

广西毛萼红果树

S. amphidoxa Schneid.

var. *kwangsiensis* Metc.

桂西。

红果树

S. davidiana Decne.

临桂、灌阳、龙胜、资源、兴安、上思。

矮红果树

S. davidiana Decne.

var. *undulata* (Decne.) R. et W.

龙胜、兴安猫儿山、资源、全州、灌阳、灵川、大瑶山、大苗山、
凌云、乐业、上思。

滇南红果树

S. oblanceolata (R. et W.) Stapf

(*S. nussia* (Ham.) Decne.

var. *oblanceolata* R. et W.)

桂西北。

144 毒鼠子科 DICHAPETALACEAE

海南毒鼠子

Dichapetalum longipetalum (Turcz.) Engl.

(*D. hainanense* (Hance) Engl.)

十万大山、宁明。

治血吸虫病。

145 蜡梅科 CALYCANTHACEAE -

山蜡梅 鸡卵果、牛柳铃

Chimonanthus nitens Oliver

德保、阳朔。

●蜡梅

C. praecox Link

(*Meratia praecox* R. et W.)

栽培花树。

花解暑生津；治心烦口渴，气郁胸闷；又用花生油浸剂，可治烫伤，根、叶理气止痛，散寒解毒；治跌打，腰痛，风湿麻木，风寒感冒，刀伤出血。花又可提取芳香油，是很好的庭园绿化植物。

146 含羞草科 MIMOSACEAE

沙先茶

Acacia caesia W. et A.

桂西北。

●儿茶

A. catechu Willd.

枝、干浸膏即“儿茶”，清热生津，化痰，治痰热咳嗽，口渴，外用定痛，生肌收敛，止血；治湿疮，口疮，痔疮，牙疳，下疳。树皮可提取栲胶和染料。

●台湾相思

A. confusa Merr.

(*A. richii* A.Gray)

桂南较多，柳州、桂林亦有栽培。

生长迅速，耐干旱，为荒山造林和水土保持的良好树种，又可作

Acacia-Adenanthera

公路树和行道树。材质坚硬，可作车轮、桨橹和农具等用。树皮可提制栲胶。花含芳香油，鲜花浸膏可作调香原料。种子油可点灯，制肥皂。

*澳洲金合欢

A. decurrens Willd.

var. *mollis* Lindl.

南宁、桂林、柳州。

树胶可代阿拉伯胶。树皮可提制栲胶。

阔叶金合欢

A. delavayi Fr.

隆林。

*金合欢 鸭皂树

A. farnesiana (L.) Willd.

北流、宁明、桂林等地有栽培。

树胶可供制胶水、制药、墨水等用。花含芳香油，可调制高级香精。树皮、根皮、果荚可提制栲胶。木材坚硬，可作贵重器具材。常栽作绿篱。

羽叶金合欢 蛇藤

A. pennata (L.) Willd.

博白、梧州、武鸣、扶绥、龙州、靖西、隆林。

木材可作雨伞柄用材。

小金合欢

A. sinuata (Lour.) Merr.

宁明、平果、百色、贺县、大瑶山、桂林、龙胜、兴安。

全株散血解热；治风湿骨痛，痧症，疥疮。

海红豆 孔雀豆

Adenanthera pavonina L.

北流、梧州、邕宁、龙州、百色、凌云、乐业、宜山、永福。
材质坚硬耐腐，可作船材、油榨、支柱、建筑和箱材。心材可提
红色染料。庭园绿化树种。种子和硼砂混合研碎，是一种良好
的胶料；种皮红色，可作装饰品。

蒙自合欢

Albizzia bracteata Dunn

红水河流域。

楹树

A. chinensis (Osbeck) Merr.

(*A. stipulata* (Roxb.) Boiv.)

区内各地，以桂南为多。

生长迅速，枝叶茂密，耐旱耐瘠，适作荒山造林树种，又可作公路
树。树皮可提制栲胶，又可毒鱼。木材色泽美丽，但质软，耐朽
力弱，宜作室内载荷小的用材和箱板、家具材。树叶可作绿肥。

天香藤

A. corniculata (Lour.) Druce

(*A. millettii* Benth.)

十万大山、大瑶山、临桂、恭城。

• 南洋楹

A. falcata (L.) Baker ex Merr.

南宁。

速生树种，喜湿润粘土，落叶很多，可增加土壤腐植质，改良土
壤，但树龄不长。

合欢

A. julibrissin Durazz.

凌云、桂林、南宁、梧州、玉林等地。

树皮安神解郁，活血止痛，续筋驳骨，驱虫；治忧郁失眠，痢症

Albizzia

疮肿，骨折损伤，肺痛。花解郁宁心，开胃利气；治心烦失眠，抑郁不舒。树皮和叶可提制栲胶。木材经久耐用，可作上等家具用材。韧皮纤维可作人造棉原料。种子可榨油。生长速，耐瘠耐旱，可作荒山造林先锋树种，亦可栽作行道树和庭园树。

山合欢

A. kalkora (Roxb) Prain

桂林、柳州、梧州、南宁、百色、河池等地区。

树皮安神和血，养肝明目；治失眠，夜盲，精神失常，风湿骨痛。树皮可提制栲胶。韧皮纤维为人造棉和造纸原料。种子可榨油。生长速，耐旱耐瘠，可作荒山造林先锋树种。木材可作柱材、坑木等，亦可作农具、器具和车床木件。

大叶合欢 缅甸合欢

A. lebbek (L) Benth.

梧州、南宁、柳州等地区，靖西、德保、田阳等地。

生长速，枝叶茂密，为良好行道树和庭园绿化树木。木材硬重，有光泽和斑纹，耐朽，适作房屋、家具、耕犁、油榨、板车、车厢、船艇、木刻、网球拍柄等用材。树皮可提制栲胶。叶和荚可作饲料。

光叶合欢

A. meyeri Richer

(A. lucida Benth.)

南宁、龙州、德保。

香合欢

A. odoratissima (L f.) Benth.

武鸣、大新、宁明、龙州、那坡、田阳、百色、都安、东兰。

木材坚硬致密，特别适于制造车轮、油榨和家具。树皮可提制栲胶。

高合欢☆ 菲律宾合欢、黄豆树

A. procera (Roxb.) Benth.

桂南。

生长速，耐旱，能产大量树脂。材质坚硬，耐朽，可作车轮、农具、枕木、桥梁、支柱等用材。可作公路树。

皂合欢

A. saponaria (Lour.) Bl.

桂西北。

鼎湖合欢

A. turgida (Merr) Merr.

(*Pithecolobium turgidum* Merr.,

Albizzia croizatiana Metc.,

Paralbizzia turgidum Kosterm.)

陆川、十万大山、大新、龙州、靖西、那坡、平果、凌云、乐业、大瑶山。

槿藤子 眼镜豆、过江龙

Entada phaseoloides (L) Merr.

容县、平南、博白、贵县、十万大山、邕宁、武鸣、宁明、龙州、凌云、乐业、大瑶山。

种子、树皮、根皮有毒，种子、树皮含皂甙，可代肥皂。根皮、树皮含氢氰酸。树皮浸液有催吐、下泻作用，有强烈的刺激性，误入眼中可引起结膜炎。藤祛风湿，通经络，活血散瘀；治风湿性关节痛，四肢麻木，跌打损伤，骨折。种子含淀粉和脂肪油，经处理后可食。韧皮纤维可制麻袋，织细麻布，亦为人造棉和造纸原料。

银合欢

Leucaena glauca (L) Benth.

桂林、临桂、梧州、田东。常为栽培。

耐干旱瘠薄，萌芽性强，易繁殖，为荒山造林树种。木材为良好薪炭材。树皮可提制栲胶。树皮浸出液可杀虫。

●无刺含羞草

Mimosa invisa Mast.

var. *inermis* Benth.

绿肥、保土、覆盖作物。全株有毒，家畜误食，可中毒致死。

含羞草

M. pudica L.

区内各地，桂东北较少。

全草散瘀止痛，安神镇静，清热利水；治神经衰弱失眠，劳伤咯血，跌打损伤，尿路结石，肠胃炎，结膜炎。

围涎树 猴耳环

Pithecellobium clypearia Benth.

区内各地。

叶凉血，消炎；治子宫脱垂，疮疥。树皮可提制栲胶。木材可作箱板等用材。紫胶虫寄主植物。

牛蹄豆

P. dulce (Roxb.) Benth.

龙州。

木材心材红褐，质硬而脆，耐朽，可作箱板和一般建筑用材，树皮可提制栲胶和黄色染料。紫胶虫寄主植物。

亮叶围涎树 亮叶猴耳环

P. lucidum Benth.

区内各地。

枝、叶祛风消肿；治风湿痛，跌打，烫火伤。树皮可提制栲胶。木材可作箱板等用材。紫胶虫寄主植物。

两广围涎树 两广猴耳环

P. utile Chun et How

大瑶山、平南、十万大山。

147 苏 木 科 CAESALPINIACEAE

●白花羊蹄甲

Bauhinia acuminata L.

行道或庭园绿化树。

红茸毛羊蹄甲 火索藤

B. aurea Lévl.

河池、博白、陆川。

●红花羊蹄甲

B. blakeana Dunn

行道或庭园绿化树。木材可作家具等用材。

龙须藤 九龙藤、羊蹄藤

B. championi Benth.

(*B. championi* Benth.

var. *acutifolia* L.Chen,

B. hunanensis H.-M.)

区内各地，以桂林、柳州、河池、南宁地区为多。

藤和根活血散瘀，驱风止痛，镇静止痒；治风湿关节炎，跌打损伤，腰腿痛，小儿疳积，心胃气痛，湿疹。根和茎皮可提制栲胶。藤可供捆扎木筏、竹筏、鱼帘等用，又可作编织材料。石山绿化植物。

深裂羊蹄甲 首冠藤

B. corymbosa Roxb.

十万大山、龙州、凌云、乐业、大瑶山、大苗山、临桂、灵川。
叶去毒，洗疮。

Bauhinia

马鞍叶羊蹄甲

B. faberi Oliv.

(*B. densiflora* Fr.)

百色、河池两地区、扶绥、宾阳等地。

根安神止痛；治筋骨疼痛，心悸失眠，盗汗，遗精，尿频。叶润肺，清热利湿，去腐生肌；治百日咳，天泡疮，顽癣，皮肤湿毒，烫火伤，痈肿。

囊萼羊蹄甲

B. genuflexa Craib

(*B. henryi* Craib)

龙州、罗城。

湖北羊蹄甲☆ 鄂羊蹄甲

B. hupehana Craib

凌云、天峨、东兰、罗城、大苗山、大瑶山、兴安、临桂。

根治膀胱疝气，睾丸肿痛，肾囊风痒；腰痛。韧皮纤维为人造棉、造纸原料。

绸缎木

B. kerrii Gagn.

龙州、梧州。

韧皮纤维可织麻袋、草鞋。

粤羊蹄甲

B. kwangtungensis Merr.

根可提制栲胶。韧皮纤维可织麻袋。

白枝羊蹄甲 紫羊蹄甲

B. laui Merr.

那坡。

★羊蹄甲

B. purpurea L.

桂林、梧州等地。

行道和庭园绿化树。树皮和花、根治烫伤,脓疮。嫩叶汁液或粉末治咳嗽。根皮有毒。根和树皮可提制栲胶。韧皮纤维可织麻袋。叶可作饲料。木材可作农具细工、工艺品用材。花芽可腌制供食用。

红毛羊蹄甲

B. pyrrhoclada Drake

武鸣、大新、龙州、靖西、田林、凌云、天峨、东兰。

根通经活血;治跌打。茎、叶祛风;治小儿惊风。叶可作马饲料。

菱果羊蹄甲

B. subrhombicarpa Merr.

凌云。

全缘羊蹄甲☆ 越南羊蹄甲

B. touranensis Gagn.

凌云、乐业。

★红花紫荆 红花羊蹄甲

B. variegata L.

桂林、柳州、南宁、北流等地。

行道和庭园绿化树种。根皮治消化不良。花、根治疮。树皮可提制栲胶。木材坚硬似乌木,可作农具等用材。叶可作“雪茄烟”的外皮。蜜源植物。花、芽、嫩叶和幼果均可作蔬菜。

夏花云实

Caesalpinia aestivalis Chun et How

罗城、南丹。

Caesalpinia

广西云实

C. caesia H.-M.

刺果苏木 大托叶云实

C. crista L.

合浦、博白、南宁、龙州。

叶祛瘀止痛，清热解毒；治肝功能失调，急慢性胃炎，胃溃疡，
痢疮疖肿。可作绿篱。树皮可提制栲胶。种子可榨油。

大叶云实

C. magnifoliolata Metc.

十万大山、大瑶山、巴马、德保、那坡、凌云。

小叶云实

C. milletii Hk. et Arn.

十万大山、临桂。

根治胃病，消化不良。

南蛇簕 喙荚云实

C. minax Hance

区内各地。

根、叶清热解毒、去瘀消肿；治跌打，风湿骨痛，痢疮瘰癧，诸
骨哽喉，风热感冒。种子即苦石莲子，泻火清暑，解毒，开胃进
食；治胃肠炎，痢疾，膀胱炎，梦遗。常栽在村边园圃作绿篱。

假老虎簕 华南云实

C. nuga (L.) Ait.

(*C. kwangtungensis* Merr.)

十万大山、上林、大新、宁明、龙州、靖西、田林、河池、罗城、
临桂、龙胜等地。

根治跌打，筋骨痛，又为利尿剂。

●金凤花 洋金凤

C. pulcherrima (L.) Sm.

庭园绿化植物。

苏木

C. sappan L.

陆川、桂平、南宁、大新、凭祥、龙州、田阳、田东、隆林等地。
心材活血散瘀，通经止痛；治产后流血过多，经闭腹痛，跌打，
痈疮肿毒，肠炎，痢疾。心材含红色染料。根含黄色染料。边
材不易扭裂，为制小提琴弓的良材。枝材除含红色染料外，尚
含单宁和没食子酸。耐旱，可为干旱地区的先锋造林树种。

云实

C. sepiaria Roxb.

区内各地。

根散寒发表；治风寒感冒，麻疹不出，疝气。种子止痢截疟；治
痢疾，疟疾。润滑油。果皮、树皮可提制栲胶。绿篱植物。

狭翼云实

C. stenoptera Merr.

龙州。

鸡嘴簕

C. tsoongii Merr.

邕宁、大新、宁明、天等、田阳、乐业、巴马、东兰。

茎、叶治痢疾。

春云实

C. vernalis Champ.

瑶山云实

C. yaoshanensis Chun

大瑶山、凌云。

•番泻叶 狭叶番泻叶

Cassia angustifolia Vahl

叶消积滞，通大便；治食物积滞，胸腹胀满，大便不通。

•腊肠树

C. fistula L.

桂林。

根、树皮、果瓢为泻药。又为烟草香料。树皮可提制栲胶，木材硬重、耐朽、不易加工，可作支柱、桥梁、车辆、农具等用材。亦为美丽的庭园绿化树种。

•光叶决明

C. laevigata Willd.

在危地马拉有用本种种子作咖啡的代用品。

山扁豆 望江南、野皂角

C. mimosoides L.

区内各地。

全草清热解毒，利尿通淋，消积退肿；治水肿淋症，小儿疳积，蛇伤，夜盲，黄疸。根可治痢疾和胃痉挛。叶富含氮素，易腐，为良好绿肥，水土保持和覆盖植物。嫩茎、叶可代茶。

大叶山扁豆

C. mimosoides L.

var. *wallichiana* DC

(*C. leschenaultiana* DC)

容县、邕宁、马山、东兰、大苗山、柳州、鹿寨、恭城、临桂、桂林。

良好绿肥和水土保持、覆盖植物。嫩茎、叶可代茶。

望江南 野扁豆

C. occidentalis L.

区内各地。

种子有毒，含毒蛋白和大黄泻素，中毒重者可致死。入药，全草或种子清热解毒，明目，通便；治高血压头痛，便秘，结膜炎，蛇伤，哮喘，湿疹。绿肥植物。全草可提制栲胶。

●铁刀木

C. siamea Lam.

合浦、南宁、崇左、凭祥、龙州、桂林。

常绿，叶茂花美，常栽作道路树、庭园绿化树。生长快，材质坚硬，耐水，不受虫蛀，可作上等家具和美术、乐器用材。树皮、荚果可提制栲胶。良好薪炭材。

槐叶决明 江芒决明

C. sophora L.

梧州、龙州、靖西、柳州、临桂等地。

种子解热；治眼疾，腹痛，泻痢。根强壮利尿。苗叶可作酒曲。

嫩叶、嫩荚可供食用。嫩叶可代茶。

●黄槐

C. surattensis Burm.f.

(*C. glauca* Lam)

玉林、梧州、南宁、武鸣、宁明、桂林、临桂等地。

常栽作路树、绿篱树和用于庭园绿化。木材坚重，可作家具、农具和一般用材。叶清凉，润肺燥。

决明 假绿豆、草决明、枕头子、夜笠草

C. tora L.

区内各地。

种子或全草清肝明目，轻泻，解毒止痛；治胃痛，胁痛，肝炎，高血压，结膜炎，便秘，皮肤搔痒，毒蛇咬伤，小儿疳积。种子含蓝色染料。幼苗、叶和嫩果可食。

★紫荊

Cercis chinensis Bunge

桂林、田林、乐业等地。

树皮清热解毒，活血行气；治产后血气痛，疔疮肿毒，喉痹；花治风湿筋骨痛。常栽作庭园绿化树。

广西紫荆

C. chuniana Metc.

大苗山、全州、灌阳、兴安。

两广紫荆

C. liangkwangensis Chun

全州。

★红花槿 凤凰木、火树

Delonix regia (Boj.) Raf.

龙州、宁明、南宁、百色、梧州等地。

为热带著名观赏树种之一，常栽作道路树。树脂能溶于水，供工业用。树皮可提制栲胶。木材轻软，易加工，有弹性，可用作造纸、火柴杆、盒和家具用材。

格木

Erythrophloeum fordii Oliv.

浦北、合浦、东兴、陆川、博白、玉林、藤县、岑溪、武鸣、龙州、靖西、桂林。

木材材质坚重，为优良木材，可作建筑、造船、车辆、家具等用。种子和树皮有毒，含强心甙。

华南皂荚

Gleditsia fera (Lour.) Merr.

苍梧、武鸣、马山、临桂、全州、桂林。

豆荚、种子、树皮和树叶有毒，含皂素等。可作农药杀虫；又可

供洗涤用。木材可作家具用材。

大刺皂荚

G. macracantha Desf.

桂林。

豆荚、种子、树皮和树叶有毒，含皂素等，可作农药杀虫；又可供洗涤用。木材可作家具用材。

猪牙皂荚 牙皂

G. officinalis Hemsl.

阳朔。

果开窍祛痰，催吐；治中风口噤，喉痹；外治疥癣肿毒。

皂荚 皂角

G. sinensis Lam.

(*G. horrida* Willd.)

恭城、兴安、龙胜、临桂、桂林、融安、平南、博白、北流、富川、龙州、那坡。

豆荚、种子、树叶和树皮有毒，含皂素等。果(皂荚)、种子(皂角子)开窍，祛痰，拔毒，溃坚；治中风口噤，急性喉痹，痰喘，瘰癧，皮癣，大便不通。皂角刺治恶疮癣疥，痈疽肿毒，乳痈，通乳汁，下胞衣。作农药可杀虫。荚可代肥皂用，又是碳酸钾原料。种子油可制肥皂、润滑油。木材坚硬，可作车辆、家具用材。

肥皂荚

Gymnocladus chinensis Baill.

兴安、田林、大瑶山。

豆荚、种子有毒，含皂素等，可代皂洗衣。入药，止咳祛痰；治咳嗽，风湿，痢疾，便血，疮癣肿毒。种子油可供油漆工业用。

仪花 麻轧木、单刀根

Lysidice rhodostegia Hance

Mezoneurum-Sindora

容县、南宁、大新、龙州、那坡、田林、田阳、百色、隆林、凌云、乐业、都安、天峨、来宾。

根、茎、叶有小毒，散瘀消肿，止痛止血；治跌打，骨折，风湿关节炎，外伤出血。韧皮纤维可代麻。种子含淀粉。木材坚重，为优良用材。花美丽，为石山造林、道路和庭园绿化树种。

见雪飞

Mezoneurum sinense Hemsl.

龙州、天等、那坡、百色。

★**缅茄**

Pahudia xylocarpa Kurz

合浦、南宁。

种子可供雕刻用。

银珠

Peltophorum tonkinensis (Pierre) Gagn.

南宁(栽培)、宁明。

老虎刺 倒钩藤、黄牛蒴

Pterolobium punctatum Hemsl.

邕宁、大新、龙州、靖西、百色、隆林、凌云、乐业、凤山、东兰、河池、阳朔、临桂、桂林、兴安、富川等地。

枝叶治疗疮。

火焰花☆ 唛梅马、唛坚(均壮音)、无忧花

Saraca chinensis Merr. et Chun, ms.

扶绥、宁明、凭祥、龙州、靖西、那坡、田阳、百色等地。

树皮治风湿，月经过多。

★**海滨油楠**

Sindora maritima Pierre

南宁。

木材为优良硬木。

★越南油楠

S. tonkinensis A.Cheval.

南宁、桂林。

木材为优良硬木。

★罗晃子 酸豆

Tamarindus indica L.

桂南。

果清热解暑，消食，驱虫；治暑热，食欲不振，妊娠呕吐，大便燥结，小儿疳积，蛔虫腹痛，疟疾。木材坚硬，可供建筑、车辆、农具、家具用材。果、嫩叶可食，亦可作饮水的清洁剂。

果汁加糖水，为清凉饮料。种子可供烹调用。

米杠 米杠尚、科尚（均壮音）、四料木、砍头树

Zenia insignis Chun

宁明、大新、靖西、那坡、德保、平果、田东、田林、凌云、乐业、都安、巴马、阳朔、大瑶山。

萌芽力强，生长迅速。适作紫胶虫寄主，绿肥，猪的饲料树种。

木材坚致，可作家具用材。

148 蝶形花科 PAPILIONACEAE

鸡骨草

Abrus cantoniensis Hance

苍梧、梧州、平南、桂平、南宁、宁明、龙州等地。

种子有大毒。全草（除豆荚）清热利湿，舒肝止痛；治急、慢性

肝炎，肝硬化腹水，胃痛，小便刺痛，风湿痛，跌打，蛇伤。

毛鸡骨草☆ 牛甘藤、毛相思子

A. mollis Hance

Abrus-Alysicarpus

苍梧、藤县、平南、北流、博白、横县。

全株消炎解毒；治乳疮，小儿疳积。

鸡眼子 相思藤、山甘草

A. precatorius L.

合浦、十万大山、陆川、桂平、邕宁、南宁、宁明、龙州。

根、叶、种子有毒，种子最毒，毒性剧烈。根、叶清热利尿；治支气管炎，咽喉肿痛，肝炎，胎毒。种子拔毒排脓，杀虫；外用治痈疮癣疥，虫毒。茎皮可制绳。种子可作装饰品。

合萌 水扬葵、水皂角

Aeschynomene indica L.

全州、兴安、临桂、桂林、南丹、都安、凌云、乐业、龙州、武鸣、南宁、贵县等地。

全草或茎髓清热利尿，解毒；治尿路感染，蛇伤，小儿疳积，疮疥，黄疸。茎髓轻软，耐水湿，是遮阳帽、救生圈、游泳带等浮水用具、瓶塞等原料。很好的绿肥植物。

柴胡叶链荚豆

Alysicarpus bupleurifolius (L.) DC.

龙州、百色、凌云、柳州、桂林。

链荚豆 假地豆

A. vaginalis (L.) DC.

(**A. nummulariaefolius DC.**)

邕宁、宁明、龙州、百色、田阳、贵县、富川、桂林。

很好的绿肥植物，亦可作家畜的饲料。全株治刀伤，骨折。

异叶链荚豆

A. vaginalis (L.) DC.

var. diversifolius Chun

龙州。

• 紫穗槐

Amorpha fruticosa L.

桂林、龙州、十万大山等地有栽培。

多年生优良绿肥。家畜饲料。茎皮可提取栲胶。种子油可作油漆、肥皂、润滑油等原料。果实含芳香油，可作调香原料。叶可作农药。枝条可织篮、筐等，又供编绳、造纸。蜜源植物。耐瘠，耐水湿和轻度盐碱土，能固氮，有改良土壤作用，能固沙保土，可作沙荒、荒山、盐碱地、低湿地、堤岸、铁路和公路两旁造林保土树种和农田防护林的下木。

满塘红

Apios carnea Benth.

龙胜、恭城、临桂、大苗山、容县。

种子油可制肥皂和润滑油。

土圞儿 痲子薯

A. fortunei Maxim.

兴安。

块根、种子散积理气，补脾解毒；治疝气，脾胃虚弱，无名肿毒，淋巴结核，蛇伤，痛经，百日咳。块根味甜，可提制淀粉。种子油可制肥皂和润滑油。

• 花生 落花生、地豆

Arachis hypogaea L.

区内各地。

油料作物。油麸为肥料和饲料。茎、叶可作绿肥。

• 黄耆

Astragalus membranaceus (Fisch.) Bunge

根补气，固表止汗，生肌托疮，利尿消肿；治血气虚弱，中虚食少，气短无力，久泻脱肛，表虚自汗，血虚受风，关节酸痛麻

Astragalus-Campylotropis

木，痈疮不溃或溃久不敛，水肿等。

●紫云英 红花草、翹搖

A. sinicus L.

区内各地。

绿肥作物。家畜饲料。亦可作蔬食。种子含脂肪油。全草清火解毒；治喉痛，疔疮，痔疮。

藤槐

Bowringia callicarpa Champ.

苍梧、梧州、贺县、大瑶山、横县、上林、宁明、十万大山。

茎皮可制绳。

●木豆 三叶豆

Cajanus flavus DC.

(*C. cajan* (L.) Millsp.)

区内各地有少量栽培。

耐旱作物。种子供食用。常用作包点馅，叫豆蓉，又可制豆腐。

叶可作家畜饲料。紫胶虫优良寄主植物。绿肥作物。根解毒；

治喉肿。茎皮可作编织原料。

●毛蔓豆

Calopogonium mucunoides Desv.

(*Stenolobium brachycarpum* Benth.)

桂南栽培。

优良覆盖植物和绿肥作物。

滇南杭子梢 米过穴

Campylotropis harmsii Schindl.

桂西北。

韧皮纤维可制绳。树皮可提制栲胶。

杭子梢

C. macrocarpa (Bunge) Rehd.

藤县、德保、靖西、隆林。

绿肥。家畜饲料。枝条可供编织用具。韧皮纤维可制绳。蜜源植物。

三棱枝杭子梢

C. trigonoclada (Fr.) Schindl.

隆林。

根解热利湿，活血止血；治肠风下血，赤痢，高热，跌打，吹乳。

绒毛杭子梢

C. velutina (Dunn) Schindl.

田林、凌云、乐业。

根治赤白痢。

●直生刀豆

Canavalia ensiformis (L.) DC.

桂南地区引种。

嫩荚、种子供食用。但种子有毒，须煮熟去皮，用清水浸去毒后方可食用。

●刀豆

C. gladiata (Jacq.) DC.

区内各地。

嫩荚、种子供食用。但种子有毒，须煮熟去皮，用清水浸去毒后方可食用。果散瘀活血；治腰痛。荚壳治呃逆，牙疳。

●海刀豆

C. maritima (Aubl.) Thou

百色。

可作绿肥和覆盖植物。

小刀豆

C. microcarpa (DC.) Piper

(*C. obtusifolia* auct., non DC.)

北流、梧州。

蔓草虫豆

Cantharospermum scarabaeoides (L.) Baill.

(*Atylosia scarabaeoides* (L.) Benth.)

梧州、富川、平乐、玉林、贵县、武鸣、宁明、龙州、百色、隆林。

叶健胃，利尿；治疳积；又治乳痈。

锦鸡儿 白藓皮、雀儿花根

Caragana sinica (Buc'hoz) Rehd.

(*C. chamlagu* Lam.)

资源、兴安、临桂、桂林、富川。

根补虚益损，健脾利湿；治病后虚弱，崩漏带下，黄疸，疔肿。

花可食。韧皮纤维可制绳。绿篱植物。

铺地蝙蝠草

Christia obcordata (Poir.) Bakh.f.

(*Hedysarum obcordatum* Poir.,

Lourea obcordata Desv.)

区内各地。

蝙蝠草 月见罗藟草

C. vespertilionis (L.f.) Bakh.f.

(*Hedysarum vespertilionis* L.f.,

Lourea vespertilionis Desv.)

武鸣、崇左、宁明、都安。

全草治肺结核，虫蛇咬伤，骨折。

翅荚香槐

Cladrastis platycarpa (Maxim.) Mak.

全州、临桂、桂林、大苗山、南丹、隆林、武鸣、大新、合浦。

石灰岩石山速生树种。叶可作马饲料。

香槐

C. wilsonii Takeda

桂林、龙胜、大苗山。

石山绿化树种。

三叶蝶豆 三叶蝴蝶花豆

Clitoria mariana L.

隆林。

巴豆藤

Craspedolobium schochii Harms

桂西北。

翅托叶猪屎豆(注)

Crotalaria alata Ham. ex Roxb.

(*C. sagitticaulis* Wall.,

C. bialata Roxb.)

龙州、田林、百色、隆林、天峨。

响铃豆

C. albida Heyne ex Roth.

区内各地。

叶治黄疸，乳疮，疳积。

注：本属大多数种类可作绿肥。

*三尖叶猪屎豆

C. anagyroides H. B. et K.

桂林、南宁等地。

大猪屎青

C. assamica Benth.

龙州、平果、靖西、德保、那坡、百色、天峨、大瑶山、平乐。
叶止血，驱虫；治跌打，刀伤，风湿骨痛，小儿疳积。

长萼猪屎豆

C. calycina Schrank

(*C. stricta* Roxb.,

C. roxburghiana DC.)

宁明、田阳、百色、乐业、临桂。
全株治小儿疳积。

华野百合

C. chinensis L.

容县、邕宁。

假地蓝

C. ferruginea (Grah) Benth.

(*C. rufescens* Fr.,

C. bodinieri Lévl.)

区内各地。

全草补肾消炎，平喘，止咳。治目眩耳鸣，遗精，慢性肾炎，膀胱炎，慢性支气管炎，扁桃腺炎，淋巴腺炎，肾结石，疔疮，用鲜叶捣烂外敷。根、茎作农药，又可灭蛆、孑孓。又为绿肥、牧草、水土保持植物。

● 太阳麻 桤麻

C. juncea L.

(*C. sericea* Willd.,

C. tenuifolia Roxb.)

绿肥作物。韧皮纤维可作各种麻织品、船缆、鱼网和造纸等原料。种子可作牛饲料。种子清血解毒；治癬疥。

线叶猪屎豆

C. linifolia L.

(*C. caespitosa* Roxb.,

C. stenophylla Vog.,

C. taiwaniana Matsum.,

C. chinensis Hance)

区内各地。

全草清热解毒，理气消积；治毒疮，癬疥，腹痛。

猪屎豆

C. mucronata Desv.

(*C. striata* DC, *C. saltiana* auctt., non Andr.)

陆川、北流、贵县、桂平、蒙山、邕宁、宁明、巴马、百色、柳州、桂林等地。

枝、叶是很有价值的绿肥，亦可作粗饲料。韧皮纤维可织麻袋、制绳。种子补肝益肾，明目去翳；治神经衰弱，遗精早泄，遗尿，白带，眼目昏花。

粗毛猪屎豆☆ 庇古猪屎豆

C. peguana Benth.

隆林。

野百合 农吉利

C. sessiliflora L.

Crotalaria-Dalbergia

桂林、临桂、兴安、罗城、大瑶山、苍梧。

饲料和牧草。全草抗癌，滋阴润燥，解热通淋，补虚；治皮肤癌。

子宫颈癌，痢疾，热淋，久咳，病后虚弱。种子治小儿疳积。

四棱猪屎豆

C. tetragona Roxb.

(*C. esquirolii* Lévl.)

百色、乐业、隆林。

*光萼猪屎豆 苦罗豆

C. usaramoensis Baker f.

适应性和繁殖力均较强，为良好的覆盖和绿肥植物。韧皮纤维可制绳、织麻袋。

南岭黄檀(注)

Dalbergia balansae Prain

区内各地。

紫胶虫寄主树种。韧皮纤维可代麻。常栽作风景树和荫蔽树。

粤黄檀

D. benthami Prain

上思、百色。

黔黄藤

D. cavaleriei Lévl.

大瑶山、罗城、隆林。

*海南黄檀

D. hainanensis Merr. et Chun

桂林有引种。

紫胶虫寄主树。材质坚硬，可供建筑、板料、家具、扁担、雕刻等用材。

注：本属乔木种类，多是良好材用树种。

藤黄檀 大香藤

D. hancei Benth.

区内各地。

韧皮纤维可制绳，织麻袋或麻布。树皮可提制栲胶。

黄檀

D. hupeana Hance

隆林、田林、凌云、乐业、南丹、龙州、大苗山、兴安、临桂、桂林。

木材良好，坚重，可制裁重和耐冲撞器物，如枪柄、车轴、油榨、滑轮、农具等。紫胶虫寄主树种。茎、叶杀虫。

含羞草叶黄檀

D. mimosoides Fr.

容县、上思。

桂西黄檀☆

D. munghoi Chun, ined.

十万大山、德保、凌云、乐业、隆林。

紫胶虫寄主树种。

●钝叶黄檀 牛肋巴

D. obtusifolia Prain

桂西、桂南有引种。

紫胶虫优良寄主植物。

●降香黄檀

D. odorifera T.Chen

桂林有引种。

木材为制优质家具良材；又可蒸馏降香油，是香料的定香剂。根部心材叫降香，为良好的镇痛剂。紫胶虫寄主树种。

Dalbergia-Derris

羽叶黄檀

D. pinnata (Lour.) Prain

(*D. tamarindifolia* Roxb.)

十万大山、龙州、凌云、乐业、隆林、东兰、天峨。

多体蕊黄檀

D. polyadelpha Prain

那坡、百色、田林、隆林。

紫胶虫寄主树种。

多裂黄檀

D. rimosa Roxb.

博白、德保。

紫胶虫寄主树种。

★思茅黄檀 紫梗树、秧青

D. szemaoensis Prain

桂南、桂西有引种。

紫胶虫寄主树种。

桂粤黄檀☆

D. tonkinensis Prain

桂西南。

滇黔黄檀

D. yunnanensis Fr.

德保、那坡、田林、西林、隆林、凌云。

紫胶虫寄主树种。韧皮纤维可制绳索。

白花鱼藤(注)

Derris alborubra Hemsl.

合浦、梧州、龙州。

注：本属植物多含鱼藤酮，为优良的农药，有杀虫和毒鱼的功效。

黔鱼藤

D. cavaleriei Gagn.

隆林、乐业。

*毛鱼藤

D. elliptica (Wall.) Benth

柳州、南宁等地。

很好的杀虫植物。根液有促进植物生长的功效。根治癣疥湿疹。

毛果鱼藤

D. eriocarpa How

南宁、上林、龙州、那坡、隆林、罗城。

锈毛鱼藤 锈叶鱼藤、荔枝藤、老荆藤

D. ferruginea Benth.

十万大山。

很好的杀虫植物，有效成分含量高。

揭阳鱼藤☆

D. fordii Oliv.

全州、临桂、桂林、天峨、都安。

可作绿肥。

亮叶揭阳鱼藤☆

D. fordii Oliv.

var. *lucida* How

临桂、桂林、环江、柳州、凤山、龙州。

可作绿肥。

粉叶鱼藤

D. glauca Merr. et Chun

十万大山。

韧皮纤维可织麻布、麻袋、编绳和制人造棉。

Derris-Desmodium

肇庆鱼藤☆

D. hancei Hemsl.

博白、扶绥。

根接骨；治跌打。

大叶鱼藤

D. latifolia Prain

陆川、大明山、龙州、那坡。

边荚鱼藤

D. marginata (Roxb.) Benth.

桂林、临桂、凤山、凌云、乐业、隆林。

较好的杀虫植物。根粉液防治稻飞虱、浮尘子、菜青虫、桑金龟子及森林食叶虫等害虫。

密锥花鱼藤

D. thyrsiflora Benth.

十万大山。

黔桂鱼藤

D. tonkinensis Gagn.

桂西南。

大叶黔桂鱼藤

D. tonkinensis Gagn.

var. *compacta* Gagn.

龙州。

毛排钱草

Desmodium blandum Van Meeuwen

(*Phyllodium elegans* Desv.,

D. elegans (Lour.) Benth.)

区内各地，以桂西、桂南较多。

根、叶清热解表，活血散瘀；治风热感冒，疟疾，肝脾肿大，风湿骨痛，跌打瘀肿，血崩。

山蚂蝗 小槐花、拿身草、粘身草、米赠草

D. caudatum (Thb.) DC.

(*Hedysarum caudatum* Thb.,

D. laburnifolium (Poir.) DC.,

Catenaria caudata (Thb.) Schindl.)

区内各地。

根或全株清热解毒，消食止痛，透疹，杀虫；治胃痛，胃炎，肠炎，腹泻，胃及十二指肠溃疡，小儿疳积，疹出不透，感冒发热，腮腺炎，淋巴腺炎，蛇伤。叶捣烂外敷，治疮疖。花调经；治月经不调。全草可灭蛆。

假山绿豆 宽卵叶山蚂蝗

D. fallax Schindl.

全州。

全草清热解表；治风热感冒。

大叶山绿豆☆ 大叶山蚂蝗

D. gangeticum (L.) DC.

梧州、南宁、武鸣、龙州、田阳、百色、隆林、河池。

舞草

D. gyrans (L.) DC.

(*Codariocalyx gyrans* (L.f.) Hassk.)

南宁、龙州、靖西、那坡、百色、田林、凌云、乐业、河池、巴马、天峨、龙胜、恭城、贺县。

圆叶舞草

D. gyroides (Roxb.) DC.

(*Codariocalyx gyroides* (Roxb.) Hassk.)

Desmodium

宁明、龙州、那坡、百色、田林、隆林、乐业、巴马、都安、天峨、河池、临桂、荔浦、昭平、容县。

异果山绿豆 假地豆

D. heterocarpum (L.) DC.

区内各地。

全株驳骨，解毒；治跌打骨折，蛇伤。韧皮纤维可造纸、制绳。

异叶山绿豆

D. heterophyllum (Willd.) DC.

恭城。

滇桂山绿豆☆

D. karenium Kurz

龙州。

广东山绿豆 广东排钱草

D. kwangtungensis Chun, ined.

十万大山。

大叶拿身草

D. laxiflorum DC.

贺县、大瑶山、龙州、德保、南丹。

疏花山绿豆

D. laxum DC.

(*D. gardneri* Benth.)

容县、苍梧、贺县、大瑶山、宁明、龙州、百色。

长叶排钱树

D. longipes Craib

(*Phyllodium longipes* (Craib) Schindl.)

博白、北流、贵县、岑溪、梧州、隆林。

铺地山绿豆 小叶三点金草、红藤

D. microphyllum (Thb.) DC.

(*D. parvifolium* (Spreng) DC)

区内各地。

全草解毒散瘀，消食，利尿；治蛇伤，黄疸，咳嗽，跌打，疳积，疥疮，痈疮溃疡。保土植物。

蔓茎葫芦茶

D. pseudotriquetrum DC.

(*Pteroloma pseudotriquetrum* Schindl)

临桂、靖西、德保。

用途参阅葫芦茶。

排钱草 钱串木、燕子尾

D. pulchellum (L.) Benth.

(*Phyllodium pulchellum* (L.) Desv.)

区内各地。

全草清热解表，活血散瘀，治风热感冒，疟疾，跌打肿痛，风湿骨痛，肝脾肿大，赤白带下，血崩。

总序山绿豆☆ 总序山蚂蝗

D. racemosum DC.

兴安、龙胜、临桂、苍梧、大苗山、大瑶山、都安、凌云、田林、隆林。

保土植物。

显脉山绿豆 山地豆

D. reticulatum Champ.

隆林、苍梧等地。

全草去腐生肌；治刀伤。

饿蚂蝗 红掌草

D. sambuense (G Don) DC.

灌阳、兴安、龙胜、临桂、永福、阳朔、贺县、大苗山、大瑶山、德保等地。

叶可代茶。

长波叶山绿豆☆ 长波状叶山蚂蝗

D. sequax Wall.

恭城、昭平、大瑶山、隆林、那坡。

菱叶山绿豆☆ 波状叶山蚂蝗

D. sinuatum Bl.

龙胜、兴安、苍梧、大瑶山、环江、南丹、凤山、凌云、隆林、龙州、大新。

广东金钱草 金钱草

D. styracifolium (Osb.) Merr.

玉林、桂平、贵县、南宁、龙州。

全草平肝火，清湿热，利尿通淋；治肾炎浮肿，尿路感染，尿路结石，胆囊结石，黄疸肝炎，小儿疳积，荨麻疹。绿肥植物。

野蚂蝗 假木豆

D. triangulare (Retz.) Merr.

(*D. cephalotes* (Roxb.) W. et A.)

梧州、贵县、大新、宁明、龙州、巴马、都安、河池、南丹、天峨、那坡、田林、隆林、百色。

根清热凉血，强筋壮骨，健脾利湿；治瘫痪，喉痛，腹泻，跌打内伤，骨折，吐血，咯血。绿肥、保土植物。马饲料。

三花山绿豆☆ 细叶野花生、三点金草

D. triflorum (L.) DC.

陆川、博白、玉林、平南、桂平、贵县、苍梧、昭平、大瑶山、横县、南宁、龙州、东兰、隆林。
全株治蛇伤。保土植物。

葫芦茶

D. triquetrum (L.) DC.

(*Pteroloma triquetrum* (L.) Benth.)

区内各地。

全草清热解毒，祛痰，消食，杀虫，利尿；治肝炎，支气管炎，消化不良，肾炎，细菌性痢疾，肠炎，慢性溃疡，风热感冒。全草作凉茶；煎剂或浸液能灭蝇蛆、孑孓。绿肥植物。

绒毛山绿豆☆ 绒毛叶山蚂蝗

D. velutinum (Willd.) DC.

南宁、宁明、龙州、那坡、百色、隆林。

长荚山绿豆 单叶拿身草

D. zonatum Miq.

龙州。

●扁豆 雪豆、蛾眉豆、白扁豆、藊豆

Dolichos lablab L.

区内各地。

嫩荚供作蔬食。种子补脾胃，化暑湿，解毒；治脾胃虚弱，呕吐泄泻，暑湿内蕴，脘腹胀满，带下等，又解酒毒、河豚毒。

瑶山山黑豆

Dumasia nitida Chun, ined

大瑶山。

Dunbaria-Erythrina

山坡豆 山黄豆

Dunbaria fusca (Wall) Kurz

岑溪、苍梧、平南和桂西。

根、叶健胃利尿；治黄疸，疳积。

长柄野扁豆 水芽豆

D. podocarpa Kurz

博白、容县、北流、平南、贵县、武鸣、龙州、靖西。

全株解毒，消肿痛；治咽喉炎。

圆叶野扁豆

D. rotundifolia (Lour) Merr.

贺县、昭平、南宁。

鸡头薯 猪仔笠、雀脯珠

Eriosema chinense Vog.

区内各地。

块根化痰止咳，补肾，凉血，清热毒，活血消肿；治痢疾，伤风咳嗽，跌打损伤，湿热腹痛，热病烦渴。块根含淀粉，可供食用。

●象牙红 龙芽花

Erythrina corallodendron L.

桂林、南宁等地。

树皮有麻醉镇静作用。材质柔软，可代软木。绿化树木。

刺桐 广东象牙红、海桐皮

E. variegata L.

var. *orientalis* (L) Merr.

(*E. indica* L.)

博白、北流、南宁、武鸣、宁明、龙州、靖西、那坡、平果、凌

云、桂林等地。栽培或野生。

树皮祛风湿，通经络，驱虫；治风湿关节炎，小儿疳积，蛔虫。

绿篱树种。树皮可制绳，作饲料。

三小叶山豆根

Euchresta trifoliolata Merr.

贺县、全州。

土甘草 虾须草

Fordia cauliflora Hemsl.

苍梧、南宁、龙州、田阳、百色、隆林、东兰。

根、叶清热毒；治毒疮。

● 黄豆 大豆、菽

Glycine max (L.) Merr.

(*Phaseolus max* L.,

Dolichos soja L.,

G. gracilis Skoortz)

区内各地。

重要油、粮作物，种子含蛋白质和脂肪，除供食用外，亦作豆酱、酱油、豆腐和工业用原料。种子油是主要食用油，亦是工业原料。茎、叶和油粕是肥料和饲料。茎皮可织麻袋。本种久经栽植，栽培品种很多，如大豆、黄豆、黑豆等。

深紫木蓝(注)

Indigofera atropurpurea Buch-Ham.

资源、兴安、龙胜、富川、柳州、东兰、田林、隆林、宁明。

野木蓝☆ 野蓝枝子

I. bungeana Steud.

全州、灌阳、恭城、临桂、桂林、河池、都安、天峨、凌云、隆

注：本属多数种类是绿肥、保土和改良土壤植物。

Indigofera

林。

全草生肌收口，止血消肿，清热利湿；治吐血，枪伤，刀伤，腹痛，痔疮，下肢溃疡，小儿口疮，无名肿毒，水泻。

尾叶木蓝

I. caudata Dunn

凌云。

庭藤

I. decora Lindl.

龙胜、临桂、贺县、百色、隆林、龙州。

假大青蓝

I. galeoides DC.

邕宁、宁明、龙州。

可提取染料。

毛木蓝

I. hirsuta L.

钦州、邕宁、凌云、凤山、南丹、桂林。

枝、叶去毒消肿；治疮疥。

黑叶木蓝

I. nigrescens Kurz

资源、兴安、龙胜、临桂、桂林、贺县、玉林、大苗山、天峨、百色。

广东木蓝☆

I. parkesii Craib

百色。

马棘 野蓝靛、野蓝枝子、狼牙草

I. pseudotinctoria Matsum.

临桂、桂林、河池、凌云、乐业、田林、南宁。

全株解毒；治疮毒，小儿食积，寒凉咳嗽，痔疮。可制蓝色染料。马饲料。

茸毛木蓝

I. stachyoides Lindl.

隆林、南丹。

根滋阴补肾，补气摄血；治便血，下痢日久体虚，气血两亏。

假蓝靛

I. suffruticosa Mill.

区内各地，多为栽培，以桂南、桂东为多。

可提取天然蓝靛。根清热解毒，消炎止痛；治咽喉炎，淋巴腺炎，腮腺炎，高热。又是良好绿肥。

木蓝 火蓝

I. tinctoria L.

苍梧、龙州、临桂。

常栽培作染料用。全株泻肝，散郁火，凉血解毒；治喉痛，疮疥。

三叶木蓝

I. trifoliata L.

玉林、柳州、阳朔、临桂。

根治喉痛。

尖叶木蓝

I. zollingeriana Miq.

梧州、昭平、永福、天峨、南宁、龙州、凌云、乐业。

长萼鸡眼草

Kummerowia stipulacea (Maxim) Mak.

巴马、临桂。

绿肥、饲料、水土保持植物。

Kummerowia-Lespedeza

鸡眼草 乌蝇翼、夜关门

K. striata (Thb.) Schindl.

(*Lespedeza striata* H. et A.)

区内各地。

全草清热解毒，排脓生肌，消积滞；治肝郁疼痛，湿热黄疸，目赤肿痛，腰痛，腹泻，乳痈，疖肿，跌打损伤。绿肥、牧草、保土植物。

胡枝子

Lespedeza bicolor Turcz.

大苗山、龙胜等地。

用途参阅美丽胡枝子。

铁扫把 夜关门、蚊虫草

L. cuneata G. Don

(*L. sericea* Miq)

桂林、柳州、梧州、南宁、百色等地区。

全草清热解毒，健脾消积，去湿杀虫；治痢疾腹泻，支气管炎，尿路结石，小儿疳积，遗尿，疝气，夜盲，白浊，白带，蛇伤。绿肥、保土、牧草植物。

大叶胡枝子

L. davidii Fr.

灌阳、恭城、兴安、灵川、临桂。

保土、绿肥植物。枝条可编筐篓。韧皮纤维为造纸、人造棉、麻袋、制绳等原料。

广东胡枝子

L. fordii Schindl.

柳州。

美丽胡枝子 把天门

L. formosa (Vog) Koehne

桂林、柳州、梧州、玉林、南宁等地区。

鲜根活血散瘀，消肿止痛；治跌打肿痛，骨折，脱臼，风湿骨痛，腹痛，肺病。花清热；治便血，肺热咳嗽。保土、覆盖、绿肥、牧草植物。

茸毛胡枝子

L. tomentosa (Thb.) Sieb. ex Maxim.

天峨。

根健脾补虚。治虚癆、虚肿。

细梗胡枝子

L. virgata (Thb.) DC.

临桂。

百脉根

Lotus corniculata L.

桂东北。

饲料植物。

*南苜蓿 黄花草子

Medicago hispida Gaertn.

桂林。

绿肥、牧草植物。嫩叶可作蔬菜。

*天蓝苜蓿

M. lupulina L.

桂林。

绿肥、牧草和饲料植物。

小苜蓿

M. minima Lamk.

隆林。

● 苜蓿 紫花苜蓿、紫苜蓿

M. sativa L.

桂林、柳州。

优良牧草和饲料植物。也是绿肥、蜜源植物。

小花草木犀 印度草木犀

Melilotus indicus (L.) All.

(*M. parviflora* Desf.)

隆林、天峨、河池。桂林有栽培。

覆盖和绿肥植物。全草清热解毒，敛阴止汗；治白口疮，虚汗，皮肤搔痒。

银瓣崖豆藤

Millettia argyraea T.Chen

临桂、灵川、龙胜、兴安、全州、恭城、贺县、昭平、平南、容县、大瑶山、大苗山。

根可作农用杀虫剂。茎补血，行血；治跌打。

越南崖豆藤

M. cochinchinensis Gagn.

山鸡血藤 血见愁、马下消、香花崖豆藤

M. dielsiana Harms ex Diels

区内各地。

藤茎行血补血，舒筋活络；治风湿性关节炎，腰腿痛，贫血，闭经，遗精，胃痛。种子可杀虫。茎皮可作造纸原料，亦可代麻作绳索等。

异果崖豆藤

M. heterocarpa Chun ex T.Chen

全州、恭城、兴安、临桂、大瑶山、柳州、巴马、东兰、宁明、龙州、德保、田东、百色、田林、隆林、凌云。

根和种子可作农用杀虫剂。

毛瓣崖豆藤

M. lasiopetala (Hay.) Merr.

(*Derris lasiopetala* Hay.,

M. obovata Gagn.)

那坡、大瑶山。

根可作农用杀虫剂。

亮叶崖豆藤 血风藤

M. nitida Benth.

十万大山、宁明、马山、靖西、凤山、大苗山、三江、永福、桂林、兴安、全州。

根可作农用杀虫剂。茎皮可作造纸、制绳原料。

蛋果崖豆藤

M. oosperma Dunn

容县、龙州、靖西、那坡、平果、百色、田林、凌云、乐业、隆林、都安、天峨、凤山、桂林、阳朔、贵县。

藤补血。种子可作农用杀虫剂。叶可作马饲料。

厚果崖豆藤 厚果鸡血藤、冲天子、苦坛子

M. pachycarpa Benth.

区内各地。

种子和根有毒，含鱼藤酮和鱼藤素，可作农用杀虫剂。种子消肿，杀虫；治疮疥。茎皮可作人造棉、造纸原料。

海南崖豆藤 毛蕊鸡血藤

M. pachyloba Drake

陆川、十万大山、大明山、龙州、那坡、百色、凌云、乐业、巴马、大瑶山、北流。

茎皮可代麻、制绳。

Millettia

美花崖豆藤

M. pulchra (Colebr.) Kurz

容县、永福、临桂、兴安、天峨、隆林。

根、叶可作农用杀虫剂。

疏叶崖豆藤

M. pulchra (Colebr.) Kurz

forma laxior Dunn

临桂、柳州、凌云、南宁。

昆明鸡血藤 鸡血藤、网络鸡血藤

M. reticulata Benth.

区内各地。

根和树皮有毒，可作农用杀虫剂；种子和叶也可能有毒。入药，藤和根补血行血，通经活络，壮筋骨；治风湿骨痛，腰腿痛，贫血，遗精，阳萎，月经不调，白浊、白带。茎皮可供编织，作人造棉、造纸原料。花紫色至玫瑰红色，可供庭园绿化。

狭叶崖豆藤

M. reticulata Benth.

var. stenophylla Merr. et Chun

融安。

广西崖豆藤☆ 无患子叶崖豆藤

M. sapindifolia T Chen

凌云、南丹。

实心崖豆藤

M. solida T.Chen, ined.

乐业。

根补血行血。

美丽崖豆藤 牛大力

M. speciosa Champ.

钦州、玉林、梧州、南宁、河池、百色等地区。

根补虚润肺，强筋活络；治风湿骨痛，腰肌劳损，慢性肝炎，肺虚咳嗽。根含淀粉，可制代藕粉和酿酒；酒糟可作饲料。

虎崖豆藤 老虎豆、连珠豆

M. tsui Metc

北流、博白、苍梧、大瑶山、十万大山、宁明、靖西、凤山、平乐、临桂、桂林、龙胜、恭城。

根可作农用杀虫剂。韧皮纤维可代麻。

蚌壳千斤拔 ☆ 半灌木千斤拔、咳嗽草、百咳草

Moghania fruticulosa (Wall. ex Coll) Wang et Tang
(Flemingia fruticulosa Wall. ex Coll.)

恭城、阳朔、昭平、苍梧、藤县、平南、桂平、忻城、柳州、都安、东兰、天峨、隆林、百色、平果、宁明。

根治风湿痛，疮疥，咳嗽。

大叶千斤拔 钻地风、掏马桩、大力黄

M. macrophylla (Willd.) O Ktze

(Flemingia macrophylla Ktze ex Prain,

F. prostrata Roxb.)

区内各地。

根舒筋活络，强腰壮骨；治风湿骨痛，腰肌劳损，劳伤咳嗽，气虚脚肿，咽喉肿痛。作兽药，治猪脚软，牛挫伤，折骨，风湿，肿胀，痢疾，胃炎。

蔓性千斤拔

M. philippinensis (Merr. et Rolfe) H L Li

(Flemingia philippinensis Merr. et Rolfe,

M. prostrata Wang et Tang,

non Flemingia prostrata Roxb)

Mucuna

区内各地。

根祛风除湿，强筋活血，消炎止痛；治风湿痹痛，跌打损伤，腰肌劳损，瘫痪，咽喉炎，劳伤久咳，肝炎，阳萎，头痛。

鸡血藤 白花油麻藤、血藤

Mucuna birdwoodiana Tutch.

区内各地。

藤补血行血，通经络，强筋骨；治贫血，白血球减少症，萎黄病，月经不调，瘫痪，腰腿痛。种子有毒，但含有淀粉。

黑血藤 黑肉风

M. castanea Merr.

十万大山、武鸣、宁明、龙州、田阳、梧州等地。

藤补血活血，通经，壮筋骨；治风湿痹痛，月经不调，贫血，萎黄病。

绢毛油麻藤

M. championi Benth.

临桂。

●猫豆

M. cochinchinensis (Lour.) A Cheval.

桂林、临桂、梧州、北流、容县、南宁等地。

种子有毒，但经水泡处理后可食用。

海南黎豆

M. hainanensis Hay.

(*M. suberosa* Gagn)

桂东南。

刺毛黎豆

M. pruriens (L.) DC.

(*M. prurita* Wight)

隆林。

如被荚果上的刺毛所刺，可使皮肤肿痛。

黄毛黎豆

M. venulosa (Piper) Merr.

(*Stizolobium venulosum* Piper)

百色、田林。

喙顶红豆(注)

Ormosia apiculata L.Chen

凌云、隆林。

长脐红豆

O. balansae Drake

(*O. elliptilimba* Merr. et Chun)

十万大山。

肥荚红豆

O. fordiana Oliv.

十万大山、昭平、大瑶山、南丹、宁明、龙州、靖西、那坡、百色、田林。

光叶红豆

O. glaberrima Wu

(*O. kwangsiensis* L.Chen)

苍梧、大瑶山、十万大山。

花榈木 花梨木

O. henryi Prain

全州、桂林、临桂、大苗山、罗城、田阳。

优良材用树种，木材可制上等家具。

注：本属树木一般供材用，也可供庭园绿化用。

Ormosia

红豆树

***O. hosiei* Hemsl. et Wils.**

优良材用树种。种子镇痛；治心气痛。

韧荚红豆

***O. indurata* L.Chen**

十万大山。

皮青木

***O. merrilliana* L.Chen**

十万大山。

小叶红豆

***O. microphylla* Merr.**

十万大山。

南宁红豆

***O. nanningensis* L.Chen**

十万大山。

茸荚红豆

***O. pachycarpa* Champ. ex Benth.**

河池、贵县。

菱荚红豆

***O. pachyptera* L.Chen**

那坡。

海南红豆

***O. pinnata* (Lour.) Merr.**

(*O. hainanensis* Gagn.)

合浦、陆川、龙州。

软荚红豆

O. semicastrata Hance

(*O. cathayensis* L.Chen)

苍梧、永福、大瑶山、荔浦。

韧皮纤维可作人造棉、编绳原料。

苍叶红豆

O. semicastrata Hance

forma pallida How

大瑶山、横县、十万大山、阳朔、永福、临桂、龙胜。

亮毛红豆

O. sericeolucida L.Chen

十万大山。

单叶红豆

O. simplicifolia Merr. et Chun ex L.Chen

桂西南。

木荚红豆

O. xylocarpa Chun ex L.Chen

(*O. polysperma* L.Chen)

十万大山、武鸣、平乐、永福、龙胜、全州、大苗山。

★ **葛薯** 凉薯、沙葛、豆薯、地瓜

Pachyrhizus erosus (L.) Urban

区内各地。

块根可生食或熟食，也可提取淀粉。种子有毒，可作农用杀虫剂，

治烟蚜、甘蔗蚜虫、竹铁甲虫成虫、黑守瓜、黄守瓜等。花解

酒毒；治酒毒烦渴，肠风下血。种子油可制肥皂。

★ **赤豆**

Phaseolus angularis (Willd.) W.F.Wight

Phaseolus-Pisum

区内各地。

种子供食用。

赤小豆

P. calcaratus Roxb.

栽培或野生。

种子利水行血，除湿热，消肿排脓；治水肿脚气，痢疾腹泻，痈疽肿毒；供食用。

●棉豆 荷包豆、雪豆、金甲豆、香豆

P. lunatus L.

种子作蔬菜；入药，可消肿。

狭叶菜豆

P. minimus Roxb.

兴安。

●绿豆

P. radiatus L.

(*P. aureus* sensu Merr. et Chun, non Roxb.)

种子供食用；入药，清热解毒，利尿。茎、叶可作绿肥。

●菜豆 四季豆、云扁豆

P. vulgaris L.

区内各地。

嫩荚供蔬菜食用。

滇绿豆

P. yunnanensis Wang et Tang

桂西北。

●豌豆 荷兰豆

Pisum sativum L.

区内各地。

嫩叶和种子供食用。茎、叶可作绿肥、饲料。

水黄皮

Pongamia pinnata (L.) Merr.

钦州专区。

种子催吐；种子油治癣疥，脓疮。很好的护堤植物。叶作绿肥和饲料。

●四棱豆

Psophocarpus tetragonolobus DC.

灵山。

块根、嫩荚供食用。

补骨脂 破故纸

Psoralea corylifolia L.

岑溪、桂平。

多栽作药用；种子补肾壮阳，固精缩尿，强腰膝；治阳萎，遗精，遗尿，腰膝冷痛；酊剂治白癜风，鸡眼。

●紫檀

Pterocarpus indicus Willd.

南宁。

木材为建筑、优良家具用材。公路树。

山葛藤

Pueraria montana (Lour.) Merr.

(*P. tonkinensis* Gagn.)

梧州、容县、宁明。

云南葛藤

P. peduncularis Grah.

(*P. yunnanensis* Fr.)

隆林、南丹。

Pueraria

韧皮纤维可制人造棉，织布。藤可编织用具。根和藤作农药，有胃毒和触杀作用，并兼有一定乳化效能，亦可和六六六混用。根或藤磨粉煮液，可杀蚜虫、红蜘蛛、幼龄棉铃虫等。根和花亦作药用，参阅葛藤。

三裂叶葛藤

P. phaseoloides (Roxb.) Benth.

(*P. javanica* Benth.)

博白、梧州、贺县、桂林等地。

韧皮纤维可代黄麻制绳索，织麻袋。根含淀粉，可制糕点，酿酒。可作保土防沙的覆盖植物。

葛藤

P. pseudohirsuta Tang et Wang

容县、龙州、百色。

根入药，解肌透疹，生津止渴；治斑疹不透，温病发热，头痛项强，烦渴泻痢。花解酒毒。根茎和块根含淀粉，但有毒，须经水泡处理，提取淀粉，方能供食用，酿酒，作糊料、饲料等用。根磨成粉的煮液可防治水稻金花虫、玉米螟幼虫、蚜虫、红蜘蛛、稻螟、地老虎、水稻负泥虫；根粉作成毒饵，可诱杀粘虫；根、叶液可杀蛆和孑孓。我国古来即利用葛藤茎皮纤维织成葛布，编绳索；亦可造纸和作人造棉原料。从葛根提制淀粉所剩的渣纤维，可作填充物和造纸用，加入油漆可供补船等用。良好的水土保持覆盖植物。干草为我国良好饲料之一，马、牛特别喜吃。种子油可作机械润滑油。

●粉葛

P. thomsoni Benth

(*Dolichos trilobus* Lour.)

梧州、南宁、龙州、十万大山、百色、桂林等地。

块根可作蔬菜，提取细粉即葛粉，可治腹泻，亦供食用和酿酒。

茎皮纤维可作粗纺原料，织麻袋，编绳。种子油可作机械润滑油。根、花入药，功用参阅葛藤。

野葛

P. thunbergiana (S. et Z.) Benth.

(*Pachyrhizus thunbergiana* S. et Z.)

区内各地。

用途参阅葛藤。

密子豆

Pycnospora lutescens (Poir) Schindl.

(*P. nervosa* W. et A.,

P. hedysaroides R.Br. ex W. et A.)

龙州、那坡、百色。

保土和绿肥植物。

老鼠眼

Rhynchosia chinensis H T.Chang, ined.

凌云、乐业、南丹、苍梧。

叶可提黄色染料。

淡红鹿藿

R. rufescens (Willd.) DC.

桂西。

鹿藿 · 山黑豆

R. volubilis Lour.

区内各地。

叶止痛，止血；治牙痛，乳痛，刀伤。

●刺槐

Robinia pseudoacacia L.

Sesbania-Smithia

全州、临桂、桂林等地。

道路树。叶可作饲料、绿肥。树皮可作栲胶原料。韧皮纤维可供造纸，制人造棉。花可供蔬食。又含芳香油，可作调香原料。

种子油可制肥皂、油漆。木材供枕木、车辆、造船等用。

多刺田菁

Sesbania aculeata Pers.

田林。

绿肥。改良土壤植物。

*田菁

S. cannabina (Retz.) Pers.

(*Aeschynomene cannabina* Retz.)

区内各地。

绿肥。牛、马饲料。韧皮纤维可织麻袋，编绳。

锈色宿苞豆

Shutteria ferruginea Baker

南宁、宁明。

毛宿苞豆

S. pampaniniana H.-M.

东兰、凌云、乐业。

全株治咳嗽。

西南宿苞豆

S. vestita W. et A.

龙州、百色。

根补血，调经。

田基豆 水百足

Smithia sensitiva Ait.

陆川、玉林、钟山、昭平、贺县、大瑶山、柳州、兴安、宁明、

隆林。

全株治疮毒，咳嗽，蛇伤。

苦参 流产草

Sophora flavescens Ait.

全州、灌阳、桂林、罗城、东兰、天峨、隆林、梧州。

根清热解毒，燥湿杀虫；治肠炎，痢疾，痔疮出血，赤白带下，咽喉肿痛，遗精，黄疸，瘰癧，阴道滴虫病，阴痒，湿疹。根茎、种子有杀虫作用，又有良好湿润和展布性能，可作农药辅助剂用。苦参的水浸液或煮液可防治稻飞虱、浮尘子、杨树天社蛾、大麦蚜虫等；又可灭子孓。韧皮纤维可制绳索，织麻袋，造纸。种子油可制肥皂、润滑油。

槐树 中国槐

S. japonica L.

桂林、柳州、河池、百色、南宁等地区。

花蕾（槐米）、花和果（槐花和槐角）凉血止血；治便血，痔血，吐血，衄血，高血压，目赤肿痛，尿血，肠胃出血，糖尿病。槐米、槐角和枝作兽药，治牛臌胀病，胀胆症，赤白痢，瘟疫和风湿症。花含芳香油，可作调香原料。种子油可制肥皂、润滑油；亦可掺和油漆使用。油粕可作饲料。木材良好，供建筑、车辆、家具和雕刻等用。花和芽可食用。干花可染浅黄色布。荚果外皮可制糖。叶液可防治蚜虫、菜蚜、青虫、软体害虫。韧皮纤维可作造纸等原料。根深，抗风力强，生长尚快，萌芽力强，在石灰性、中性和酸性土都可生长，为石山、平地绿化优良树种。蜜源树种。

西南槐树

S. mairei Pamp.

隆林、凌云、乐业、凤山、灵川。

广豆根

S. subprostrata Chun et T.Chen

Sophora-Tephrosia

靖西、德保、那坡、田阳、百色、乐业、凤山、南丹、罗城。

根即中药广豆根，泻热解毒，清利咽喉；治热毒咽喉肿痛，肺热咳嗽，黄疸，便秘，牙龈肿痛，疮肿，癣疥。

白刺花

S. viciifolia Hance

隆林。

水土保持树种。

广西槐树 小红豆

S. wightii Baker

桂林、临桂、永福、凌云、靖西。

绿肥植物。

红血藤 华密花豆

Spatholobus sinensis Chun et T.Chen

十万大山。

韧皮纤维可制人造棉。

密花豆 九层风、三叶鸡血藤、猪血藤

S. suberectus Dunn

玉林、梧州、南宁、百色、柳州地区。

藤行血补血，通经活络；治贫血，月经不调，风湿骨痛，遗精，白浊。

●巴西苜蓿

Stylosanthes gracilis H.B.K.

饲料作物。绿肥。

●山毛豆 短萼野蓝、短萼灰叶豆、白花灰叶豆、灰毛豆、印度豆

Tephrosia candida DC.

钦州、南宁、柳州、桂林等地。

绿肥。咖啡园、橡胶园或新垦地覆盖作物。荒山荒地绿化先锋植物。

灰叶 野蓝、假蓝靛

T. purpurea (L.) Pers.

桂西南。

全株有毒，根最毒，全株含芸香甙，根另含灰叶素和鱼藤素^{15A}，

可以毒鱼。根或全草煎剂治消化不良，咳嗽，衄血，胃炎疼痛。

湿疹，皮炎，全草煎水外洗。枝叶作绿肥。很好的防砂、海岸固堤植物。

黄毛灰叶

T. vestita Vog.

桂南。

●杂种车轴草

Trifolium hybridum L.

(*T. elegans* Savi ex Gib. et Belli)

桂林等地。

牧草、绿肥植物。

●红车轴草

T. pratense L.

桂林、南宁等地。

很好的青饲料，牛、猪、羊等家畜都喜爱吃，亦可作干草和绿肥。

●白车轴草

T. repens L.

桂林等地。

牧草、绿肥和水土保持植物。

野蕃豆

Uraria clarkei Gagn.

(*U. paniculata* Clarke, non Hassk.)

百色、隆林、临桂、恭城。

猫尾草 狐狸尾

U. crinita (L.) Desv.

昭平、桂平、贵县、容县、平南、南宁、那坡、百色、凌云、河池、东兰、临桂。

全草散瘀止血，清热止咳；治吐血，咯血，尿血，刀伤出血，肺热咳嗽，子宫脱垂，脱肛，痢疾。孕妇忌服。绿肥和覆盖作物。

长穗猫尾草 大穗兔尾草

U. crinita (L.) Desv.

var. *macrostachya* Wall.

(*U. macrostachya* Schindl.)

苍梧、宁明、龙州、凌云等地。

功能参阅猫尾草。

狸尾草 兔尾草

U. lagopodioides (L.) Desv. ex DC.

(*U. lagopoides* DC.)

区内各地。

全草消肿，驱虫；又治疮毒。

美花兔尾草 牵根草

U. picta (Jacq.) Desv.

(*U. linearis* Hassk.)

宁明、百色。

根平肝，宁心，健脾；治头晕，心烦，食欲不振。

钩柄狐狸尾

U. rufescens (DC.) Schindl.

(*Desmodium rufescens* DC.)

昭平、巴马、河池、南丹、百色。

算珠豆

Urariopsis cordifolia (Wall.) Schindl.

那坡、百色、田林、隆林。

●蚕豆

Vicia faba L.

区内各地。

冬季豆类作物，种子含蛋白质和淀粉，未老熟的青蚕豆还含丰富的维生素甲、乙₁、乙₂和丙，是优良的蔬菜，老熟蚕豆可磨粉制糕饼，又是豆酱、酱油和糖果的原料。良好绿肥作物，能改良土壤，枝叶可作家畜饲料。有些人对蚕豆有过敏性，能致蚕豆病。

野豌豆 大巢豆、麦豆藤

V. sativa L.

恭城、临桂、桂林、柳州、凤山、乐业、百色、隆林等地。

全草祛痰止咳，和血调经，截疟；治月经不调，咳嗽痰多，疟疾，衄血。绿肥。青饲料或干草，马、牛、羊都喜欢吃。

四籽野豌豆

V. tetrasperma (L.) Moench

乐业。

营养价值较高的青饲料，猪、牛、羊都爱吃。优良绿肥植物。

●饭豆 眉豆

Vigna cylindrica (L.) Skeels

区内各地。

种子供食用。

●豆角 豇豆

V. sinensis (L.) Savi ex Hassk.

(*Dolichos sinensis* L.)

区内各地。

嫩荚、豆供食用。种子、叶、果荚和根健脾利湿，清热解毒，敛汗，止血；治尿血，盗汗，蛇伤；叶治尿闭；根治疗疮。

野豇豆 假人参

V. vexillata (L.) Benth.

梧州、岑溪、北流、玉林、陆川、南宁。

根滋补，补气。

细梗密束花 小血藤

Whitfordiodendron filipes Dunn

龙州、靖西、德保、凌云。

茎祛风，补血；治风湿骨痛。

紫藤

Wisteria sinensis Sweet

(*W. chinensis* DC)

桂林、临桂等地。

花穗煎剂和糖服，治腹水。韧皮纤维可制人造棉。花含芳香油，
可作调香原料。庭园绿化植物。

丁葵草 斜对叶

Zornia diphylla (L.) Pers

钦州、陆川、玉林、北流、博白、贵县、平南。

全草解毒，散瘀消肿；治感冒，肝炎，结膜炎，肠胃炎，小儿疳
积，蛇伤，跌打。

150 通条木科☆(旌节花科)

STACHYURACEAE

水凉子 通泡木、小通藤

Stachyurus chinensis Fr.

桂林、临桂、灵川、全州、兴安、龙胜、隆林、田林、凌云、乐
业、那坡、大苗山、南丹、河池、都安、龙州。

茎部髓心清热，通气，利尿，镇静。

通条木 小通草、通草

S. himalaicus Hk.f. et Th.

恭城、龙胜、全州、兴安、大苗山、南丹、凌云、乐业、隆林、靖西。
用途同上一种。

151 金缕梅科 HAMAMELIDACEAE

半边枫 老虎斑、阿丁枫

Altingia chinensis (Champ) Oliv. ex Hance

临桂、兴安、龙胜、恭城、大苗山、大瑶山、象州、宁明、马山、
大明山、武鸣、上林、靖西、那坡、德保、上思、苍梧、贺县。
材用。树杆培育香菌。根治风湿，跌打，瘫痪。

大果腊瓣花 瑞木、蚂蚁树、饭木

Corylopsis multiflora Hance

(*C. wilsoni* Hemsl.,

C. cordata Merr. ex Li)

各地林区。在桂北林区中常见。

腊瓣花

C. sinensis Hemsl.

灵川、临桂、龙胜、全州、资源、兴安。

光秃腊瓣花

C. sinensis Hemsl.

var *calvescens* R. et W.

龙胜。

窄叶蚊母树

Distylium dunnianum Lévl.

(*D. chinense* Rehd.,

Distylium-Liquidambar

D. lanceolatum Chun ex Cheng)

罗城、大苗山、东兰、隆林。

鳞毛蚊母树

D. elaeagnoides H.T.Chang

罗城。

大叶蚊母树

D. macrophyllum H.T.Chang

罗城。

杨梅蚊母树

D. myricoides Hemsl.

临桂、灵川、兴安、阳朔、恭城、龙胜、永福、南丹、靖西、十万大山。

根治手脚浮肿。果、树皮作栲胶原料。

毛秀柱花

Eustigma balansae Oliv.

(*Distylium chingii* Chun ex Walk.)

凌云、乐业、苍梧、上思、象州。

秀柱花 水棉木

E. oblongifolium Gardn. et Champ.

大苗山、罗城、大瑶山、象州、苍梧、贺县、上思、龙州。

金缕梅

Hamamelis mollis Oliv.

灵川。

庭园绿化。茎、叶可提制栲胶。树皮可制绳。种子可榨油。

缺萼枫香

Liquidambar acalycina H.T.Chang

临桂、灵川、龙胜。

用途参阅枫香。

● 苏合香

L. orientalis Mill.

南宁栽培。

树脂开窍，祛痰。治中风痰厥，惊痫。

枫香 枫树、黑饭木

L. taiwaniana Hance

全区各地。

果(中药称路路通)通经，利尿，消肿止痛；治月经不调，小便不利，乳汁不通，风湿痛，神经痛，腰肌劳损，胃痛，荨麻疹等。枫树脂(白胶香)活血止痛，止血生肌；治外伤出血，内出血，皮肤化脓性感染，跌打，牙痛等。叶抗菌消炎；治菌痢，腹泻，胃痛，咳嗽，外洗治皮肤湿疹。木材供家具等用材。树皮、叶作栲胶原料。叶可饲养天蚕。

榧木 鱼骨柴、羊角树、榧花

Loropetalum chinense (R.Br.) Oliv.

桂北、桂中各地普遍分布，桂南较少。

花、叶、根止血止痛，祛风解毒，去瘀生新；治跌打吐血，痢疾，腹泻，肺结核，中暑。果治目痛，青盲不见物。花治久痢，预防小儿惊风，防麻疹。枝、叶作栲胶原料。

阔叶榧木

L. lanceum H.-M.

十万大山。

大叶榧木

L. subcapitatum Chun ex H.T.Chang

龙州、靖西。

米老排 壳菜果、三角枫

Mytilaria laevis H.Lec.

十万大山、龙州、宁明、那坡、德保、靖西。

Rhodoleia-Symingtonia

木材优良，可作柜、箱、桌椅、房屋板料等用材。速生树种。

红苞木 红花桐 红花木

Rhodoleia championi Benth.

(*R. parvipetala* K.Y.Tong)

十万大山、大瑶山、象州、宜山、罗城、武鸣、上林、大明山、
龙州、平南、凌云、田林、百色。

材用。庭园绿化。叶止血；治刀伤。

半枫荷

Semiliquidambar cathayensis H T. Chang

临桂、龙胜、永福、贺县、大苗山。

材用。根、叶祛风除湿，活血通络；治风湿痹痛，腰肌劳损，跌打瘀积，肿痛，产后风瘫。

小叶半枫荷

S. cathayensis H.T.Chang

var. *parvifolia* (Chun) H T.Chang

大苗山。

用途参阅半枫荷。

东南水丝梨☆

Sycopsis dunnii Hemsl.

大苗山、上思、宁明、武鸣。

水丝梨

S. sinensis Oliv.

临桂、兴安、灌阳、龙胜、全州、资源、贺县、昭平、凌云、融安、大苗山、大瑶山。

长瓣马蹄荷

Symingtonia longipetala (H.T.Chang) H T.Chang

(*Exbucklandia longipetala* H T.Chang,

Bucklandia longipetala H T Chang)

材用。庭园绿化。

马蹄荷 马蹄樟、合掌木、白克木

S. populnea (R.Br. ex Griff) van Steenis

(Exbucklandia populnea (R.Br.) R.W.Br.,

Bucklandia populnea R.Br.)

灵川、灌阳、永福、恭城、荔浦、那坡、靖西、德保、乐业、融安、大苗山、大瑶山、陆川、贺县、上思。

材用。庭园绿化。

大果马蹄荷

S. tonkinensis (Lec.) van Steenis

(Exbucklandia tonkinensis (Lec.) H.T.Chang,

Bucklandia tonkinensis Lec.)

桂林、临桂、象州、大瑶山。

材用。庭园绿化。

四药门花

Tetrathyrium subcordatum Benth.

龙州。

152 杜 仲 科 EUCOMMACEAE

●杜仲 丝棉木、丝棉树

Eucommia ulmoides Oliv.

桂林、龙胜等地。

树皮补肝肾，强筋骨，安胎；治肾虚腰膝痛，孕妇腰酸痛，先兆流产，跌打；早期高血压。树皮、叶、种子含硬性橡胶，为工业重要原料。木材纹理细致，不挠不裂，为造家具、船、车用材。

154 黄 杨 科 BUXACEAE

雀舌黄杨

Buxus harlandii Hance

桂林、临桂、龙胜、融安、那坡、十万大山。

根、叶止血生肌，祛风；治肺癆，咳嗽，痢疾。木材为细工用材。庭园绿化。

宽花柱黄杨

B. latistyla Gagn.

天峨。

大叶黄杨

B. megistophylla Lévl.

全州、资源。

庭园绿化。

小叶黄杨

B. microphylla S. et Z.

var. *aemulans* R. et W.

全州、资源。

庭园绿化。

狭叶黄杨

B. myrica Lévl.

var. *angustifolia* Gagn.

十万大山、河池、凌云、全州。

黄杨 千年矮、万年青、野黄杨、瓜子黄杨

B. sinica (R. et W.) Cheng

(*B. microphylla* S. et Z.

var. *sinica* R. et W.)

凌云、桂北与贵州交界地区、大瑶山、象州、桂林、龙胜。

木材密致，通常供美术雕刻。叶治刀伤。常栽培供庭园绿化。

小叶野扇花

Sarcococca hookeriana Baill.

var. *humilis* R. et W.

南丹。

155 悬铃木科 PLATANACEAE

槭叶悬铃木 英国梧桐

Platanus acerifolia Willd.

桂林。

作庭园树、行道树。

悬铃木 法国梧桐

P. orientalis L.

桂林、南宁。

作庭园树、行道树。

156 杨柳科 SALICACEAE

●响叶杨

Populus adenopoda Maxim.

桂林。

木材供制火柴杆、牙签等用。树皮纤维代麻、造纸。叶作饲料。

●白背杨 银白杨

P. alba L.

桂林、南宁。

材用，绿化。

●加拿大白杨

P. canadensis Moench

桂林。

Populus-Salix

木材供造纸、制火柴杆、牙签、箱子、家具等用。

*钻天杨 箭杆杨

P. nigra L.

var. *italica* (Münchh.) Koehne

(*P. pyramidalis* Salisb.)

桂林。

木材制火柴杆、牙签、箱板。叶含芳香油，可作香精原料。

*毛白杨

P. tomentosa Carr.

桂林。

木材供造纸、建筑、器具、火柴杆等用。树皮作栲胶原料。

*柳 垂柳、垂枝柳、垂杨柳、垂绿柳、清明柳

Salix babylonica L.

各地栽培。

固堤、绿化树种。叶治恶疮丹毒，烫火伤。树皮消肿。枝条编织篮筐。树皮制栲胶，造纸。木材制箱盒、火柴杆等。

筐柳

S. cheilophila Schneid.

龙胜。

网脉柳☆

S. dictyoneura Seem.

桂林、临桂、龙胜、全州、资源、恭城、大瑶山、德保、隆林。

用途参阅柳。

粤柳

S. mesnyi Hance

桂林。

草地柳

S. praticola H.-M.

桂西北。

159 杨 梅 科 MYRICACEAE

青杨梅 火梅

Myrica adenophora Hance

桂林、临桂、南宁、武鸣、横县、大瑶山、合浦、灵山。

果祛痰，解酒，止吐。绿化。

毛杨梅

M. esculenta Buch.-Ham. ex D. Don

上思、凤山、乐业、隆林。

木材坚硬，制家具、农具。根皮、树皮、叶制栲胶。果可食。

杨梅 朱红、树梅

M. rubra (Lour.) S. et Z.

区内各地。

果生食，酿酒，制酱，蜜饯，制糖果、果汁。药用生津，止渴。

树皮收敛。根皮止痛，消肿，凉血，散瘀生新；治吐血，血崩，骨折。树皮、根皮、叶制褐色染料。木材坚韧，作细工用材。又是绿化、防护林树种。

161 桦 木 科 BETULACEAE

蒙自桤木 粗糠木、萝卜木

Alnus nepalensis D. Don

那坡、靖西、德保、百色、田林、隆林、凌云、乐业、东兰、南丹、河池、宜山。

材质较疏松，供一般家具、板材用。树皮为栲胶原料。叶为压青

Alnus-Betula

绿肥，又是保土、改土植物。

江南桤木 水拖柴、萝卜木

A. trabeculosa H.-M.

隆林、田林、资源。

用途参阅蒙自桤木。

西桦

Betula alnoides Buch.-Ham.

那坡、德保、靖西、百色、平果、凌云、乐业、田林、田阳、东兰、大苗山、龙胜、资源、临桂、灵川、兴安。

木材为胶合板和家具等用材。树皮制栲胶。

南桦

B. austro-sinensis Chun ex Hu

桂林、临桂、灵川、龙胜、资源、全州、灌阳、兴安、大苗山、大瑶山、凌云。

用途同上。

柱穗桦

B. cylindrostachys Wall.

龙胜。

用途同上。

光叶桦 光叶桦、映桦子、桦角、红桦树

B. luminifera H.Winkl.

龙胜、大苗山、大瑶山、隆林、田林、凌云、乐业。

木材不翘裂，经防腐处理后，可代胡桃木作枪托等军工用材，建筑，胶合板，火柴杆及造纸用。树皮为栲胶原料，干馏可得桦皮焦油。根清热利尿；治小便不利，水肿。

糙皮桦

B. utilis D.Don

凌云、乐业、百色、武鸣、罗城、大苗山、临桂。

木材用途参阅上一种。树皮药用抗菌驱虫。

162 榛 木 科 CORYLACEAE

川黔鹅耳枥 川黔千金榆

Carpinus fangiana Hu

资源、全州、龙胜、兴安。

木材用途同大穗鹅耳枥。

大穗鹅耳枥 牯岭鹅耳枥、马料树

C. fargesii Fr.

(*C. laxiflora* (S. et Z.) Bl

var. *macrostachya* Oliv.,

C. laxiflora (S. et Z.) Bl. var. *fargesii* (Fr.) Burk.,

C. laxiflora (S. et Z.) Bl. var. *davidii* Fr.,

C. davidii (Fr) Schneid.,

C. macrostachya (Oliv.) Koidzumi)

临桂、灵川、永福、阳朔、龙胜、大苗山。

木材供建筑、家具、枕木、车辆等用。亦是培养香菌良材。树皮为栲胶原料。

岷江鹅耳枥

C. londoniana Winkl.

(*C. poilanei* A Camus)

大瑶山、大苗山、罗城、临桂。

材用一般。

紫脉鹅耳枥

C. purpurinervis Hu

都安。

材用。

细枝鹅耳枥 雷公枥

C. viminea Wall.

大苗山。

材用。

163 壳斗科(注) FAGACEAE

锥栗 珍珠栗、桂林锥

Castanea henryi (Skan) R. et W.

桂北、桂西。

优良用材树种，供建筑、枕木、车船、桩木等用。种子可供食用。树皮、壳斗可制栲胶。叶可养柞蚕。

*板栗 栗

C. mollissima Bl.

区内各地，以隆安、阳朔等县为多。

种子供食用，为木本粮食树种之一；又可续筋接骨，散瘀；嚼烂外敷治筋骨断碎，肿痛瘀血。为重要用材树种，供枕木、矿柱、船舵等用。树皮、壳斗可制栲胶。叶可养柞蚕。

茅栗

C. sequinii Dode

(*C. hupehensis* Dode)

全州、资源、兴安、临桂。

种子可食。木材供制家具等用。树皮、壳斗可制栲胶。幼树可作板栗砧木。

注：本科树木种子含淀粉，有些可供食用，有些可供工业用。树皮、壳斗富含单宁，多可制栲胶。多数种类产优良木材。一些种类可培养香菇。水青风属的种子含油脂。

南宁栲

Castanopsis amabilis Cheng et C S Chao

十万大山。

短刺南宁栲

C. amabilis Cheng et C S Chao

var. *brevispinosa* Cheng et C S Chao

十万大山。

树干可培养香菇。

角刺栲 刺果锥栗

C. armata (Roxb.) Spach

苍梧、容县、龙胜。

杯果栲

C. calathiformis (Skan) R. et W.

(*Quercus calathiformis* Skan,

Pasania calathiformis Hickel et A Camus)

容县、武鸣、十万大山、兴安。

细枝栲

C. carlesii (Hemsl) Hay.

(*Quercus carlesii* Hemsl)

龙胜、融安、大明山、十万大山、合浦、陆川。

西南栲 西南米槠

C. carlesii (Hemsl) Hay.

var. *spinulosa* Cheng et C.S.Chao

十万大山。

种子味甜可食。木材供建筑、家具等用。树干可培养香菇。

瓦山栲 长刺锥栗

C. ceratacantha R. et W.

那坡、凌云、乐业、十万大山、容县、苍梧、龙胜。

锥栗栲 栲栗

C. chinensis Hance

桂北和梧州、藤县、博白。

种子味甜可食。木材坚硬耐用，供建筑、造船、桥梁等用。

华南栲 毛叶锥栗

C. concinna A DC.

十万大山、凌云、乐业、宜山。

尖尾栲 米槠、甜槠、赤柯

C. cuspidata (Thb.) Schottky

(*Quercus cuspidata* Thb.,

Pasania cuspidata Oerst.)

十 那坡。

材质坚硬，为良好用材，供桥梁、糖榨、轮轴等用。

高山栲

C. delavayi Fr.

隆林。

短刺栲 短刺锥栗

C. echinocarpa A DC.

(*C. tribuloides* A. DC.

var. *echinocarpa* King)

隆林。

水锥栲

C. eyrei Tutch.

(*Quercus eyrei* Benth.,

Lithocarpus eyrei Rehd.,

C. chingii A Camus)

隆林、大苗山、大瑶山、阳朔、灵川、临桂、龙胜、兴安、贺县、苍梧、大明山、十万大山。

种子味甜可食。木材坚韧耐久，供桥梁、枕木、建筑等用。

尾叶水锥栲☆

C. eyrei Tutch.

var. *caudata* (Fr.) Cheng

(*C. caudata* Fr.,

C. incanna A Camus)

龙胜、永福。

罗浮栲 白椴

C. fabri Hance

容县、苍梧、永福、临桂、龙胜、兴安、大瑶山、大苗山、那坡、田阳。

川鄂栲 丝栗

C. fargesii Fr.

十万大山、凌云、乐业。

大叶栲 大叶栲、黧蒴、裂斗锥栗、闽粤栲栗

C. fissa R. et W.

(*Quercus fissa* Champ.,

Pasania fissa Oerst.)

区内各地。

叶可作饲料，牛爱吃。树干可培养香菇。优良的薪炭材。

南岭栲 毛栲

C. fordii Hance

容县、大瑶山、宜山。

丛刺栲

C. greenii Chun

大苗山。

海南栲 海南锥栗

C. hainanensis Merr.

龙州。

材质坚硬，为重要工业强材之一，供建筑、桥梁、枕木、机械器具、家具等用。种子淀粉较好，可供食用。

红椴栲 椴木、红锥、红椴

C. hickelii A.Camus

区内各地。

为华南优良用材和主要造林树种之一，材质重而坚韧，干后少开裂，供造船、建筑、枕木、矿柱等用。

红椴栲 红椴子、印度锥栗

C. indica (Roxb.) A.DC.

龙州、十万大山、那坡。

材质硬而稍重，干后少开裂，但会变形，不耐腐，适作室内门、窗、桁、桷等用材。种子无苦味，可生食或熟食。

东南栲 美秀锥栗

C. jucunda Hance

种子味甜，可食。

铁锥栲 火锥

C. lamontii Hance

容县、龙胜、苍梧。

元江栲

C. neocavaleriei A. Camus

(*C. concolor* R. et W.)

龙胜。

长叶栲 南宁红锥

C. oblongifolia Cheng et C S Chao

十万大山。

丝栗

C. platyacantha R. et W

桂西北。

疏齿栲☆

C. remotaserrata Hu

苦槠

C. sclerophylla Schott.

(*Quercus sclerophylla* Lindl.)

永福、桂林、临桂等地。

耐干旱瘠薄，萌芽性强，树皮坚韧，富弹性，耐久，供建筑、桥梁、枕木、车辆、机械图板等用。

穗序栲

C. spicigera Chun et Tam

十万大山。

栲树

C. taiwaniana Hay.

(*C. hystrix* auct., non A DC.)

区内各地。

种子味甜可食。材质坚致，供桥梁等用。树干可培养香菇。

Castanopsis-Lithocarpus

硬叶栲 大叶锥栗、野板栗、钩栗

***C. tibetana* Hance**

桂北、桂东等地。

树干可培养香菇。

弹斗栲

***C. traninhensis* Hick. et A. Camus**

藤县。

水青冈 长柄山毛榉

***Fagus longipetiolata* Seem.**

(*F. sinensis* Oliv.)

桂北、桂西。大瑶山等地。

种子和种子油可食，油又可作油漆原料。

云南水青冈

***F. longipetiolata* Seem.**

forma *yunnanica* Y.T.Chang

德保、凌云、环江、大苗山。

光叶水青冈

***F. lucida* R. et W.**

资源、灌阳、兴安、大苗山、田林。

种子油可供食用。

陡崖杏叶柯

***Lithocarpus amygdalifolius* (Skan) Hay.**

var. *praecipitiorum* Chun

桂西南。

材质硬而很重，干燥后显著开裂，很耐腐，为工业强材：适作梁、柱、桩木、枕木、水工、桥梁、造船、建筑用材，亦可作机械器具、农具等用。

腰果柯

L. anisobalanos Chun et How

十万大山。

槟榔柯 米哥、水栗

L. areca (Hick. et A. Camus) A. Camus

(*Pasania areca* Hick. et A. Camus)

龙州。

狭叶柯

L. attenuata (Skan) Rehd.

(*Pasania attenuata* Schott.,

Quercus attenuata Skan)

十万大山。

岭南柯 岭南石栎

L. brevipendula (Skan) Hay.

(*Pasania brevipendula* Skan,

Quercus brevipendula Skan)

靖西。

粤桂柯

L. calophylla Chun, ined.

龙胜、灵川、阳朔、容县。

扶绥柯☆

L. chichaoi Chun, ined.

扶绥。

材质坚硬耐久，少虫蛀，供建筑，作主梁用。种子可食。

靖西柯

L. chingsiensis Chun, ined.

靖西。

Lithocarpus

金毛柯

L. chrysocoma Chun et Tsiang

大苗山。

包果柯

L. cleistocarpa (Seem.) R. et W.

(*Quercus cleistocarpa* Seem.,

Pasanis cleistocarpa Schott.)

凌云、资源。

嫩叶代茶，称甜茶。

烟斗柯 石柯、杯果、滇粤石栎

L. cornea (Lour.) Rehd.

(*Quercus cornea* Lour.,

Pasania cornea Oerst.,

Q. hainanensis Merr.)

区内各地。

良好建筑用材，供建筑、枕木、车辆、造船等用。种子可食。

扁果柯

L. cyrtocarpa (Drake del Castillo) A Camus

(*Quercus cyrtocarpa* Drake del Castillo,

Pasania cyrtocarpa Schott)

十万大山、陆川。

皱叶柯 广西石柯

L. dictyoneura Chun

大瑶山、东兰。

大鳞柯 贵州石栎

- L. elizabethae* (Tutch.) Rehd.
(*Quercus elizabethae* Tutch.,
Pasania elizabethae Schott.)

十万大山、龙州。

华南柯

- L. fenestrata* Roxb.,
(*Quercus fenestrata* Roxb.,
Pasania fenestrata Oerst.)

大瑶山、灵川、宁明、那坡、隆林。

黔粤柯

- L. fordiana* (Hemsl.) Chun
(*Quercus fordiana* Hemsl.,
Pasania fordiana Hick. et A Camus)

泡叶柯

- L. haipinii* Chun
(*Quercus tsangii* Merr.,
L. neotsangii A. Camus)

大瑶山。

光叶柯

- L. hancei* (Benth.) Rehd.
(*Quercus hancei* Benth.,
Pasania hancei Schott.)

十万大山、容县、贺县、大瑶山、大苗山、大明山、南丹、隆林。
树干可培养香菇。

Lithocarpus

瘤果柯

L. handelianus A.Camus

桂西南。

木材适作水工、船板、舵骨、桥梁、桥柱、桥板等用材，亦可供桩木、枕木、建筑、车辆、矿柱、机械器具、农具、运动器械用材。

长果柯 锦楮

L. henryi (Seem.) R. et W.

(*Quercus henryi* Seem,

Pasania henryi Schott.)

东兰、南丹、龙胜。

珠眼柯 信宜石柯、鼠刺叶石柯

L. iteaphylloides Chun

永福、大苗山、那坡。

姜叶柯

L. litseifolia (Hance) Chun

贺县、临桂。

长柄柯

L. longipedicellata (Hick. et A.Camus) A.Camus

(*Quercus longipedicellata* Hick. et A.Camus)

桂西南。

油叶柯☆

L. oleaefolia A.Camus

融安。

多穗槲 甜茶

L. polystachya (Wall.) Rehd.

(*Quercus polystachya* Wall.,

Pasania polystachya Schott.)

靖西、那坡、百色、田林、乐业、十万大山、大苗山。

嫩叶代茶，称甜茶。

毛果柯

L. pseudovestitus A. Camus

十万大山、桂西南。

犁耙柯

L. silvicularum (Hance) Chun

(*Quercus silvicularum* Hance,

Q. nariakii Hay.)

桂西南。

球果柯

L. sphaerocarpa A. Camus

(*Pasania sphaerocarpa* Hick. et A. Camus)

桂西南。

硬叶柯 绿叶石柯、硬叶栎

L. synbalanos (Hance) Chun

(*Quercus synbalanos* Hance,

Pasania synbalanos Schott.)

十万大山。

稠木 石柯、石栎

L. thalassica (Hance) Rehd.

(*Quercus thalassica* Hance,

Q. sieboldiana Bl.,

Pasania thalassica Oerst.,

P. sieboldiana Nakai,

L. glabra Nakai)

Lithocarpus-Quercus

北流、容县、藤县、苍梧、岑溪、贺县、永福、恭城、柳州、龙州等地。
木材坚硬，供枕木、建筑、车船、磨齿等用。优良薪炭材。种子
和根含淀粉，可供饲猪或酿酒用。

桂南柯

L. tsangii A.Camus

十万大山、六万大山。

铜叶柯 广西石柯

L. uncinata A.Camus

十万大山。

大果柯 玉盘叶柯

L. uvariifolia (Hance) Rehd.

(*Quercus uvariifolia* Hance,

Pasania uvariifolia Schott.)

贺县。

麻栎 栎、米域

Quercus acutissima Carr.

(*Q. serrata* S. et Z.)

区内各地，尤以天峨、凌云、乐业、田林、隆林一带为多。

材质坚硬，供车辆、船舶、滚轴、机械、建筑、枕木、纺织工业的
梭子、纱锭等用。种子除含淀粉外，还含脂肪油，可供制肥皂
用。壳斗、果实消肿，涩肠止泻；治乳腺炎，哮喘，下痢和血
痢。叶可饲养柞蚕。树干可培养香菇、木耳。材质好，生长较
快，是产区内优良用材林、薪炭林、柞蚕林树种。

槲栎

Q. aliena Bl.

临桂、隆林、那坡。

种子含脂肪油。

竹叶栲 竹叶栲、竹叶青冈栲

Q. bambusifolia Hance

(*Cyclobalanopsis bambusifolia* Chun)

宁明、十万大山。

槟榔栲 美栲

Q. bella Chun et Tsiang

博白、大瑶山。

薄叶栲

Q. blakei Skan

(*Q. blakei* Skan

var. *parvifolia* Merr.)

靖西、蒙山、大瑶山、永福。

岭南栲 黄线栲、岭南青冈栲

Q. championi Benth.

(*Cyclobalanopsis championi* Oerst.)

宁明。

延平栲 ☆

Q. chungii Metc.

十万大山。

桂南栲 ☆

Q. confinis Chun et L. Lau, ined.

上思。

圆柱栲 ☆

Q. cylindrica Chun, ined.

十万大山。

Quercus

粤桂栲

Q. delicatula Chun et Tsiang

十万大山。

碟斗栲

Q. disformis Chun et Tsiang

十万大山、大瑶山。

上思栲

Q. dispar Chun et Tsiang

十万大山。

华南栲

Q. edithae Skan

十万大山、大明山。

啮缘栲☆

Q. erosa Chun et Ko, ined.

十万大山。

白栲

Q. fabri Hance

全州、恭城、兴安、临桂、桂林、凌云、乐业、百色、隆林、田阳等地。

树干可培养香菇。叶可饲柞蚕。

饭甌栲

Q. fleuryi Hick. et A. Camus

苍梧、蒙山、阳朔、龙胜、大瑶山、大苗山、柳州、那坡、龙州、十万大山等地。

青冈栲 米中

Q. glauca Thb.

(*Cyclobalanopsis glauca* (Thb.) Oerst.)

桂北各地。

材质坚韧，供车辆、船舰、农具、工艺器具等用。石灰岩石山优良绿化树种。

小叶青冈栎

Q. glauca Thb.

forma gracilis R. et W.

(*Cyclobalanopsis gracilis* (R. et W.)

Cheng et T.Hong)

兴安、十万大山。

绒毛栲

Q. gomeziana A Camus

(*Q. vestita* R. et W.,

Q. velutina Wall.)

隆林。

陀螺栲

Q. helferiana A.DC.

(*Cyclobalanopsis helferiana* Liebm.-Oerst.)

那坡、隆林、凌云、乐业、南丹。

灵川栲☆

Q. hsienfui Chun et S.Lee, ined.

灵川。

扁斗栲☆ 雷公栲

Q. hui Chun

(*Q. litseoides* sensu Merr., non Dunn)

苍梧、十万大山、柳州、大苗山。

Quercus

云山栲 大叶青冈栲、长穗青冈栲

Q. jenseniana H -M.

(*Lithocarpus jenseniana* Chun et Metc.,

L. dunnii Lévl.,

Cyclobalanopsis Cheng et T.Hong)

大明山、大瑶山、广西与贵州交界处。

平脉栲

Q. kerrii Craib

田阳。

广西栲

Q. kwangsiensis A.Camus

三江。

木姜子栲

Q. litseoides Dunn

大明山。

泡花树叶栲

Q. meliosmifolia Chun

南屏栲 ☆

Q. mikengensis Chun et S.Lee, ined.

十万大山。

青栲 ☆ 青栲、细叶青栲

Q. myrsinaefolia Bl.

(*Cyclobalanopsis myrsinaefolia* (Bl.) Oerst.)

苍梧、平乐、永福、临桂、全州。

果收敛：治痢疾。

多环栲

Q. nemorales Chun

十万大山、大瑶山。

亮叶栲 平脉槲栎

Q. nubium H.-M.

(*Cyclobalanopsis sessilifolia* Schott.,

C. paucidentata Kudo,

Q. changii Metc.)

凌云、隆林、大苗山、大瑶山、龙胜。

乌冈栲

Q. phillyraeoides A.Gray

(*Q. ilex* L.

var. *phylliraeoides* Skan,

Q. fokienensis Nakai)

大瑶山、阳朔、临桂、桂林、兴安。

宽萼栲☆

Q. platycalyx Hick. et A.Camus

陆川。

两广栲☆

Q. poilanei Hick. et A.Camus

贺县、十万大山。

云南栲

Q. schottkyana R. et W.

(*Cyclobalanopsis glaucoides* Schott.,

Q. glaucoides Koidz.)

隆林、百色。

●栓皮櫟

Q. suber L.

南宁。

欧洲生产栓皮的主要树种。

大明山櫟

Q. tamingshanensis Chun et S. Lee, ined.

大明山。

柱果櫟☆

Q. tereticarpa Chun et S. Lee, ined.

十万大山。

扁果櫟

Q. thorelii Hick. et A. Camus

靖西。

栓皮栎

Q. variabilis Bl.

桂西北、桂东北。

栓皮也叫软木，是软木砖、隔音、绝缘、绝热、瓶塞、水上浮标、航海救生用具、座垫、机器填板等原料，在交通、食品、电气、化学、机械等工业上用途广泛。木材供建筑、枕木、车船、家具、薪炭等用。叶可饲柞蚕。果壳(壳斗)止泻涩肠；治水泻，咳嗽，头癣。

164 木麻黄科 CASUARINACEAE

●木麻黄 驳骨松

Casuarina equisetifolia L.

钦州地区、陆川、玉林、南宁、武鸣、龙州、桂林等地有栽培。

木材坚硬耐朽，可作枕木、电杆、房椽、桩木，船舰、乐器等用

材。叶除疝气。树皮收敛表汗，利尿。本树种生长快，固沙耐旱，常作热带行道树和海岸防风林、护岸林树种。

165 榆 科 ULMACEAE

糙叶树

Aphananthe aspera (Thb.) Planch.

隆林、田林、凌云、乐业、那坡、临桂、龙胜、永福、龙州、大新、象州、大苗山、平南。

木材坚韧，不易裂，供器材用。叶充马饲料；作农药杀棉蚜虫；干叶供铜、锡器等磨擦用。茎皮纤维作造纸原料。

华南朴

Celtis austro-sinensis Chun

龙州、大新、凌云、乐业。

木材作家具、器具用材；叶作牛马饲料。

紫弹树

C. biondii Pamp.

桂林、临桂、全州、柳州、南丹、天峨、东兰、隆林、乐业、凌云、大新。

木材作家具、器具、车辆用材。茎皮纤维作人造棉原料。种子油供工业用。叶作马饲料。作庭园绿化树种。

黑弹树 小叶朴、棒棒木

C. bungeana Bl.

桂林、临桂、兴安、南丹、柳城、大苗山、百色。

树干煎水治慢性支气管炎。其余用途同紫弹树。

天目朴树

C. chekiangensis Cheng

龙胜。

广西朴树

C. kwangsiensis Chun

凌云、乐业。

大果朴树

C. macrocarpa Chun

靖西、容县、灵川。

大叶朴树

C. philippinensis Bl.

天峨、东兰、凌云、隆林、田林、田阳、那坡、大新、龙州、横县。

茎皮纤维造人造棉。木材作家具、器具用材。种子油供工业用。

叶作马饲料。

朴树 沙朴

C. sinensis Pers.

桂林、临桂、龙胜、宜山、凌云、田阳、龙州、武鸣、梧州、柳城。

木材作家具、枕木、建筑用材。茎皮纤维代麻和造纸。果可食。

种子油制皂和润滑油用。叶作马饲料。叶揉擦治荨麻疹。树皮煎剂治麻疹，消化不良。

四川朴

C. vandervoetiana Schneid.

临桂、靖西、容县。

用途参阅紫弹树。

白颜树 大叶白颜树

Gironniera subaequalis Pl.

(*G. chinensis* Benth)

十万大山、上林、北流、那坡、巴马。

木材制作一般家具；易传音，宜作木鼓等乐器。茎皮纤维造人造

棉，供棉絮用。叶治寒湿。

青檀 翼朴

Pteroceltis tatarinowii Maxim

桂林、临桂、柳州、南宁、上思、东兰。

木材坚硬，纹理密致，可作家具、农具、车轴、建筑用材。茎皮纤维适于造宣纸。

毛青檀

P. tatarinowii Maxim.

var. *pubescens* H.-M.

灵川（七分山）、黔桂交界之山区。

狭叶山黄麻

Trema angustifolia Bl.

(*T. sampsoni* (Hance) Merr.,

T. lanceolata Merr.)

十万大山、岑溪、平南、东兰、凤山、隆林、大苗山。

茎皮纤维造纸及纺织。根、叶清凉，止血，止痛。

光叶山黄麻

T. cannabina Lour.

(*T. virgata* Bl.)

临桂、龙胜、梧州、贺县、贵县、南宁、宁明、十万大山、大苗山。

茎皮纤维造纸及人造棉。种子油供制皂，作润滑油用。

山油麻

T. dielsiana H.-M.

用途参阅山黄麻。

山黄麻

T. orientalis (L.) Bl

Ulmus-Zelkova

龙州、武鸣、南宁、横县、宾阳、上思、容县、博白、平南、玉林、梧州、苍梧、贺县、大瑶山、东兰、河池、凌云、乐业、田林、百色、那坡、隆林、桂林。

茎皮纤维造纸，纺织。木材供建筑、乐器用材。种子油供制皂，作润滑油。树皮作栲胶原料。叶作马饲料。根、叶清凉，止痛，止血。

蜀榆

Ulmus bergmanniana Schneid.

var. *lasiophylla* Schneid.

南丹、大瑶山。

树皮、叶治烂疮，火伤。叶作家畜饲料。

榔榆

U. parvifolia Jacq.

桂林、临桂、阳朔、柳州、乐业。

木材坚硬，可作油榨、船橹、车辆。茎皮纤维造蜡纸、人造棉、麻袋。茎内皮收敛止血；治各种外出血，胃肠出血，尿血。根浸酒治跌打，去瘴气。

越南榆

U. tonkinensis Gagn.

那坡、靖西、龙州、柳城、桂林有栽培。

木材作车、船用材。茎皮纤维制棉絮，纺织土布。叶作马饲料。

小叶榆

Zelkova sinica Schneid.

隆林、灵川、东兰。

木材为建筑、造船良材，可作枕木、家具、玩具。

167 桑 科 MORACEAE

见血封喉 加毒、大毒木、箭毒木

Antiaris toxicaria (Pers.) Lesch.

博白、北流、龙州。

茎皮纤维可搓绳索，制麻袋等。乳汁有剧毒，涂于箭头上可猎兽；又能强心，催吐。

●木菠萝 菠萝蜜

Artocarpus heterophyllus Lam.

(*A. integrifolius* auct., non L.f.)

龙州、南宁、隆安、梧州及玉林地区。

果芳香可食。种子含淀粉，煮熟可食。木材宜作家具、车轮、船杆等用材。树液可治溃疡及粘接陶器。叶磨粉加热，可敷创伤。

木屑可提制黄色染料。

白桂木 夏暑果、将军树

A. hypargyreus Hance

容县、苍梧、贺县、龙州、荔浦、灵川、乐业、那坡。

果可食，有生津、止渴、助消化之效。木材供建筑、家具用。树皮可提取硬橡胶。

桂木

A. nitidus Trec

subsp. *lingnanensis* (Merr.) Jarrett

(*A. lingnanensis* Merr.)

容县、梧州。

果可食，助消化，止渴；可糖渍及制果酱。木材供建筑、家具用。

红山梅 二色菠萝蜜

A. styracifolius Pierre

(*A. bicolor* Merr. et Chun)

玉林、平南、梧州、苍梧、凌云、乐业、大瑶山。

果可食。木材制家具，建筑用。

越南桂木 小冬桃

A. tonkinensis A.Chev. ex Gagn.

平南、南丹、龙州、大苗山。

果可食。木材坚硬，不受虫害，是一种良好的硬木，可供船、车用材。

藤构

Broussonetia kazinoki Sieb.

(*B. kaempferi* Sieb.)

桂林、临桂、龙胜、兴安、苍梧、平南、凌云、乐业、大瑶山、大苗山。

茎皮纤维造人造棉，制绝缘纸和棉纸。叶作猪饲料。

沙皮树 楮、构树、谷木、肥猪树、沙纸树

B. papyrifera (L.) Vent.

区内各地。

茎皮纤维为良好的造纸（沙纸、复写纸、蜡纸、宣纸）及人造棉原料。果（楮实子）、根皮助阳气，壮筋骨，利水明目；治阳萎，腰骨痠软，水肿腹胀，目翳等。树液能治癣、蜂蝎螫伤。种子油制皂、油漆、润滑油。叶为良好猪饲料；又可作农药，杀蚜虫、瓢虫、豆蚜；叶汁对霜霉病有抑制作用。叶、树皮、木材均含鞣质，可制栲胶。木材造家具。

*号角树

Cecropia peltata L.

原产热带美洲。南宁有栽培。

印第安人用嫩叶煎剂治肝病和浮肿。在南美洲用树汁治赤痢；亦用作肥皂代用品。海绵质的木材可作火绒和造纸原料。树干可作水槽。嫩芽有时亦用作蔬菜。

葛芝 穿破石、黄龙退壳

Cudrania cochinchinensis (Lour.) Kudo et Masam.

(*C. javanensis* Trecul.)

区内各地。

根清热活血，止咳祛痰；治咳血，肺结核，黄疸，跌打内伤，腰腿痛，经闭等。茎皮纤维造纸。果生食或酿酒。木材制手杖、烟管等物；心材煎汁制黄色染料。

柘藤

C. fruticosa Roxb.

苍梧、柳州、桂林。

根驱风散寒，止咳；治风湿痹痛，咳嗽。

柘树 黄桑、猪婆刺、老虎肝 W

C. tricuspidata (Carr) Bureau

区内各地。

根祛风，活血破瘀；治跌打，瘀血，痔瘡，经闭，痘毒，黄疸，痔疮，风湿痛。叶饲蚕。木材提制黄色染料。

马见喜

Dimerocarpus balansae (Hutch.) C.Y.Wu. et H.W.Li

那坡、龙州。

叶作牛马饲料。

水榕

Ficus abelii Miq.

桂林、兴安、平乐、大瑶山、柳州、融安、平南、桂平、苍梧、昭平、钟山、平果、百色、隆林、扶绥、邕宁、凤山。

叶消肿止痛，去腐生新；治乳痛，刀伤。

高山榕 鸡榕

F. altissima Bl.

Ficus

龙州、凭祥、宁明、南宁、邕宁、大新、上思、天峨、隆林、百色、那坡、北流。

茎皮纤维代麻用。气生根清热解毒，活血止痛。树为紫胶虫寄主。嫩芽可食，味酸。

大耳榕 圆叶榕

F. auriculata Lour.

百色、隆林、德保、田林、平果、龙州、扶绥、大新、横县、都安、龙胜。为紫胶虫寄主树。果可食。茎皮纤维代麻。

鹿饭

F. beecheyana Hk. et Arn.

苍梧、容县、上思、龙州、大新、凌云、乐业、临桂、龙胜、全州、恭城、平乐、天峨、河池、都安。

茎皮纤维代麻用。全株解毒，消肿，通乳。

垂叶榕

F. benjamina L.

平南。

茎皮纤维代麻制绳，造人造棉。

●无花果

F. carica L.

桂林、柳州、南宁、龙州等地有栽培。

果生食或糖渍食；开胃，清热，润肠，止咳；治便秘，肺热声嘶，咳嗽。根治泄泻，痔疮，痢症。叶煎汤洗痔疮。

黄果榕

F. championi Benth.

苍梧、梧州、平南、横县、东兰、大瑶山。

茎皮纤维代麻，制人造棉。

纸叶榕

F. chartacea Wall.

柳州。

棒果榕

F. clavata Wall.

武鸣、龙州、大新、那坡、凌云。

耳叶榕

F. cunia Buch.-Ham.

龙州、凭祥、扶绥、宁明、邕宁、南宁、上思、田阳、田林、德保、那坡、龙胜、天峨。

茎皮纤维代麻或造纸。

●橡胶榕 印度橡胶树

F. elastica Roxb.

梧州、南宁、龙州、博白等地。

树干的乳汁可提制橡胶，其用途与巴西橡胶同。又为绿化树种。

黄毛榕

F. fulva Reinw.

上思、龙州、横县、扶绥、百色、隆林、靖西、那坡、凌云、平果、平南、博白、桂平、陆川、北流、岑溪、苍梧、大瑶山、融安、宜山、天峨、都安。

茎皮纤维代麻。根皮消肿行血；治风湿痛。叶为马饲料。

斜叶榕

F. gibbosa Bl.

(**F. tinctoria Forst.f. subsp. gibbosa (Bl.) Corner**)

区内各地。

紫胶虫寄主树。茎皮造纸，造人造棉。根皮治腹痛和作缓泻剂。

叶为马饲料。

Ficus

光榕

F. glaberrima Bl.

隆林、田林、乐业、德保、那坡、龙州、扶绥、大新、天峨、巴马、河池。

茎皮纤维代麻制绳，织麻布和麻袋。

海南榕

F. hainanensis Merr. et Chun

宁明、龙州、东兰、那坡。

茎皮纤维代麻制绳，织麻布和麻袋，造纸。

水筒木

F. harlandii Benth.

上思、上林、大明山、扶绥、龙州、隆林、田林、靖西、大瑶山、苍梧、巴马、都安。

茎皮纤维代麻制绳，织麻布和麻袋。根皮、叶作兽药，补气，润肺，活血，渗湿利水；治五癆七伤，跌打，牛叉脾，小便不利，湿热腹泻。

山榕 青藤公

F. harmandii Gagn.

宁明、龙州、扶绥、巴马、都安、大瑶山、大苗山、桂林、阳朔、永福、恭城、靖西。

茎皮纤维代麻制绳，织麻袋和麻布，制人造棉。

藤榕 细叶石榕

F. hederacea Roxb.

(**F. scandens Roxb., non Lam.**)

那坡、百色。

山枇杷榕☆ 山枇杷

F. henryi Ward. ex Diels

凌云、乐业、那坡、南丹。

异型榕 异叶榕

***F. heteromorpha* Hemsl.**

龙胜、全州、灵川、恭城、大苗山、大瑶山、罗城、南丹、那坡、德保、田林、隆林、凌云、乐业、贺县、上思。

茎皮纤维造纸，亦为人造棉原料。

尾叶榕

***F. heteropleura* Bl.**

(*F. rostrata* seneu Merr. et Chun, non Lam)

桂西南。

对叶榕

***F. hispida* L.f.**

区内各地。

紫胶虫寄主树。茎皮纤维制绳，织麻袋，亦为人造棉原料。全株止痛；治眼结膜炎，赤眼，痧痧，风热。

红色对叶榕

***F. hispida* L.f.**

var. *rubra* Corner

桂南。

黄葛榕 大叶榕

***F. lacor* Buch.-Ham.**

区内各地。

木材制农具。茎皮纤维代麻制绳，织麻袋和麻布，作棉絮。根、叶驱风活血，接骨；治风湿痹痛，骨折，半身不遂等。放养紫胶虫。作行道树、绿化树种。

长柄藤榕

***F. lungchowensis* Chun**

Ficus

龙州。

爬藤榕

F. martiní Lév. et Van.

(**F. kwangtungensis** Merr.)

区内各地。

茎皮纤维代麻制绳，织麻袋和麻布，作棉絮。

榕树 小叶榕、细叶榕

F. microcarpa L.

(**F. retusa** auct, **F. nitida** auct,

F. retusa var. **nitida** auct., non verae)

桂南、桂西都有分布，桂北少见。

气根、叶活血散瘀，清热解毒，抗菌消炎；治跌打，流感，扁桃体炎，支气管炎，眼结膜炎，痢疾，疟疾，百日咳，麻疹不透等。煎水洗治痔疮。为良好行道、绿化、防护树种。

显脉榕 九丁树、凸叶榕

F. nervosa Heyne

宜山、上林、大明山、靖西、大新。

茎皮纤维代麻制绳，织麻袋、麻布。

桑叶榕

F. obscura Bl.

隆林、田林、靖西、龙州、都安、平乐、阳朔、永福。

茎皮纤维制麻袋和人造棉。叶作家畜饲料。

琴叶榕

F. pandurata Hance

大瑶山、武鸣、南宁、邕宁、大新、陆川、玉林、贵县、梧州、苍梧、昭平、桂林、临桂、龙胜。

茎皮纤维代麻制绳，织麻袋、麻布，作棉絮。根、叶祛风利湿。

清热解毒；治百日咳，背痛，乳汁不足，齿龈炎，蛇伤，黄疸，乳痈，腰痛，胃痛，疟疾等。

小叶榕

F. parvifolia (Miq) Miq.

临桂、灵川、恭城、百色、德保、钦州、贺县、昭平、大新、龙州。

凉粉果 薜荔、王不留行

F. pumila L.

区内各地。

茎皮纤维代麻制绳，织麻袋、麻布，制人造棉，造纸。乳汁壮阳固精，消肿消炎；治阳萎，遗精，乳汁不通，痔疮，疮疖，癣疥。果实催乳，止渴，退热。花托治癣疥。茎、叶驱风活络；治风湿性腰腿痛。枝、叶、果治牛热症带崩血。子实做凉粉。

梨叶榕

F. pyrifolia Burm.f.

龙胜、平南、大苗山、龙州。

茎皮纤维制人造棉供土纺用。

梨果榕 水棉木、梨叶榕

F. pyriformis Hk. et Arn.

苍梧、大瑶山、大苗山、象州、上思、河池、田阳、那坡、平乐、龙胜、扶绥。

茎皮纤维制人造棉供土纺用。

直脉榕

F. rectinervia Merr.

龙胜（花坪）。

*菩提树

F. religiosa L.

Ficus

田阳。

树皮收敛；治牙痛。花、种子发汗解热，镇静。

箭叶榕 鳞果榕

F. sagittata Vahl

(*F. ramentacea* Roxb.)

武鸣。

匍茎榕

F. sarmentosa Buch.-Ham. ex J.E.Sm.

var. *impressa* (Champ.) Corner

(*F. foveolata* Wall.

var. *impressa* (Champ.) King)

区内各地。

茎皮纤维代麻，造纸，造人造棉。根、叶止咳化痰，祛风行血。

垂果榕☆

F. sikkimensis Miq.

大瑶山。

小果榕

F. silhetensis Miq.

隆林、田林、乐业、凌云、靖西。

粗叶榕 五指牛奶、五指榕、五指毛桃

F. simplicissima Lour.

(*F. hirta* Vahl

var. *palmatiloba* (Merr.) Chun,

F. hirta Vahl

var. *hibiscifolia* (Champ.) Chun)

茎皮纤维代麻。根健脾化湿，行气止痛，舒筋活络；治末梢神经炎，风湿关节炎，跌打，肝硬化腹水，慢性肝炎，病后体弱，产后无乳，劳伤咳嗽。

掌叶榕

F. simplicissima Lour.

var. *hirta* Migo

梧州、藤县、蒙山、博白、贵县、桂平、平南、陆川、北流、德保、来宾、忻城、柳江、桂林。

用途同粗叶榕。作兽药治小猪白痢。

竹叶榕

F. stenophylla Hemsl.

上思、龙州、河池、天峨、南丹、柳州、大瑶山、融安、龙胜、恭城、桂林、兴安、苍梧、贺县、昭平。

茎皮纤维代麻。

锥叶榕 假斜叶榕、石榕

F. subulata Bl.

台湾榕

F. taiwaniana Maxim.

区内各地。

茎皮纤维代麻织袋。

地瓜榕 覆坡虎、地枇杷

F. tikoua Bureau

百色、隆林、凌云、宜山、横县、贵县、桂林。

全草利尿凉血，消肿止痛，除湿，止白带；治痔疮出血，白带过多，牙龈肿痛，肚痛，泄泻。

三叉榕

F. trivialis Corner

贵州榕

F. tsiangii Merr. ex Corner

青果榕

F. variegata Bl.

var. chlorocarpa (Benth.) King

(F. chlorocarpa Benth.)

田林、靖西、龙州、陆川。

茎皮纤维代麻，织麻布、麻袋。

变叶榕

F. variolosa Lindl. ex Benth.

区内各地。

茎皮纤维代麻，造棉，造纸。枝、叶治跌打。根作兽药，治风湿痹痛，四肢无力。

笔管榕

F. wightiana Benth.

上思、十万大山、龙州、那坡、平乐。

牛筋藤

Malaisia scandens (Lour.) Planch.

龙州、宁明、南宁、隆林、田阳、罗城、北流、陆川。

茎皮纤维制绳。根祛风除湿；治风湿痹痛，腹泻。叶作牛马饲料。

*桑

Morus alba L.

区内各地。

家蚕饲料。果生食或酿酒。茎皮纤维可制蜡纸、棉纸、人造棉等。

木材供家具、乐器、旋工、雕刻等用材。桑叶清热散风，凉血明目；治风热感冒，头痛咳嗽，目赤涩痛等症。桑白皮清热消肿，止咳平喘；治肺热喘咳，水肿尿少，腹胀等。桑椹（果）滋阴补血；治体虚，头目眩晕，便秘，消渴。桑枝祛风湿，通经络；治风湿痹痛，风热臂痛，跌打等。

小叶桑 鸡桑、皮藤、鸡脚桑

M. australis Poir.

(*M. acidosa* Griff.)

区内各地。

根、叶清热解表，凉血利尿；治感冒咳嗽，黄疸病，鼻血等。茎皮纤维造蜡纸、绝缘纸、人造棉。果生食或酿酒。叶饲养家蚕。

崖桑

M. mongolica Schneid.

桂林、全州、恭城、阳朔、平乐、凌云、乐业、贵县、天峨。
叶、根皮清热利尿，驱风止咳；治全身发黄，风热咳嗽。

黔鄂桑 黄蚕木

M. wittiorum H.-M.

大苗山、大瑶山、罗城、全州、龙胜、扶绥。

假鹊肾树

Pseudostreblus indica Bur.

桂西北。

鹊肾树

Streblus asper Lour.

龙州、南宁、靖西。

茎皮纤维代麻织袋，造棉，造纸。树皮解热；治痢疾、腹泻。根解蛇毒，治创伤。

刺桑

Taxotrophis ilicifolius Vidal

(*T. macrophylla* sensu Merr., non Boerl.)

田阳。

米浓液 条隆胶树

Teonongia tonkinensis Stapf

Boehmeria

龙州、大新、宁明、百色、靖西。

树干所含胶乳制成的橡胶，耐酸碱及耐水性能都很强，能在较低的温度下塑炼、混炼，可以制造胶管、胶板、垫圈、力车轮胎及胶鞋等。叶可作牛饲料。

169 荨 麻 科 URTICACEAE

黔桂苧麻☆

Boehmeria blinii Lévl.

桂西北。

白面苧麻

B. clidemioides Miq.

龙胜、桂林、大瑶山。

木苧麻

B. densiflora Hk. et Arn.

靖西。

茎皮纤维造纸。

灌木苧麻

B. frutescens Thb.

龙胜、大瑶山、大苗山。

茎皮纤维代麻，造纸。

蒙自苧麻 野水苧麻、大叶苧麻

B. grandifolia Wedd.

临桂、全州、南宁、大新、隆林。

茎皮纤维代麻，造纸。叶清热解毒，消肿；治疮疥；又可饲猪。

藪苧麻

B. japonica Miq.

龙胜。

茎皮纤维代麻，造纸。叶当饲料。

大叶苧麻 长叶苧麻

B. macrophylla Don

武鸣、宁明、靖西、德保、那坡、百色、田林、隆林、兴安。

茎皮纤维洁白柔软，可代苧麻，供纺织用。

● 苧麻 青麻、白麻

B. nivea (L.) Gaud.

区内各地多数栽培，也有野生。

茎皮纤维细长，强韧，洁白有光泽，抗湿，抗热，耐用，适于织夏布、降落伞、电线包布、渔网，制人造棉、人造丝等等。并能与羊毛、棉花混纺成高级衣料，亦可单纺。短纤维可造高级纸、地毯、麻袋等。根、叶清热利尿，凉血散瘀，安胎，止血；治感冒，高热，小儿麻疹，水肿，骨折，急性关节扭伤，风湿关节炎，急性淋浊，尿血，脱肛，赤白带下，胎漏腹痛，下血。创伤出血，疮疡肿毒，用鲜叶外敷。叶作养蚕及作饲料、肥料等。种子可榨油。

青苧麻

B. nivea (L.) Gaud

var. tenacissima (Gaud.) Bl.

那坡、贺县。

用途与苧麻同。

悬铃木叶苧麻

B. platanifolia Fr. et Sav.

灵川、龙胜、恭城、贺县、靖西、凤山。

茎皮纤维制绳，造纸，纺织。

水苧麻

B. platyphylla Don

龙州、桂林。

Boehmeria-Debregeasia

茎皮纤维纺纱，作人造棉，制绳，制麻袋。全株作兽药，治牛软脚症，痲症和风湿。

糙叶水芭麻

B. platyphylla Don

var. *scabrella* (Gaud.) Wedd.

苍梧、岑溪、平南、龙州、百色。

茎皮纤维造纸，织布，制绳。全株治风湿痛，毒疮。

小赤麻

B. spicata Thb.

上林、全州。

茎皮纤维造纸，织布，制绳，全株治小儿麻疹。

越南芭麻

B. tonkinensis Gagn.

百色。

茎皮纤维造纸，织布，制绳。

三脉芭麻

B. trinervia Wright

藤县。

用途同上。

水麻 水麻叶

Debregeasia edulis (S. et Z.) Wedd.

隆林、凌云、靖西、百色、田林、德保、那坡、乐业、东兰、天峨、南丹、罗城、大苗山、柳江、宁明、桂林。

茎皮纤维制人造棉及纺织用。全株止泻，消肿。果可酿酒，熬糖；果渣与叶喂猪。

长叶水麻

D. longifolia (Burm.f.) Wedd.

龙州。

茎皮纤维代麻，作混纺原料。果可食。籽可榨油。

短柄长叶水麻☆

D. longifolia (Burm.f.) Wedd.

var. *brevipedunculata* Chien et C J Chen

宁明（公母山）。

用途同上。

鳞片水麻

D. squamata King

(*D. spiculifera* Merr.)

平南、象州、大瑶山、宁明、桂林。

用途同上。

尖叶楼梯草

Elatostema acuminata (Poir.) Brongn.

龙胜。

短齿榕叶楼梯草☆

E. ficoides (Wall.) Wedd.

var. *brachyodontum* H.-M.

大瑶山、武鸣。

总苞楼梯草

E. involucreatum Fr. et Sav.

龙胜、桂林。

平滑楼梯草 石羊草

E. laevigatum (Bl.) Hassk.

大瑶山、乐业、龙州、桂林。

全株治水泻，肺病。

Elatostema-Laportea

线条楼梯草

E. lineolatum Wight

var. *majus* Thw.

桂西北。

阔叶楼梯草

E. platyphyllum Wedd.

武鸣、龙州、扶绥、德保、百色、大瑶山。

全株清热解毒。

凸尖楼梯草 毛梗子

E. sessile Forst.

var. *cuspidatum* (Wight) Wedd.

龙州、扶绥、大苗山、龙胜、隆林。

多头花楼梯草 半边刀

E. sessile Forst.

var. *polycephalum* Wall.

容县、百色。

柔毛楼梯草

E. sessile Forst.

var. *pubescens* Hk.f.

凌云、乐业。

全株拔毒；治疮疥。

火麻树 麻风树

Laportea chingiana H.-M.

凤山、龙州、凌云、乐业、靖西、德保、隆林。

叶上刺毛有毒，刺伤皮肤会引起剧痛，红肿，抓搔之容易溃烂。

解救方法参阅艾麻草。

艾麻草 老虎鬃

L. crenulata (Roxb.) Gaud.

桂西南。

茎皮纤维制绳，纺织粗布。全株有刺毛，含高浓度的蚁酸和草酸，皮肤触毛刺伤后引起搔痒，继而烧痛，红肿，皮肤搔破后流出的水液也有毒。刺毛对牲畜也有毒害，据记载，马被刺伤后引起发狂，严重的甚至死亡。

解救方法：用其横走的根揉擦患处；用海芋的水液洗抹；用氨水洗。如皮肤被搔破，可用浓茶或鞣酸湿敷伤口，保持清洁，以免感染。

顶花艾麻 麻风树

L. terminalis Wight

龙州、靖西。

茎皮纤维代麻，制人造棉。种子油供食用和药用。叶上也有含毒的刺毛，其毒害的情况和解救方法参阅艾麻草。

葡萄叶艾麻 豆麻

L. vitifolia H.-M.

龙州、凌云、隆林、灵川、临桂。

全株去痧气，治风湿。叶上也有含毒的刺毛，其毒害的情况和解救方法参阅艾麻草。

箬管草

Lecanthus peduncularis (Royle) Wedd.

桂西北。

水丝麻 普谷麻

Maoutia puya (Wall.) Wedd.

龙州、百色、田阳、隆林。

茎皮纤维制人造棉，造纸，制渔网。

蔓苳麻 猪粥菜

Memoralis hirta (Bl.) Wedd.

区内各地。

茎皮纤维制人造棉混纺。全草凉血拔毒；治刀伤，疮疮，肿毒。作兽药治血便，血尿，感冒，中暑。作猪饲料，牛也喜吃。

花点草 油点草

Nanocnide pilosa Migo

龙州。

紫麻

Oreocnide frutescens (Thb.) Miq.

(*O. fruticosa* (Gaud.) H.-M.)

宁明、百色、苍梧、昭平、大瑶山、大苗山、龙胜、临桂、恭城。
茎皮纤维代麻制绳，纺麻织品，制人造棉。

广西紫麻☆ 广西花点草

O. kwangsiensis H.-M.

大新、龙州、德保、靖西、平果、那坡、天峨、忻城、河池、东兰、凤山。

纤维用途同上。根、叶接骨，洗疮毒。

倒卵叶紫麻☆ 倒卵叶花点草

O. obovata (C.H.Wr.) Merr.

融安、大苗山、平南。

纤维用途同上。

红紫麻☆ 红花点草

O. rubescens (Bl.) Miq.

震叶紫麻 震叶花点草

O. tremula H.-M.

桂西北。

赤车

Pellionia radicans Wedd.

(*Elatostema radicans* Wedd.)

大瑶山、上思、龙胜(花坪)。

长茎赤车

P. radicans Wedd.

forma grandis Gagn.

(*Elatostema radicans* Wedd.

var. grande H.Schröter)

桂林、临桂、扶绥、罗城。

蔓赤车 香蕉草

P. scabra Benth.

(*Elatostema scabrum* Hall.f.)

宁明、扶绥、大苗山、大瑶山、玉林、博白、平南。

全株止血，洗毒疮。

长柄赤车

P. tsoongii Merr.

(*Elatostema tsoongii* H.Schröter)

东兴、那坡。

全株治疗疮。

越南冷水花☆

Pilea alongensis Gagn.

桂西。

石油菜

P. cavaleriei Lévl.

区内各地。

Pilea

全草清热解毒，消肿止痛，利水；治跌打损伤，烫火伤，肺结核，肺热咳嗽，哮喘，疔肿等。全株肉质，可作饲料和绿肥。

石莞茜

P. crassifolia Hance

德保。

全草解热毒。

扇花冷水花

P. fasciata Fr.

龙胜、大苗山、北流。

全草祛风，活血。

长柄冷水花

P. longicaulis H.-M.

龙州。

广西冷水花☆

P. microcardia H.-M.

罗城。

小叶冷水花 透明草

P. microphylla (L.) Liebm.

百色、梧州。

全草清热解毒，安胎；治肿毒。

盾状冷水花

P. peltata Hance

那坡、罗城、柳江、陆川。

全草解毒；治疮疥，疳积，跌打。

孳艾冷水花

P. peploides (Gaud.) Hk. et Arn.

龙胜、大苗山、大瑶山。

全草散瘀止痛；治跌打损伤，骨折，无名肿毒。

石稔草

P. plataniflora C.H.Wright

天峨、龙州。

全草治红白痢。

描绘冷水花

P. scripta Wedd.

龙胜。

亚革质冷水花

P. symmeria Wedd.

var. *subcoriacea* H.-M.

容县（天堂山）。

三脉冷水花

P. trinervia Wight

大苗山、龙州、扶绥、百色、靖西、德保、凤山、阳朔。

湘桂冷水花☆

P. velutinipes H.-M.

大苗山、龙胜。

生根冷水花☆

P. wightii Wedd.

百色。

卵叶雾水葛

Pouzolzia viminea (Wall.) Wedd.

(*P. ovalis* Miq.)

龙州、扶绥、天峨、东兰、隆林、田林。

雾水葛

P. zeylanica (L.) Benn.

(*P. indica* Gaud.)

隆林、百色、凌云、乐业、东兰、南宁、龙州、博白、平南、贵县、梧州。

全草拔毒排脓，清热利湿；治痢疾，肠炎，化脓性炎症，牙痛。
作兽药治牛、猪红肿毒疮，白浊，痢疾。

藤麻

Procris wightiana Wall.

桂西。

170 大 麻 科 CANNABINACEAE

★大麻 火麻

Cannabis sativa L.

那坡、凌云、隆林、东兰、都安、马山、柳州。

茎皮纤维单纺或混纺，织麻布、帆布、包装布、渔网。种子油作油漆，制肥皂；油粕作肥料和家畜饲料。火麻仁润燥滑肠；治病后肠燥便秘，产后血虚便秘，咳嗽，关节痛，月经不调，皮肤搔痒，肢体麻木，健忘等症；外敷治疮疥。叶下虻虫，治蝎毒，疟疾。根破血壅胀；治痢血石淋，胞衣不出，热淋下血不止，心腹满，气短，腕折骨痛。油治发落不生，硫磺毒发身热。

葎草

Humulus scandens (Lour.) Merr.

(*H. japonicus* S. et Z.)

南宁、龙州、扶绥、隆林、凌云、百色、天峨、忻城、昭平、钟山、桂林、临桂、恭城、平乐。

花止咳。果治蚊虫伤，健胃。全草清热利尿，凉血解毒；治肺癆潮热，痢疾，淋病，湿热带下，小儿夏季热，腋下痈初期，青竹蛇咬伤。茎皮纤维代麻，造纸。种子油制肥皂、油墨、润滑油等。

171 冬 青 科 AQUIFOLIACEAE

鼠李冬青

Ilex aculeolata Nakai

(*I. rhamnifolia* Merr.)

桂林、临桂、永福、龙胜、灵川、兴安、灌阳、资源、荔浦、融安、大苗山、大瑶山、罗城、博白、平南、岑溪、钟山、昭平、贺县、横县、武鸣。

根皮清凉解热；治烫火伤，化痰止咳。

棱枝冬青

I. angulata Merr. et Chun

容县、宁明、武鸣、大明山、十万大山。

梅叶冬青 假青梅、秤星木、土甘草

I. asprella (Hk. et Arn.) Champ. ex Benth.

梧州、苍梧、南宁、邕宁、横县、上思、容县、陆川、桂林、全州。

根清热解毒，消肿散瘀；治流感，感冒高热，急性扁桃体炎，咽喉炎，跌打损伤，药毒，蛇毒，虫毒，菌毒，肚痛，气胀等。全草作凉茶。作兽药治牛热症带痢血，喉风症，蜜蜂带，猪丹毒等。

双果冬青

I. bioritsensis Hay.

var. *ovatifolia* H L.Li

(*I. diplosperma* S.Y.Hu,

I. pernyi Fr. forma *veitchii* Rehd.,

I. bioritsensis sensu S.Y.Hu, non Hay.)

兴安、大苗山。

黄杨叶冬青

I. buxoides S.Y.Hu

十万大山、象州、大苗山、灌阳。

革叶冬青☆

I. championii Loes.

大瑶山、龙胜。

巨果冬青

I. chapaensis Merr.

(*I. howii* Merr. et Chun,

I. megistocarpa Merr.)

十万大山、百色、平果。

冬青

I. chinensis Sims

(*I. purpurea* Hassk.,

I. oldhami Miq.)

桂林、临桂、灵川、兴安、恭城、大瑶山、藤县、乐业。

木材作工具用材；制玩具、雕刻品、工具柄、刷背、木梳等。枝、

叶消肿痛；治水火烫伤。种子和树皮有强壮功效。树皮含鞣质，

可提制栲胶。庭园绿化树种。

苗山冬青☆

I. chingiana Hu et Tang

罗城、大苗山、大瑶山、资源、龙胜、全州、兴安、凌云。

茎皮为造纸糊料。

苗山毛冬青☆

I. chingiana Hu et Tang

var. *puberula* S.Y.Hu

凌云、乐业。

密花冬青

I. confertiflora Merr.

龙胜、临桂、十万大山。

广西密花冬青

I. confertiflora Merr.

var. *kwangsiensis* S.Y.Hu

大苗山、大瑶山、十万大山、百色。

枸骨 猫儿刺、鸟不宿

I. cornuta Lindl.

桂林、临桂。

果固涩下焦；治白带过多，遗精，肺结核。根、皮、叶含咖啡硷等，散风热，清头目，解烦渴，祛风湿；治头痛，牙痛，耳鸣，中耳炎，结膜炎。种子油工业用。绿篱树种。茎皮制粘胶可粘鸟。

波缘冬青

I. crenata Thb.

龙胜、灌阳、兴安、灵川、临桂、大苗山。

弯叶冬青

I. cyrtura Merr.

Ilex

全州、龙胜、临桂、资源、永福、兴安、灌阳、容县、平南、大苗山、大瑶山、象州、凌云、乐业、隆林、田林。

金毛冬青

I. dasyphylla Merr.

桂南。

凸脉冬青

I. editicostata Hu et Tang

上思、临桂、龙胜、田林、大苗山。

广西凸脉冬青

I. editicostata Hu et Tang

var. *chowii* (S.Y.Hu) S.Y.Hu

大瑶山、大苗山、临桂。

木姜叶冬青

I. editicostata Hu et Tang

var. *litseaefolia* (Hu et Tang) S.Y. Hu

临桂、灵川、资源、龙胜。

高冬青

I. excelsa (Wall.) Hk.f.

(*I. elliptica* D.Don)

融安。

榕叶冬青

I. ficoidea Hemsl.

恭城、兴安、阳朔、龙胜、桂林、灵川、大瑶山、大苗山、上思、隆林。

庭园绿化。

团花冬青 粘树

I. glomerata King

上思、大苗山、大瑶山、巴马。

茎皮捶制粘胶可粘鸟、虫。

青皮香

I. godajam (Colebr.) Wall.

(*I. godajam* (Colebr.) Wall.

var. *capitellata* (Pierre) Loes.)

龙州、百色、那坡、大苗山、大瑶山、龙胜、恭城、灌阳、永福、资源、平乐。

海南冬青

I. hainanensis Merr.

(*I. rotunda* Thb.

var. *hainanensis* Loes.)

十万大山、合浦、三江、大苗山、罗城。

青茶冬青☆

I. hanceana Maxim.

灌阳、龙胜、大苗山、大瑶山、十万大山。

刺叶冬青

I. hylonoma Hu et Tang

var. *glabra* S.Y.Hu

桂林、临桂、灵川、兴安、阳朔、凌云、乐业。

盘柱冬青☆

I. kengii S.Y.Hu

大瑶山。

广东冬青

I. kwangtungensis Merr.

(*I. kwangtungensis* Merr.

var. *pilosior* H.-M.,

I. kwangtungensis Merr.

var. *pilosissima* H.-M.,

I. phanerophlebia Merr.,

I. latifrons Chun

var. *pilosissima* (H.-M.) Chun)

桂林、临桂、灌阳、永福、灵川、兴安、龙胜、大瑶山、大苗山、
象州、苍梧、贺县、东兰。

庭园绿化。

剑叶冬青

I. lancilimba Merr.

苍梧。

苦登茶 大叶茶

I. latifolia Thb.

(*I. macrophylla* Bl.)

龙州、凭祥、大新、武鸣、桂林(引种)。

叶和果实作凉茶，消暑解毒；治痧气，肚痛，疟疾。

大叶冬青☆

I. latifrons Chun

十万大山、大明山、德保。

罗浮冬青

I. lohfauiensis Merr.

(*I. hanceana* Maxim

var. *lohfauiensis* (Merr.) Chun)

临桂、龙胜、荔浦、大瑶山、容县。

大果冬青

I. macrocarpa Oliv.

龙州、那坡、苍梧、大瑶山、容县、恭城。

木材质重，纹理直，结构细致；宜作家具及建筑板料等用。

长序大果冬青

I. macrocarpa Oliv.

var. *longipedunculata* S.Y.Hu

临桂、龙胜。

谷木冬青

I. memecylifolia Champ. ex Benth.

十万大山。

鄂桂冬青☆

I. metabaptista Loes. ex Diels

南丹、兴安。

小果冬青

I. micrococca Maxim.

(*I. micrococca* Maxim.

var. *longifolia* Hay.)

区内各地。

材用及绿化用。树皮可提制栲胶。

毛小果冬青

I. micrococca Maxim.

forma *pilosa* S.Y.Hu

大瑶山、罗城、凌云、乐业、那坡、靖西、隆林、龙州、宁明、
全州、龙胜、永福、阳朔、灵川、平南、贺县。

南宁冬青

I. nanningensis H.-M.

十万大山。

长梗冬青

I. pedunculosa Miq.

(*I. pedunculosa* Miq.

forma continentalis Loes.)

龙州、上思、龙胜、灵川、灌阳、兴安、资源、恭城、大苗山。

枝叶治痔疮，黄痧，跌打。

广西冬青

I. peiradena S.Y.Hu

十万大山。

平南冬青

I. pingnanensis S.Y.Hu

平南(大瑶山)。

毛冬青 喉毒药、土甘草、纸浆木、毛披树

I. pubescens Hk. et Arn.

区内各地。

根清凉解毒；治喉毒(喉头水肿)，咽喉炎症，脉管炎，暑季外感热症，皮肤急性化脓性炎症等。叶外用治烫火伤。叶和茎皮作造纸糊料原料。

秃毛冬青

I. pubescens Hk. et Arn.

var. glabra Chun

容县、河池、龙胜、扶绥。

用途参阅毛冬青。

广西毛冬青

I. pubescens Hk. et Arn.

var. kwangsiensis H.-M.

平果、田林、隆林、百色、凌云、乐业、东兰、马山、龙胜。

叶生肌，去毒，润喉。枝叶作造纸糊料的原料。

阴生毛冬青

I. pubescens Hk. et Arn.

forma umbratica Loes.

大瑶山、象州、东兰、凌云、恭城、苍梧。

凹叶冬青

I. retusifolia S.Y Hu

兴安。

铁冬青 救必应、圆果冬青、熊胆木

I. rotunda Thb.

区内各地。

树皮、叶凉血散血，消炎解毒；治暑季外感高热，烫火伤，咽喉炎，肝炎，急性肠胃炎，胃痛，关节痛，癣疥，湿疹等。兽医用治胃溃疡，感冒发热和各种痛症，热毒，阴疮。枝叶作造纸糊料原料。树皮可提制染料和栲胶。木材作细工用材。

小果铁冬青

I. rotunda Thb.

var. microcarpa (Lindl. ex Paxt.) S.Y.Hu

罗城、百色、德保、大苗山。

柳叶冬青

I. salicina H.-M.

十万大山。

华冬青

I. sinica (Loes.) S.Y.Hu

全州、龙胜。

华南冬青

I. sterrophylla Merr. et Chun

上思、大苗山、大瑶山、龙胜、阳朔、灌阳、兴安。

黔越冬青☆

I. stewardii S.Y.Hu

南宁、扶绥、宁明、横县、宾阳、合浦、上思、十万大山、陆川、
容县、都安、罗城、大苗山、三江、融安。

甜冬青

I. suaveolens (Lévl.) Loes.

凌云、乐业、临桂。

拟圆齿冬青

I. subcrenata S.Y.Hu

大瑶山。

拟榕叶冬青

I. subficoidea S.Y.Hu

十万大山。

龙胜冬青☆

I. supracostata Chun et How, ined.

龙胜、大瑶山。

四川冬青

I. szechwanensis Loes.

大瑶山、大苗山。

台湾冬青

I. taiwanicola Maxim.

大瑶山、大苗山、凌云、乐业、永福、临桂、全州、龙胜、昭平。

大果台湾冬青

I. taiwanicola Maxim.

var. *macropyrena* S.Y.Hu

全州。

灰叶冬青

I. tephrophylla (Loes.) S.Y.Hu

凌云、乐业、临桂。

三花冬青

I. triflora Bl.

区内各地。

乐昌冬青

I. tsoii Merr. et Chun

资源、龙胜、兴安、全州、那坡。

细叶冬青

I. viridis Champ. ex Benth.

(*I. triflora* Bl.

var. *viridis* (Champ.) Loes.)

隆林、东兰、武鸣、宁明、上思、容县、平南、大瑶山、灵川、

龙胜、兴安、荔浦、蒙山、苍梧。

庐山冬青☆

I. wilsonii Loes.

容县、大瑶山。

173 卫矛科 CELASTRACEAE

大芽南蛇藤

Celastrus gemmatus Loes.

资源。

茎皮纤维造人造棉及造纸。种子油制肥皂。叶和树皮作杀虫农药。

青江藤 野茶藤

C. hindsii Benth.

那坡、凌云、乐业、容县、宜山、罗城、融安、柳城。

短梗青江藤☆

C. hindsii Benth.

var. *henryi* Loes.

天峨。

藤麻南蛇藤 藤麻

C. hookeri Prain

容县、龙胜、全州、阳朔、大苗山、靖西。

过山枫

C. kusanoi Hayata

苍梧、平南、容县、大苗山、大瑶山、南丹、凌云、乐业、龙胜。

根消炎，接骨；治跌打。

单子南蛇藤 单子藤

C. monospermus Roxb.

(*C. benthami* (G. et C.) R. et W.,

Monocelastrus monosperma Wang et Tang)

临桂、桂林、阳朔、十万大山、南宁、武鸣(大明山)、龙州、凌云、平南、罗城、南丹。

南蛇藤

C. orbiculatus Thb.

(*C. articulatus* Thb.)

上林、大苗山、柳城、南丹、龙胜。

全株散瘀消肿，调心脾，续筋骨；治跌打。根和果壳治无名肿毒。

果治失眠症。茎皮纤维制人造棉。种子油制肥皂。茎皮制农药防治蔬菜害虫。

滇南蛇藤

C. paniculatus Willd.

龙州。

根行血气；治无名肿毒。种子油制肥皂。

褐柄南蛇藤

C. rosthornianus Loes.

凌云、乐业、龙胜。

根行血气；治痈疖。

无毛南蛇藤

C. stylosus Wall. subsp. *glaber* Ding Hou

十万大山、靖西。

长序南蛇藤

C. vanioti (Lévl.) Rehd.

罗城。

茎皮纤维制人造棉，作农药。

青铁果 十萼花

Dipentodon sinicus Dunn

凌云、乐业、大苗山。

棘果卫矛☆

Euonymus acanthocarpa Fr.

上思、大瑶山、临桂、全州、阳朔、荔浦。

四川棘果卫矛☆

E. acanthocarpa Fr.

var. *sutchuenensis* Fr.

隆林、全州。

皮刺卫矛

E. aculeata Hemsl.

大苗山。

卫矛

E. alata (Thb.) Sieb.

forma *aptera* (Reg.) Rehd.

Euonymus

大瑶山、桂林、永福。

枝条活血通经，祛瘀镇痛，疏风散寒；治经闭，崩中下血，产后腹痛，腹满出汗，产后败血，疟疾，狂犬伤，蛇虫咬伤。

狭叶卫矛

***E. angustata* Sprague**

龙胜、大瑶山、平南、罗城。

根驱风除湿，舒筋活络；治风湿疼痛，脚转筋。

华卫矛 小正木

***E. chinensis* Lindl.**

龙胜、恭城、凌云、乐业、那坡。

根治跌打。

越南卫矛

***E. cochinchinensis* Pierre**

var. *tonkinensis* Pitard

桂西南。

湖北卫矛☆

***E. dielsiana* Harms**

容县、龙胜、临桂、南丹、凌云、乐业、隆林。

宽叶卫矛

***E. dielsiana* Harms**

var. *latifolia* Loes.

临桂。

黄花序卫矛

***E. forbesiana* Loes.**

那坡、靖西。

扶芳藤 爬行卫矛、爬墙虎

***E. fortunei* H.-M.**

大瑶山、大苗山、容县、蒙山、资源、桂林。

全株舒经络，散瘀血；治风湿性关节痛，跌打损伤，月经不调，咯血，血崩等。

幼枝卫矛

E. gracillima Hemsl.

华北卫矛

E. hamiltoniana Wall.

兴安、阳朔。

常春卫矛

E. hederacea Champ. ex Benth.

容县、凌云、乐业、龙胜。

*正木 大叶黄杨

E. japonica Thb.

桂林、南宁、百色、玉林。

绿化用。

*银边卫矛 银边大叶黄杨

E. japonica Thb.

var. *albo-marginata* T.Moore ex Rehd.

桂林、南宁等市。

栽培花木。

*金心卫矛 金心大叶黄杨

E. japonica Thb.

var. *aureo-variegata* Reg.

桂林、南宁等市。

栽培绿化植物。

疏花卫矛

E. laxiflora Champ. ex Benth.

Euonymus

区内各地。

根滋补，壮筋骨。树皮治腰骨酸痛。根茎皮部含硬性橡胶。

大陆长柄卫矛

E. longipedicellata Merr. et Chun

var. *continentalis* Chun et How

那坡。

多花卫矛

E. myriantha Hemsl.

桂林、临桂、龙胜、全州、资源、灵川、荔浦、大苗山、大瑶山、平南、乐业。

根、茎皮部含硬性橡胶。

长圆叶卫矛

E. oblongifolia Loes. et Rehd.

大瑶山、全州。

川西卫矛☆

E. rehderiana Loes.

融安、全州。

皱叶卫矛

E. rhytidophylla Chun et How

百色、龙州。

广翅卫矛 小铁树

E. streptoptera Merr. et Chun

阳朔、临桂、全州、融安、大瑶山、大苗山、平南、苍梧。

短柄卫矛

E. subsessilis Sprague

凌云、乐业。

有色卫矛

E. tingens Wall.

南丹。

种子油制肥皂，作润滑油。

刺果卫矛

E. wilsonii Sprague

龙胜、乐业。

根驱风除湿，止痛；治风湿水肿，劳伤。

双花假卫矛

Microtropis biflora Merr. et Freem.

龙胜、隆林。

假卫矛

M. cathayensis Merr. et Freem.

平南、象州。

密花假卫矛

M. confertiflora Merr. et Freem.

龙胜、资源、大苗山、大瑶山、平南。

福建假卫矛

M. fokienensis Dunn

上林、大苗山、灵川。

细柄假卫矛

M. gracilipes Merr. et Metc.

隆林、融安。

木犀叶假卫矛

M. osmanthoides H.-M.

(*Chingithamnus osmanthoides* H.-M.)

上思。

Microtropis-Loeseneriella

少脉假卫矛

M. paucinervia Merr. et Chun ex Merr. et Freem.

桂西南。

滇桂假卫矛☆

M. petelotii Merr. et Freem.

凌云、乐业。

网脉假卫矛

M. reticulata Dunn

武鸣(大明山)。

四角假卫矛

M. tetragona Merr. et Freem.

平南、大瑶山。

粉背雷公藤☆ 雷公藤、黄藤根、大黄藤根、南蛇根、昆明山 海棠

Tripterygium hypoglaucum (Lévl.) Hutch.

临桂、兴安、全州、龙胜、灵川、资源、大苗山、贺县。

用途与雷公藤相同。

雷公藤 南蛇根、小黄藤根(全州)

T. wilfordii Hk.f.

全州。

全株有毒。藤消炎解毒；治疔气痛，腰带疮，皮肤发痒。全株作

农药杀菜虫、棉蚜虫，杀鼠，灭蛆、孑孓。茎皮纤维造纸。

178 翅子藤科(希藤科) HIPPOCRATEACEAE

翅子藤

Loeseneriella merrilliana A.C.Smith

隆林、德保、百色。

二籽扁蒴藤

Pristimera arborea (Roxb.) A.C.Smith

龙州、靖西。

毛扁蒴藤

P. setulosa A.C.Smith

龙州。

棱子藤☆

Salacia sessiliflora H.-M.

临桂、兴安、阳朔、罗城、那坡、靖西、龙州、十万大山。

179 茶茱萸科 ICACINACEAE

柴龙树

Apodytes cambodiana Pierre

靖西、德保、龙州。

心翼果

Cardiopteris moluccana Bl.

那坡、龙州。

海南粗丝木 海南须蕊木

Gomphandra hainanensis Merr.

(*Stemonurus hainanensis* (Merr.) Hu)

罗城、天峨、隆林、那坡、龙州、上思、十万大山。

广西琼榄

Gonocaryum sinense H.-M.

十万大山。

大果微花藤

Iodes balansae Gagn.

武鸣、十万大山。

Iodes-Erythropalum

根治肾炎。

微花藤 麻雀筋藤、花心藤

I. ovalis Bl.

宁明、龙州、隆林、那坡、田阳、凌云、天峨、河池。

根治风湿痛。

小果微花藤

I. ovalis Bl.

var. *vitiginea* (Hance) Gagn.

河池、凌云、乐业、西林、龙州。

铜钻 藤蛇总管、黄九牛

Mappianthus iodoides H.-M.

凌云、乐业、那坡、宁明、蒙山、贺县、钟山、平南、博白、临桂、灵川、兴安、永福、龙胜、大瑶山、大苗山。

根、藤祛风活络，除湿消肿；治腰腿痛，手足麻痹，跌打损伤，毒蛇咬伤，黄疸。

海桐假柴龙树

Nothapodytes pittosporoides (Oliv.) Sleum.

临桂、南丹。

肖榄 木棍树

Platea latifolia Bl.

大瑶山、上思、陆川。

182 青皮木科 OLACACEAE

赤苍藤 腥藤、菜藤

Erythropalum scandens Bl.

田林、凌云、龙州、大新、天等、马山、南宁、上思、苍梧、博白、北流、陆川、贵县。

全株利尿；治黄疸。嫩叶可作蔬菜食。

蒜头果 马兰后、山桐子

Malania oleifera Chun et S.Lee, ined.

龙州、大新、德保、靖西、乐业、田林、田阳、凤山。

种子油工业用。

疏花铁青树

Olax laxiflora Merr. ex H.L.Li

十万大山、横县。

香芙木

Schoepfia chinensis Gardn. et Champ.

南宁、横县、上思、平南、桂平、陆川、全州、临桂、龙胜、灵川、永福、隆林、大瑶山、罗城。

种子油工业用。根治骨折。

青皮木 香青皮木、幌幌木

S. jasminodora S. et Z.

上思、凌云、乐业、东兰、罗城、大瑶山、全州。

183 山 柑 科 OPILIACEAE

山柑

Cansjera rheedii Gmel.

龙州、宁明、扶绥、上思、柳城。

鳞尾木 山芥兰

Lepionurus latisquamus Gagn.

龙州、隆林、田阳。

嫩叶可作蔬菜食。

185 桑寄生科 LORANTHACEAE

杉木鞘花寄生 枫树寄生

Elytranthe bibracteolata (Hance) Lec.

桂平、平南、大瑶山、上思、宁明、凌云、德保、靖西、乐业、
那坡、桂林、临桂、荔浦、恭城、河池。

八角鞘花寄生 白银寄生

E. cochinchinensis (Lour.) G. Don

(*Loranthus cochinchinensis* Lour.)

平南、博白、陆川、大苗山、隆林、田林、田阳、宁明、龙州、
武鸣、横县、阳朔、桂林、灵川、苍梧。

全株治肾脏病。

枫鞘花寄生

E. fordii (Hance) Merr.

苍梧、梧州、上思、北流、平南、桂平、大新、隆林、平果、东
兰、河池、罗城、大苗山、大瑶山、恭城、桂林、临桂。

全株清热止咳，补肝肾，祛风湿；治痧气，痢疾，咳血。

栗寄生

Korthalsella opuntia (Thb.) Merr.

凌云、乐业、靖西、龙州、大苗山。

松寄生 华桑寄生

Loranthus chinensis DC.

区内各地。

全株祛风湿，止痛。

广西桑寄生☆

L. chingii Cheng

龙州、武鸣、十万大山、那坡、靖西、博白。

全株祛风湿，治痢疾，小儿睾丸发肿。

心叶寄生☆

L. cordifolius Wall.

上思。

杂木寄生

L. delavayi Van Tiegh.

桂林、临桂、龙胜、那坡。

小叶寄生

L. gracilifolius Schultes

宁明、上思、十万大山、巴马、田阳、那坡、百色、隆林、柳城、平乐、恭城、临桂。

广东寄生 檫树寄生

L. kwangtungensis Merr.

临桂、龙胜、兴安、恭城、贺县。

连江寄生

L. levinei Merr.

凌云、乐业、那坡、都安。

油茶寄生

L. ligustrinus Wall.

(**L. sampsoni Hance**)

贺县、昭平、北流、容县、上思、罗城、融安、三江、东兰、龙胜、临桂以及百色地区。

全株治肺病，咳嗽，伤积。

榔榆寄生 大萼桑寄生

L. maclurei Merr.

临桂、全州、永福、龙胜、平乐、恭城、大苗山、大瑶山、天峨、武鸣、平南、容县、贺县、苍梧。

Loranthus

全株清热，补肝肾，祛风湿，止咳；治内伤，吐血。

小五瓣寄生 苦辣树

L. owatarii Hayata

龙州、兴安、全州、凌云、乐业、大苗山。

桑寄生 桑上寄生

L. parasiticus (L.) Merr.

上思、南宁、邕宁、龙州、宁明、苍梧、梧州、容县、玉林、平南、北流、陆川、桂林等地。

全株补肝肾，壮筋骨，安胎下乳，消肿祛痰；治咳嗽，腰腿痛，坐骨神经痛，高血压，习惯性流产，乳汁不通，吐血，疮疥，子宫脱垂。

五蕊寄生

L. pentandrus L.

田阳。

五瓣寄生 油桐寄生

L. pentapetalus Roxb.

区内各地。

全株祛痰，止痢，祛风，消肿，补血气；治痢疾，肺结核，眼角炎。

火炭木寄生☆

L. tienyensis H.L.Li

田阳。

樟寄生 柿寄生

L. yadoriki S. et Z.

桂林、临桂、全州、龙胜、资源、灌阳、十万大山、大苗山、三江、南丹。

全株祛风除湿，消肿清热，止咳，祛痰，止痢。

槲寄生

Viscum album L.

靖西。

全株强壮，消肿，催乳。

棱枝槲寄生 青冈栎寄生

V. angulatum Heyne

临桂、龙胜、平乐、全州、百色、乐业、容县、北流、平南、贺县、昭平、钟山、苍梧、大苗山、大瑶山。

全株祛风，强壮，舒筋，清热止咳；治肺病，吐血。

无叶枫寄生

V. articulatum Burm.f.

区内各地。

全株止咳化痰，催乳散血；治关节痛，肚痛，风湿，跌打。

檀香叶寄生

V. orientale Willd.

武鸣、扶绥、南宁、邕宁、宁明、龙州、崇左、天等、博白、北流、上思、苍梧、桂林。

全株清热止痛，化痰止咳；治咳嗽，痢疾，疳积。

寄生茶

V. stipitatum Lec.

大苗山、大瑶山、平南、藤县、桂林、那坡、德保、靖西、武鸣、十万大山。

全株代寄生用。

186 檀香科 SANTALACEAE

寄生藤

Henslowia frutescens Champ.

Osyris-Balanophora

上思、苍梧、靖西、北流、陆川、博白。

全株消肿止痛，散血接骨；治跌打刀伤。

沙针 土檀香

Osyris wightiana Wall.

(*O. arborea* Wall.)

宁明、龙州、大新。

根消肿止痛，驳骨；治跌打。

檀梨

Pyrularia sinensis Wu

大瑶山、大苗山、全州、平南。

• 檀香

Santalum album L.

东兴。

心材理气温中，和胃止痛；治脘腹疼痛，气逆，呕吐等。木屑可

蒸檀香油，是尿道消毒剂，又为珍贵香料。

百蕊草

Thesium chinense Turcz.

桂林、临桂、柳城、来宾、隆林。

全株利尿；又治蛇伤。

189 蛇 菰 科 BALANOPHORACEAE

四川蛇菰☆

Balanophora fargesii (Van Tiegh.) Engl.

龙胜。

红冬菰

B. harlandi Hk.

龙胜、兴安。

全株止血，补血。

蛇菰

B. involucrata Hk.f. et Th.

大苗山、隆林、凌云。

小蛇菰

B. japonica Makino

大苗山、容县。

多蕊蛇菰 木菌子

B. polyandra Griff.

陆川、贵县、桂平、苍梧。

190 鼠 李 科 RHAMNACEAE

多花勾儿茶 打炮子

Berchemia floribunda (Wall.) Brongn.

临桂、桂林、隆林、梧州、藤县。

全株消肿止痛；治风湿，腰痛，疮疥。

老鼠耳 铁包金、米拉藤

B. lineata (L.) DC.

龙州、宁明、南宁、邕宁、大新、德保、凌云、乐业、靖西、贵县、玉林、凤山、天峨、大瑶山、柳城。

根、叶散瘀止血，化痰止咳；治肺结核，咯血，咳嗽，颈淋巴结肿大，头痛，腹痛，跌打损伤，疔疮疖肿，蛇伤。

多叶勾儿茶☆ 小通花

B. polyphylla Wall.

凤山、南丹、凌云、靖西、贵县。

全株治淋巴腺结核。

Berchemia-Hovenia

光枝多叶勾儿茶☆

B. polyphylla Wall.

var. *leioclada* H.-M.

龙州、宁明、邕宁、南宁、横县、那坡、贵县、北流。

全株调经活血。

勾儿茶

B. racemosa S. et Z.

上思、宁明、梧州、苍梧、昭平、钟山、贺县、容县、贵县、柳州、大苗山、平果。

根治黄疸。叶治肋膜炎。茎皮纤维代麻纺麻袋，制人造棉。叶可提栲胶，又可代茶。

包叶木

Chaydaia crenulata H.-M.

龙州、宁明、靖西、那坡、隆林、凌云、东兰、凤山、都安。

毛叶咀签

Gouania javanica Miq.

龙州、宁明、靖西、德保、田东、田阳、隆林、凌云、东兰、都安、凤山、天峨。

咀签 下果藤

G. leptostachya DC.

那坡、龙州。

枝、叶消炎止痛；治烧伤烫伤。

枳椇 鸡爪莲、万寿果、鸡爪子、拐枣

Hovenia dulcis Thb.

区内各地。

果供生食或酿酒，制醋，熬糖。种子解酒毒，止渴除烦；治酒醉难醒，口干心烦，食积。根皮活血舒筋；治风湿。材质重，纹理

直，少开裂，供家具、建筑、用具、细工等用材。

毛果枳椇 毛果鸡爪莲

H. trichocarpa Chun et Tsiang

灵川、临桂、全州、资源、兴安、大苗山。

用途同枳椇。

铜钱树

Paliurus hemsleyanus Rehd.

临桂、兴安、桂林、灵川、恭城、柳州、罗城、南丹、平乐。

树皮提制栲胶。

长梗铜钱树 钩交刺

P. hirsutus Hemsl.

临桂、鹿寨、梧州。

马甲子 铁篱笆

P. ramosissimus (Lour.) Poir.

区内各地。

绿篱用。种子油制蜡烛。木材作农具柄。枝叶花果治痈肿溃脓。

根祛风利湿，消肿止痛，续筋驳骨；治腰痛，劳伤，喉痛，头风痛。

靖西假鼠李☆

Rhamnella chingii Merr.

靖西、龙州。

乐业假鼠李☆

R. laui Chun, ined.

乐业。

长麦果树

R. obovalis Schneid.

南丹、贺县。

红脉麦果

R. rubrinervis (Lévl.) Rehd.

(*R. hainanensis* Merr.)

龙州、隆林、凌云、乐业、柳州。

硬叶鼠李☆

Rhamnus coriophylla H.-M.

凌云。

苦李根 苦李藟

R. crenata S. et Z.

区内各地。

根有毒。杀虫消炎，收敛止痒；治癣疥，湿疹，脓疱疮。根制黄色染料。

贵州鼠李☆

R. esquirolii Lévl.

桂西北。

黄鼠李

R. fulvotincta Metc.

临桂。

海南鼠李

R. hainanensis Merr. et Chun

容县、蒙山、那坡。

种子油点灯，制肥皂。

细叶鼠李

R. leptophylla Schneid.

全州、临桂、罗城。

根、果、叶利水行气，消积通便，清热止咳；治便秘气胀，水肿，肺热咳嗽，疮毒，骨折。

纤序鼠李☆

R. nipalensis Laws.

龙州、凌云、隆林、临桂、阳朔、全州、龙胜、柳城、大瑶山、
容县。

冻绿

R. utilis Decne.

隆林、百色、乐业、大苗山、鹿寨、柳州、临桂、兴安、龙胜、
灵川、恭城、容县。

皮、根含绿色色素，可提制绿色染料。根、茎和叶可提制栲胶。
种子油作润滑油。全株药用治跌打。果和皮缓下利尿。

帚状鼠李☆

R. virgata Roxb.

容县、龙胜、柳城、大苗山。

庐山鼠李☆

R. wilsonii Schneid.

龙胜、罗城。

密雀梅藤

Sageretia compacta Drumm. et Sprague

桂西北。

纤细雀梅藤☆

S. gracilis Drumm. et Sprague

那坡。

钩雀梅藤

S. hamosa Brongn.

凌云、隆林、南宁、扶绥、容县。

Sageretia-Zizyphus

红雀梅藤☆ 红藤

S. henryi Drumm. et Sprague

(*S. lucida* Merr.)

上思。

呆降火，清胃热。

皱雀梅藤

S. rugosa Hance

桂林、临桂、钟山、富川、百色、凌云。

大雀梅藤☆

S. rugulosa Hemsl.

南丹、靖西。

雀梅藤

S. theezans (L.) Brongn.

龙州、南宁、邕宁、宁明、兴安。

叶拔毒生肌；治疮疡肿毒。根降气化痰；治咳嗽。果可食。叶可

代茶。

副萼翼核果☆

Ventilago calyculata Tul.

龙州。

翼核果 血风藤、松鳞蕈

V. leiocarpa Benth.

上思、隆林。

根补血，驱风，舒经络，强筋骨；治贫血，萎黄病，月经不调，

风湿骨痛，四肢麻木，腰肌劳损。

●枣 大枣、红枣

Zizyphus jujuba Mill.

区内各地。

果生食，作干枣或蜜饯。果补脾益气，生津；治脾胃虚弱，便溏，津液不足。木材坚硬密致，为农具、工具把柄、雕刻良材。

滇刺枣 莱菀、缅枣

Z. mauritiana Lam.

东兴。

树皮消炎生肌；治烧伤，烫伤。果可食。叶可提制栲胶。

锈毛叶野枣☆

Z. oenoplia Mill.

龙州、宁明、那坡、百色。

毛脉野枣☆

Z. pubinervis Rehd.

靖西、凌云、乐业。

皱枣

Z. rugosa Lam.

百色、田阳。

滇枣

Z. yunnanensis Schneid.

隆林、那坡、德保、靖西、凌云、南丹、阳朔。

191 胡颓子科 ELAEAGNACEAE

川西胡颓子☆

Elaeagnus bockii Diels

临桂、隆林、东兰。

南胡颓子

E. conferta Roxb.

宁明。

Elaeagnus-Ampelopsis

锈花胡颓子

E. fruticosa (Lour.) A.Schlecht.

临桂。

蔓胡颓子 羊奶奶

E. glabra Thb.

大苗山、龙胜、全州、阳朔、临桂、桂林、贺县、容县、上思。

茎皮纤维代麻，造纸，制人造纤维板。果可食，酿酒。花含芳香油，用于调合香料。叶平喘止咳，治哮喘，慢性气管炎。根行气止痛；治风湿骨痛，跌打肿痛，肝炎，胃病。

角花胡颓子

E. gonyanthes Benth.

龙胜、临桂、宁明、龙州、大瑶山、容县。

果可食，生津止渴；治红白痢。

鄂西胡颓子

E. henryi Warb.

临桂、龙胜、大瑶山、容县。

叶止痛，止咳；治风湿腰痛，黄肿，跌打。

193 葡萄科 VITACEAE (Ampelidaceae)

草葡萄

Ampelopsis aconitifolia Bunge

桂林、临桂、柳州。

根皮消肿解毒；治疮疥。

掌裂草葡萄

A. aconitifolia Bunge

var. *palmiloba* (Carr.) Rehd.

桂林、临桂、贵县、苍梧、龙州。

用途同上。

蛇葡萄

A. brevipedunculata (Max.) Koehne

宁明、大新、龙州、靖西、凌云、乐业、隆林、天峨、东兰、临桂、龙胜、兴安、资源、灌阳、恭城、永福、全州、灵川、容县、苍梧、昭平、大苗山。

全株清热解毒；治脚气水肿，风湿性腰腿痛，跌打肿痛，恶疮肿毒等。果可酿酒。种子油制肥皂。

毛叶蛇葡萄

A. brevipedunculata (Max.) Koehne

var. *vestita* Rehd.

苍梧、钟山、贵县、上林。

枝叶治疮疥。

粤蛇葡萄

A. cantoniensis (H. et A.) Pl.

区内各地。

果可酿酒。枝叶可作饮料。全株清暑热，消肿毒。兽医用全株治牛大便秘结。

藤茶

A. cantoniensis (H. et A.) Pl.

var. *grossedentata* H.-M.

平南、贵县、贺县、梧州、昭平、龙胜、荔浦、恭城、兴安、资源、平乐、永福、全州、大瑶山、大苗山。

茎叶作饮料。根皮祛湿退热；治皮肤癣癬。

绿葡萄

A. delavayana Pl.

龙胜、贺县、乐业。

Ampelopsis-Cayratia

根、藤祛瘀消肿，止血止痛，消炎；治风湿性腰腿痛，外伤肿痛，胃痛，痈肿，痢疾，肠炎，骨折，外伤出血。角膜云翳可用30%绿葡萄药水滴眼。

裂叶绿葡萄☆

A. delavayana Pl.

var. *gentiliana* (Lévl. et Van.) H.-M.

柳州、临桂、田林、乐业。

用途参阅绿葡萄。

白蔹 母鸡带仔、九牛力、九莲灯

A. japonica (Thb.) Mak.

桂林、临桂、全州、柳州、来宾、梧州、贺县、武鸣、南宁。

根泻火散结，止血生肌；治痈肿疮毒，烫火伤，冻疮溃疡，赤白带，痔漏，面生粉刺。

大叶蛇葡萄

A. megalophylla Diels et Gilg

大苗山、大瑶山、恭城、龙胜、昭平、苍梧、贺县、龙州。

山葡萄

Cayratia corniculata (Benth.) Gagn.

桂林、临桂、龙胜、上林、大苗山、融安、三江、河池、巴马、隆林、凌云、梧州、平南。

大乌莓☆

C. geniculata (Bl.) Gagn.

龙州。

乌莓

C. japonica (Thb.) Gagn.

区内各地。

全株活血消肿，祛风湿，壮筋骨；治痈疮，疔肿，跌打，风湿。

疳积，血尿。

毛叶乌莓☆

C. japonica (Thb.) Gagn.

var. *pubifolia* Merr. et Chun

东兰、龙州、全州。

根含胶质，可充造纸糊料。茎皮纤维制绳索、犁绳。

风叶藤

Cissus assamica (Laws.) Craib

临桂、龙胜、灵川、大瑶山、大苗山、象州、罗城、南丹、武鸣、平南、容县。

全株通经络，祛风；治风湿，痲肿。

尖叶白粉藤

C. glaberrima (Wall.) Pl.

全株洗疮用。

六方藤

C. hexangularis Thorel ex Pl.

临桂、桂林、龙州。

全株宽筋，活络；治风湿，关节炎，疮疥。

掌叶白粉藤

C. modeccoides Pl.

苍梧、梧州、玉林。

四方藤

C. pteroclada Hayata

平南、大瑶山、上林、龙州。

全株宽筋，活血，消肿；治风湿关节炎，跌打。

白粉藤

C. repens (W. et A.) Lam.

Cissus-Parthenocissus

苍梧、龙州、那坡、大瑶山。

全株有小毒。拔毒消肿止痛；治喉痛，痈疽疮疡，蛇伤，跌打肿痛。兽医用以治牛湿热痢疾，外敷恶疮。

华白粉藤☆

C. repens (W. et A.) Lam.

var. *sinensis* H.-M.

龙胜。

火筒树

Leea indica (Burm.f.) Merr.

上思、宁明、龙州、扶绥、那坡、靖西、隆林。

粉绿叶爬山虎

Parthenocissus glaucophylla Chun

大新、平果、容县、贺县、大苗山、大瑶山、荔浦、永福、兴安。

爬山虎

P. heterophylla (Bl.) Merr.

临桂、全州、兴安、资源、大瑶山、大苗山、横县、龙州、田林、苍梧、十万大山。

根、叶接骨，祛风，解毒；治骨折，风湿疮毒。

亮绿爬山虎 五叶爬山虎

P. thompsonii Pl.

靖西、大苗山、南丹、资源、兴安。

全株治跌打。

红葡萄藤 地锦

P. tricuspidata (S. et Z.) Pl.

全州。

根、茎活血消肿，清凉利尿，消炎；治乳疮，赤白带下，淋沥不

尽。攀援墙上，秋季叶变橙红色，点缀墙壁用。

尾叶崖爬藤 扁钻、马攀子

Tetrastigma caudatum Merr. et Chun

上思、龙州、大瑶山、大苗山、平南、苍梧、阳朔。

茎祛风湿，破血，拔毒。

茎花崖爬藤☆

T. cauliflorum Merr.

龙州。

靖西崖爬藤

T. chingsiense Chun et How, ined.

靖西。

单籽崖爬藤

T. erubescens Pl.

var. *monospermum* Gagn.

靖西。

小扁藤 三叶扁藤、拦山虎

T. hemsleyanum Diels et Gilg

区内各地。

全株活血舒筋，祛风消肿，清凉解热；治风湿腰腿痛，跌打损伤，疖肿，外伤出血，蛇伤，白喉。

崖爬藤

T. obtectum (Wall.) Pl.

靖西、那坡、凌云、凤山、贺县、大瑶山、阳朔、临桂、全州。

全株祛风除湿，行血消肿；治跌打，风湿筋骨痛，风湿麻木，蛇伤，疮疥。

钝叶崖爬藤

T. obtectum (Wall.) Pl.

var. *glabrum* Gagn.

凌云、隆林、南丹、大苗山、大瑶山。

厚叶崖爬藤

T. pachyphyllum (Hemsl.) Chun

(*T. harmandii* Pl.,

T. strumarum Gagn.)

宁明、龙州、田林、柳州。

铁带藤 扁担藤

T. planicaule (Hk.) Gagn.

区内各地。

根、藤祛风活络；治风湿关节炎，腰腿痛，半身不遂，鲜叶外敷治下肢溃疡。

毛脉崖爬藤

T. pubinerve Merr. et Chun

龙州、那坡、河池。

叶治风湿骨痛，刀伤。

齿叶崖爬藤

T. serrulatum (Roxb.) Pl.

小果野葡萄

Vitis balanseana Pl.

龙州、贵县、十万大山、玉林、隆林、苍梧。

根皮舒筋活血，清热解毒，生肌利湿；治骨折，风湿瘫痪，劳伤，无名肿毒，赤痢。茎叶消肿止痛。

桦木叶葡萄

V. betulifolia Diels et Gilg

闽赣葡萄☆

V. chungii Metc.

苍梧。

毛脉刺葡萄☆

V. davidii Foex

var. *ferruginea* Merr. et Chun

资源、龙胜。

果可食。

蔓山葡萄 葛藟

V. flexuosa Thb.

大苗山、柳州、凌云、隆林、龙州、恭城、临桂、龙胜。

果、叶润肺止咳，清热凉血，消食；治咳嗽，吐血，食积。全株强筋骨。果可生食，酿酒。

野葡萄 毛葡萄

V. pentagona Diels et Gilg

凌云、乐业、隆林、百色、平果、南丹、河池、都安、东兰、邕宁、苍梧、昭平、大苗山、大瑶山、荔浦、恭城、临桂、龙胜、全州、资源。

果可食及酿酒；又作葡萄砧木。根、叶清热利湿，消肿解毒；治痢疾，疮疡肿毒。

复叶葡萄

V. piasezkii Maxim.

桂林、全州、乐业。

果止渴，助消化。

假葡萄

V. rotundifolia Rom. du Caill. ex Pl.

凌云、乐业、田林、南丹、大瑶山、象州、苍梧、龙州、兴安、资源。

藤葡萄

V. thunbergii S. et Z.

龙胜、天峨。

果可食，酿酒。藤条可作绳索、捆扎、造纸原料。嫩叶作猪饲料。

★葡萄

V. vinifera L.

桂林、南宁等市。

栽培水果，果可生食，制葡萄干，酿酒。酿酒后的粕可提酒石酸。种子油可制肥皂。叶消炎，收敛；治咽喉痛。

194 柑 桔 科(芸香科) RUTACEAE

降真香 山油桂

Acronychia pedunculata (L.) Miq.

上思、十万大山、南宁、宁明、容县、陆川。

木材供家具、器具用材。树皮提制栲胶。根、叶、果、心材行气活血，

健脾，止咳；治跌打瘀痛，风湿骨痛，胃痛，消化不良，感冒咳嗽。

酒饼筋 东风桔、狗骨筋、狗桔、酒饼药

Atalantia buxifolia (Poir.) Oliv.

(*Citrus buxifolia* Poir.)

桂南。

根、叶祛风散寒，行气止痛；治流感，感冒，咳嗽，胃痛，腰腿痛。

粤酒饼筋☆

A. kwangtungensis Merr.

十万大山、宁明。

思茅酒饼筋☆

A. racemosa Wight et Arn.

var. *henryi* Swingle

靖西。

单叶酒饼簕

A. simplicifolia (Roxb.) Engl.

田阳、靖西。

大叶石椒 松风草、臭节草

Boenninghausenia albiflora (Hk.) Meissn.

龙胜、全州、融安、凌云、乐业。

全株祛风镇痛，止血生肌；治跌打伤痛，刀伤出血，疮毒，疟疾。

可提芳香油；治作物害虫。

酸柠檬

Citrus aurantifolia (Christ) Swingle

容县、上思、宁明。

●酸橙

C. aurantium L.

近成熟果实和幼果入药也作枳壳和枳实用，破气消积，行痰除痞；治脾胃湿热，胸闷腹痛，胸胁疼痛，脱肛，子宫下坠。又为柑的砧木。

●朱橘 朱红橘、朱砂桔

C. erythrosa Hort. ex Tanaka

桂林、南宁等市。

庭园绿化植物。

●柚

C. grandis (L.) Osbeck

(*C. maxima* Merr.)

区内各地，以容县、恭城等地所栽沙田柚 (*Citrus grandis* (L.) Osbeck var. *shatinyu* Hort.) 最著名。

除水果用外，叶、花、果皮可提芳香油。种子榨油工业用。果皮可作蜜饯。酸柚的果皮亦加工作橘红用，名叫青光七爪，但功效较差。

Citrus

●橘红 化州橘红、化州柚

C. grandis (L.) Osbeck

var. *tomentosa* Hort.

陆川、博白、容县。

果皮(药名七爪)健胃止痛，化痰，行气，消肿。

宜昌橙

C. ichangensis Swingle

龙胜、大瑶山、大苗山。

作柑、橙砧木。

广西橙

C. kwangsiensis Hu

河池。

●柠檬 洋柠檬

C. limon (L.) Burm.f.

区内各地。

果生食或制果汁作饮料。果实提取柠檬酸用于化工、医药、食品等工业。果皮提取芳香油用于饮食、香料；入药，为驱风剂。干果皮可泡茶、浸酒。根、叶兽医用治牛咳嗽，疝气，腹冷，消化不良，风湿跌打，阴性疮。种子油可制皂。

●檸檬 柠檬、广东柠檬

C. limonia Osbeck

区内各地。

果味极酸，不堪生食，一般盐渍后供烹调佐膳用，或制解暑解渴柠檬汤。药用叶止咳，消肿消炎；治跌打。

●香櫞 枸櫞、香圆、云香

C. medica L.

临桂、桂林、龙州。

果肉提取柠檬酸制果汁。果皮制蜜饯。花、叶、果皮可提取芳香油。果皮药用健胃化气，祛痰消肿。木材宜制手杖。

●手櫟 佛手

C. medica L.

var. *sarcodactylis* (Noot.) Swingle

区内各地。

果切片晒干药用止寒咳、癆咳，治疝气痛。果皮和叶提取芳香油作调香原料。

●四季桔

C. mitis Blanco

区内各地。

绿化用。

●柑(注) 桔

C. reticulata Blanco

区内各地。主要品种有椪柑、温州蜜柑、红桔等。

除作水果外，花、叶、果皮可提取芳香油用作调香原料。种子油制肥皂、润滑油，亦可食用。

●橙 广柑、广桔、黄果、甜橙

C. sinensis (L.) Osbeck

区内各地。主要品种有柳橙、脐橙、上龙橙、新会橙等。

除作水果外，花、叶、果皮提取芳香油作调香原料。果加工制橙汁、橙酒、果酱等。种子油制肥皂、润滑油，亦可食用。

齿叶黄皮

Clausena dentata (Willd.) Roem.

注：药店的陈皮多为柑橘等的成熟果皮，能理气健胃，燥湿化痰；治风寒感冒，咳嗽痰多，脘腹胀满，食欲不振，腹泻。青皮为未熟果皮或幼小果实干燥而成，能破气散结，舒肝止痛，下食化滞；治胸肋疼痛，肝气郁滞，气逆胀闷，食积。

Clausena

乐业、那坡、靖西、凌云、德保、南丹、罗城、宜山、永福、桂林、天等、龙州。

叶治麻疹，接骨。兽医用枝叶治牛气泄，腹痛，跌打伤，筋骨肿痛，消化不良。

小黄皮 假鸡皮果、山鸡皮果

C. emarginata Huang

龙州、大新、天等、田阳、德保。

野黄皮 山黄皮

C. excavata Burm f.

龙州、宁明、凭祥、隆林。

果可食。木材供家具、细工用。兽医用根、叶治牛腹膨胀，胃肠积气，消化不良，跌打，皮肤湿痒。

●细叶黄皮 鸡皮果

C. indica (Dalz.) Oliv.

龙州、宁明、天等、大新、百色。

果生食，制黄皮酱。果实、枝、叶健胃，祛痰化气，消积消滞，去湿。

广西黄皮

C. kwangsiensis Huang

龙州、马山、武鸣、天等、平果、百色、都安。

果通经止痛。枝叶驱蚊。

●黄皮 黄皮果

C. lansium (Lour.) Skeels

区内各地。

除果作水果外，种子油可制润滑油。枝、叶治牛腹胀及疝气；治猪气喘。叶治感冒。根治胃痛。

华南吴茱萸

Evodia austrosinensis H.-M.

龙胜、阳朔、永福、平南、大瑶山、龙州。

川西吴茱萸☆

E. haberi R. et W.

百色、凌云、乐业、龙胜、容县。

石山吴茱萸

E. calcicola Chun ex Huang

大苗山、靖西、南丹。

叶洗毒疮烂脚。

臭辣树

E. fargesii Dode

龙胜、灵川、梧州。

果实治肚痛。

三叉苦 三叉虎

E. lepta (Spreng.) Merr.

区内各地。

根、叶、皮清热解毒，燥湿止痒，消炎止痛；防治流脑，流感，

中暑。治扁桃体炎，咽喉炎，肝炎，风湿腰腿痛，湿疹，疖肿等。

棟叶吴茱萸 擦树、贼子树

E. meliaefolia Benth.

梧州、上思、龙州、永福、资源、兴安、阳朔、大瑶山。

根、果行气止痛，温中散寒；治头痛，胃痛。

●茶辣 吴茱萸、吴萸

E. rutaecarpa (Juss.) Benth.

隆林、凌云、乐业、田林、凤山。

果实温中散寒，开郁止痛；治脘腹胀痛，呕吐酸，疝气冷痛，

Evodia-Fortunella

月经痛，风湿痛等。叶可提芳香油。种子油制肥皂。

贵州吴茱萸

E. rutaecarpa (Juss.) Benth.

var. *bodinieri* (Dode) Huang

临桂、兴安、罗城、大苗山、凌云、乐业、隆林、苍梧、龙州。

用途参阅茶辣。

石虎

E. rutaecarpa (Juss.) Benth.

var. *officinalis* (Dode) Huang

罗城、全州。

果、叶提芳香油。种子油制肥皂。叶又作杀虫剂。根、花消肿健胃；治气痛，风湿，肚痛。

牛纠树 茶辣

E. trichotoma (Lour.) Pierre

龙州、容县、临桂、那坡、大瑶山。

果健胃祛风，消肿止痛；治肚痛，呕吐，风湿。

●山橘 山金桔

Fortunella hindsii (Champ.) Swingle

区内少量栽培。

水果。

●金柑 圆金柑、桔仔

F. japonica (Thb.) Swingle

容县。

水果。

●金橘 长安金桔

F. margarita (Lour.) Swingle

融安、阳朔、荔浦、平乐、临桂、邕宁。

果生食，作蜜饯，制金橘酒。根行气化痰；治胃痛，瘰癧。

山小桔 饭汤木、山桔仔

Glycosmis citrifolia (Willd.) Lindl.

天峨、梧州、昭平、上思、十万大山、百色、靖西、龙州、宁明、南宁、柳城、大瑶山。

野果。根、叶祛痰消积，破瘀消肿；治感冒咳嗽，食积腹痛，跌打肿痛。

光叶山小桔

G. craibii Tanaka

var. *glabra* (Craib) Tanaka

龙州、靖西、柳城。

华山小桔

G. sinensis Huang

龙州。

小柑 野黄皮树

Micromelum falcatum (Lour.) Tanaka

上思、龙州、宁明、扶绥、阳朔、柳州、那坡。

根治跌打，内伤，喉痛。

全叶小柑 小芸木、鸡屎木

M. integerrimum (Buch.-Ham.) Roem.

那坡、靖西、田阳、田林、隆林、凌云、乐业、百色、天峨、东兰、罗城、融安、柳城、阳朔、龙州、扶绥。

全株行气祛痰，祛风除湿，散瘀止痛；治感冒咳嗽，胃痛，风湿痛，跌打。叶治牛膝胀，胃肠积气，食欲不振，跌打伤。外敷皮肤湿痒。

山豆根叶九里香

Murraya euchrestifolia Hayata

百色。

Murraya-Poncirus

九里香 千里香、月桔

***M. paniculata* (L.) Jack**

区内各地。

花提芳香油。木材密致，供细工用。根、叶行气止痛，活血散瘀；治胃痛，跌打肿痛，风湿，刀伤，湿疹，局部麻醉药。兽医
医用根、叶治牛跌打肿痛，牛叉胛，牛腹胀，腹痛，湿毒，蛇伤。

小叶九里香

***M. paniculata* (L.) Jack.**

var. *exotica* (L.) Huang

融安、梧州、贵县、北流、陆川。

根、叶行气消肿，散瘀；治跌打，风湿，蛇伤。

满天香

***M. tetramera* Huang**

龙州。

全株治疟疾。

单叶藤桔

***Paramignya confertifolia* Swingle**

合浦、宁明。

秃叶黄皮树 黄柏

***Phellodendron chinense* Schneid.**

var. *glabriusculum* Schneid.

罗城、大瑶山、兴安。

树皮清热，燥湿，解毒；治热痢，泄泻，黄疸，淋浊，痔疮，
湿疹，便血。根清凉；治痢疾。叶治疮疥。

● **枳壳** 枳、枸桔、老鼠怕

***Poncirus trifoliata* (L.) Rafin.**

兴安、永福、临桂。

作柑橙砧木。果实宽胸膈，下郁气，健胃；治疝气，脱肛，便秘，子宫下垂。种子油制肥皂、润滑油。叶、花、果提芳香油。果提柠檬酸，用于医药和食品工业。

●裸芸香 山麻黄

Psilopeganum sinense Hemsl.

桂林。

全草利水消肿，并能止呕吐。

●臭草 芸香、小香草

Ruta graveolens L.

区内各地。

全草祛风解毒，凉血散瘀；治感冒发热，月经不调，衄血，牙痛，疖肿，毒蛇咬伤。本品1:1水或酒提取液对金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌有抑制作用。

乔木茵芋

Skimmia arborescens T.Anders. ap. Gamble

十万大山、宁明、上林、大明山、容县、平南、大瑶山、大苗山、荔浦、龙胜。

叶治风湿。

美脉茵芋

S. euphlebia Merr.

上思。

广西茵芋

S. kwangsiensis Huang

十万大山、武鸣、大明山、平南、大瑶山、罗城。

茵芋

S. reevesiana Fortune

临桂、灵川、龙胜、全州、隆林、百色、罗城、容县。

Toddalia-Zanthoxylum

叶治风湿。

见血飞 飞龙掌血、散血丹

Toddalia asiatica (L.) Lam.

区内各地。

根有小毒，散瘀消肿，驱风镇痛；治胃痛，风湿痹痛，感冒，毒蛇咬伤，牙痛，跌打损伤，疥癣。

椿叶花椒☆

Zanthoxylum ailanthoides S. et Z.

凌云、田林、龙胜。

种子油制肥皂、润滑油。果提芳香油作调香原料。根皮治跌打。

岭南花椒 搜山虎

Z. austrosinense Huang

兴安、桂林。

根祛风解毒，散瘀消肿，行气镇痛；治毒蛇咬伤，风湿痹痛，胃痛，牙痛，扭挫伤，骨折，感冒等。

箬档

Z. avicennae (Lam.) DC.

梧州、苍梧、容县、桂平、平南、南宁、龙州、宁明、上思。

根、果行气止痛，祛风利湿；治慢性肝炎，肾炎水肿，风湿骨痛，跌打瘀痛，百日咳，阑尾炎，疖肿等。种子油制油漆、肥皂等。果提芳香油作调香原料。

花椒 川椒

Z. bungeanum Maxim.

龙州、南丹。

果温中散寒，燥湿杀虫；治脘腹冷痛，寒泻呕吐，皮肤湿疮。种子油制肥皂、油漆等。果提芳香油作调香原料。果实作食品调味剂。

花椒霸

***Z. cuspidatum* Champ.**

临桂、灵川、龙胜、资源、阳朔、象州、大苗山、南丹、乐业、百色、梧州、龙州。

根、叶治跌打。种子油工业用。

异叶花椒

***Z. dimorphophyllum* Hemsl.**

柳城、柳州。

种子治眼翳膜。果、叶提芳香油作食品香料。

假蚌壳椒☆

***Z. dissitoides* Huang**

扶绥、河池、靖西。

根治牙痛。

蚌壳椒☆

***Z. dissitum* Hemsl.**

临桂、桂林、阳朔、那坡、乐业、田阳、南丹、大苗山。

根治牙痛。

长梗蚌壳椒☆

***Z. dissitum* Hemsl.**

var. *longipedunculatum* Huang, in herb

宁明、上思。

刺壳椒

***Z. echinocarpum* Hemsl.**

南丹。

根抗凝血。

广西花椒

***Z. kwangsiensis* (H.-M.) Chun**

Zanthoxylum

大苗山。

根、果治痧症，舌头肿。

两面针 胡椒筋、入地金牛

Z. nitidum (Lam.) DC.

桂南、桂东南和桂西。

根、叶、果祛风活络，散瘀止痛，解毒消肿；治风湿骨痛，腰肌劳损，胃痛，蛇伤，虫牙痛。

竹叶椒

Z. planispinum S. et Z.

桂林、临桂、兴安、全州、罗城、大苗山、融安、宜山、南丹、西林、乐业。

根、果散寒去湿，健胃杀虫，止痛；治风湿骨痛，跌打肿痛，胃痛，顽癣，虫牙痛，咳嗽。种子油可食。果、籽、枝、叶提芳香油。果皮作调味品。

毛竹叶椒

Z. planispinum S. et Z.

forma ferrugineum (R. et W.) Huang

桂西。

果祛风止痛，健胃行气；治消化不良，风湿，腰骨痛，痧症，破伤风，沙眼，水肿。

大叶臭椒

Z. rhetsoides Drake

靖西、武鸣、大瑶山、资源。

根、叶消肿止痛，驳骨；治风湿，跌打，疮疥，痈疖，湿疹。

香椒子

Z. schinifolium S. et Z.

临桂、柳州。

果、根、叶温中散寒，燥湿杀虫；治脘腹冷痛，呕吐，皮肤湿疮等。

195 苦木科 SIMARUBACEAE

臭椿 樗

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle

南丹、临桂、兴安。

木材造木砵、车辆、农具等。根皮清热利湿，收敛固肠；治赤白痢，便血崩漏，遗精白带。果活血祛风，利湿；治肠风下血，带浊遗精，风湿痹痛。树皮和叶提制栲胶。花提芳香油。叶可饲猪。嫩苗可食。种子油可食，制肥皂、润滑油。

鸦胆子 老鸦胆、苦桑子

Brucea javanica (L.) Merr.

桂南各县。

种子清热利湿，杀虫止痢；治阿米巴痢疾，间日疟，赘疣，鸡眼，早期血吸虫病。种子油为半干性油，制肥皂、润滑油。

毛鸦胆子

B. mollis Wall.

var. *tonkinensis* Loes.

龙州。

苦树 苦胆木

Picrasma quassioides Benn.

岑溪、容县、桂林(栽培)、巴马、凌云、隆林。

树皮祛风除湿，消炎抗菌，杀虫；治风湿性关节炎，蛔虫病，疥癣等。茎皮纤维制人造棉，造高级文化用纸。树皮可提取染料；又作农药用。

196 橄榄科 BURSERACEAE

●阿拉伯乳香树

Boswellia carterii Birdw.

原产伊朗、伊拉克、索马里等国，我区有引种。

Canarium-Aglaia

干燥的油胶树脂即乳香，理气止痛，活血消痈，生肌拔毒；治筋脉拘挛，跌打损伤，痈疽疮毒，心腹诸痛。

橄榄 白榄、黄榄

Canarium album Raeusch.

南宁、玉林、梧州、钦州等地区，白榄多栽培，黄榄多野生。

果生食或渍制；药用清肺利咽，生津止渴，开胃顺气；治喉头炎，咳血，烦渴，肠炎腹泻。木材供建筑、造船、枕木等用。种子油制肥皂、润滑油。

华南橄榄 三角榄

C. austro-sinensis Huang, ined.

龙州。

果亦可食。种子油制肥皂及润滑油。木材用途同橄榄。

乌榄 黑榄

C. pimela Koen.

本区南部、西部、东南部各地，多属栽培。

果肉腌制榄角作菜；榨油作食用油或制肥皂及其他工业用油。榄仁作饼食及肴菜配料。木材用途同橄榄。根舒筋活络，去湿；治风湿腰腿痛，产后瘫痪，手足麻木，胃痛，烫火伤。

●没药树

Commiphora myrrha (Nees) Engl.

干燥树脂即没药，行气活血，消肿止痛。治痈疽肿痛，损伤瘀血，经闭症瘕，胸腹诸痛，敛疮生肌。

白头树

Garuga pinnata Roxb.

龙州。

197 楝 科 MELIACEAE

●米仔兰 树兰

Aglaia odorata Lour.

梧州、南宁、武鸣、宁明、龙州、扶绥、百色、靖西、凌云、乐业、田阳、柳州。

花提芳香油配制各种香精；熏茶。木材供雕刻用。枝、叶治跌打、痼疮。

梨果米仔兰☆ 山楞

A. roxburghiana Miq.

宁明。

木材作造船、建筑、车辆、农具、家具用材。

四瓣米仔兰 沙楞子、红楞

A. tetrapetala Pierre

凌云、乐业、田林、靖西、田阳、平果、天峨、南丹、河池、平南、苍梧、大新、龙州、荔浦、阳朔。

木材用途同上一种。

滇桂米仔兰☆

A. wangii H L.Li

百色。

大叶山楝 苦柚木、红楞木

Aphanamixis grandifolia Bl.

宁明、龙州、阳朔、合浦、钦州。

木材作家具、建筑、桥梁、枕木、舟车用材。种子油制肥皂及润滑油。

溪桫

Chisocheton paniculatus (Roxb.) Hiern

上思。

麻楝

Chukrasia tabularis A.Juss.

百色、那坡、凌云、东兰、平乐、临桂、桂林、恭城。

木材作家具、车辆等用材。

Chukrasia-Heynea

毛麻楝

C. tabularis A Juss.

var. *velutina* (Wall.) King

西林、田林、靖西、百色、都安。

木材用途同上。

灰毛浆果楝

Cipadessa cinerascens (Pell.) H.-M.

(*C. baccifera* Miq.

var. *sinensis* R. et W.)

区内各地，桂西较多。

根、叶祛风化湿，行气止痛；治风湿跌打，痢疾腹痛，疟疾。种

子油制肥皂。

海南桤木

Dysoxylum hainanense Merr.

龙州。

材用。

香港桤木

D. hongkongense (Tutch.) Merr.

大瑶山、上思、龙州。

木材作家具、门窗、板料用材。种子油工业用。

多脉桤木☆

D. lukii Merr.

百色、上思、十万大山。

用途同上。

海木 老虎楝

Heynea trijuga Roxb.

上思、十万大山、宁明、龙州、那坡、蒙山。

材用。

小果海木 鸭公青

H. trijuga Roxb

var. *microcarpa* Pierre

平南、靖西、田林、永福、临桂、凤山、蒙山。

材用。

毛叶海木 鹧鸪花、擦子公树

H. trijuga Roxb.

var. *pilosula* C.DC.

隆林。

绒果海木

H. velutina How et T.Chen

上思、龙州、邕宁。

苦楝 楝

Melia azedarach L.

区内各地。

木材作家具、用器、箱板、板鞋等用材。根、茎皮治小儿蛔虫，钩虫。外用消肿，驳骨，杀虫；治水肿，烫伤，蛇头疮，跌打。

叶、树皮、花、种子作农药。根、茎皮提制栲胶。种子油制肥皂、油漆、润滑油等。茎皮纤维造纸或代麻纺织麻袋。

南岭楝树 大楝树

M. dubia Cav.

兴安。

材用。

川楝

M. toosendan S. et Z.

阳朔、三江、田林、隆林、乐业。

Munronia-Toona

材用同苦楝。果实舒肝止痛，燥湿杀虫；治胸腹作痛，行经胸腹胀痛，头癣疥癬，蛔虫腹痛，寒疝偏坠。

小地黄连 云南地黄连

Munronia delavayi Fr.

田阳。

根有小毒，舒筋活血，消炎止痛；治跌打损伤，风湿关节炎。

矮地黄连☆ 白花矮朵朵

M. henryi Harms

隆林。

全株有小毒，舒筋活血，消炎止痛；治跌打损伤，病后虚弱，风湿骨痛，咳嗽，吐血，哮喘，肺炎。

地黄连

M. sinica Diels

隆林。

●桃花心木

Swietenia mahagoni Jacq.

玉林、南宁、百色、靖西。

木材纹理通直，结构细致，色调鲜明，易加工，宜作门窗、家具、用器用材。

小果香椿

Toona microcarpa (C.DC.) Harms

百色、隆林、田阳。

木材作建筑、舟车、家具、农械等用材。

香椿 椿芽树

T. sinensis (A. Juss.) Roem.

(*Cedrela sinensis* A. Juss.)

区内各地。

木材用途同上。根皮开窍，止痢，去湿；治子宫出血，产后出

血，肠出血。嫩叶治痔疮。果收敛止血，祛风除湿，止痛；治肠炎，痢疾，胃炎，胃溃疡，便血脱肛，血崩，白带，遗精，风湿骨痛，发表透疹。嫩叶作蔬菜。种子油制肥皂。根和木屑提芳香油作赋香剂。茎皮纤维制绳索。

红楝子 红楝

T. sureni (Bl.) Merr.

博白、容县、田林、隆林、那坡。

木材用途同小果香椿。树皮提制栲胶。

毛红楝子

T. sureni (Bl.) Merr.

var. *pubescens* (Fr.) Chun

灌阳。

用途同上。

割舌树 米层

Walsura robusta Roxb.

大新、龙州。

野果。

198 无患子科 SAPINDACEAE

肖异木患

Allophylus racemosus (L.) Radlk.

上思、龙州、宁明。

瑶果 细子龙、假龙眼

Amesiodendron chinense (Merr.) Hu

龙州、大新、隆安。

木材作家具、造船、建筑、雕刻等用材。种子油工业用。种子含淀粉，可作饲料及酿酒。

滨木患

Arytera littoralis Bl.

灵山、合浦、上思。

木材作农具用材。

虎灯笼

Cardiospermum corindum L.

龙州、平果。

倒地铃 金丝苦楝藤、包袱草

C. halicacabum L.

荔浦、临桂、天峨、柳州、武鸣、南宁、宁明、田阳、合浦。

全草消肿止痛，凉血解毒；治疮疥，痲疹，发冷，跌打外伤，湿疹，蛇伤。根止吐，缓泻。全草又作外科洗涤药。

小果倒地铃

C. halicacabum L.

var. *microcarpum* (Kunth) Bl.

龙州、宁明、南宁、大新、百色、东兰、容县、贵县。

全草消炎解毒；治蛇伤，小儿睾丸热肿，小儿发热，全身起泡，白泡疮，疳气。

茶条木 米椿树、滇木瓜

Delavaya yunnanensis Fr.

龙州、大新、田林、平果、隆林、那坡、田阳、桂林（栽培）。

种子油制肥皂，润滑油；治疥癣。

坡柳 铁扫把、车桑子

Dodonaea viscosa (L.) Jacq.

十万大山。

种子油制肥皂等工业用。叶退热；治咽喉炎。

赤才

Erioglossum rubiginosum (Roxb.) Bl.

(*E. edule* Lec.)

扶绥。

• 龙眼 圆眼、桂圆

Euphoria longan (Lour.) Steud.

桂东、桂南、桂西各地。

果生食，晒干果，制罐头。木材坚硬，为家具、细工、舟车等良材。

圆肉滋补强壮；治神经衰弱，病后体虚，失眠，心悸，健忘。

果核收敛止血，消滞止痛。叶解表；防治流感，感冒。

缴花木

Eurycorymbus cavaleriei (Lévl.) Rehd. et H.-M.

兴安、全州、南丹。

掌叶木 鸭脚板

Handeliodendron bodinieri (Lévl.) Rehd.

隆林、凌云、乐业、东兰、南丹、天峨。

种子油清香可食，量不能多，又可制肥皂。

尖果栾树

Koelreuteria bipinnata Fr.

var. *apiculata* (R. et W.) How et Ho

凌云、靖西、南丹、桂林、灵川、贵县。

木材作家具、用器等用材。种子油工业用。花可制黄色染料。

毛叶栾树

K. bipinnata Fr.

var. *puberula* Chun ex How et Ho

百色、隆林、天峨、桂林。

Koelreuteria-Mischocarpus

材用。种子油工业用。

全缘栾树 黄山栾树

K. integrifoliola Merr.

桂林、临桂、灵川。

材用。种子油工业用。

小栾树

K. minor Hemsl.

南丹、天峨、凤山、靖西、大新、龙州、宁明、临桂、桂林、灵川、平乐。多见于石山上。

材用。种子油工业用。

窄叶小栾树

K. minor Hemsl.

forma angustifoliolata How, ined.

临桂。

●荔枝

Litchi chinensis Sonn.

桂南、桂东、桂西南各地。

果生食，晒干果，制罐头。木材坚硬细致，可作上等家具及特种机械用材和油榨、船舵、车轴等。果核温中理气，散寒止痛；治胃痛，疝气，妇女血气刺痛。

柄果木

Mischocarpus oppositifolius (Lour.) Merr.

合浦、上思、十万大山、武鸣、大明山、靖西、大瑶山。

木材硬重，结构细致，作上等家具、高级箱盒、装饰、工艺等用材。

海南韶子 毛荔枝

Nephelium lappaceum L.

var. *topengii* How et Ho

上思。

木材供建筑、造船用。果可食，可制果酒。种子油制肥皂、润滑油。树皮和果皮提制栲胶。果皮治痢疾。

肖韶子 山荔枝、盲眼果

Pseudonephelium confine How et Ho

上林、龙州、南宁、百色、容县、鹿寨。

材用。种子有毒。

●无患子 洗手果、木患子、油患子、木患树、苦患树

Sapindus mukorossi Gaertn.

区内各地。

木材作箱板、器具、玩具、木梳等用材。果壳代皂，洗涤丝织品，对皮肤有消毒作用。果壳煮出液治棉蚜虫、红蜘蛛、甘薯金花虫、地老虎等。煮出液又可配制乳化剂作农药用。种子油制肥皂和润滑油等。果有小毒，有溶血作用，祛风解表，行气止痛；治伤风咳嗽，劳伤咳血，白喉，扁桃体炎，支气管炎，肠胃炎等。根有小毒，凉血解毒；治毒蛇咬伤，痈，疖。

198A 七叶树科 HIPPOCASTANACEAE

靖西七叶树(注)

Aesculus chingsiensis Fang

靖西。

注：本属树木可供庭园绿化。

Aesculus-Bretschneidera

桂西七叶树

A. chuniana Hu et Fang

龙州、那坡。

种子油供工业用。木材作造纸原料。

革叶七叶树

A. coriaceifolia Fang

靖西。

广西七叶树

A. kwangsiensis Fang

邕宁。

黔桂七叶树

A. tsiangii Hu et Fang

宁明、龙州。

198B 南 华 木 科 BRETSCHNEIDERACEAE

南华木 伯乐树

Bretschneidera sinensis Hemsl.

大明山、大瑶山、大苗山、龙胜、全州。

绿化树种。树皮接骨；治骨折。

云山南华木☆ 云山伯乐树

B. yunshanensis Chun et How

龙胜。

绿化树种。

200 槭 树 科 ACERACEAE

窄裂槭(注)

Acer angustilobum Hu

隆林、大瑶山、罗城、龙胜、兴安、临桂、永福。

长尾窄裂槭

A. angustilobum Hu*forma longicaudatum* Fang

大苗山、兴安。

广东窄裂槭

A. angustilobum Hu*var. kwangtungense* (Chun) Fang*(A. sinense* Pax*var. kwangtungense* Chun,*A. wilsonii* Rehd.*var. kwangtungense* (Chun) Fang)

大苗山。

两色槭

A. bicolor F.Chun*(A. sinense* Pax*var. iatrophifolium* Diels)

靖西、大瑶山、容县、灵川。

注：本属多数树种的木材，可作木材干馏材料、单板、胶合板、枕木、家具、地板、车厢、飞机机身、船桨、冰箱、木梭、纱管、木梳、运动器械、乐器等用材；又是优良的绿化树种。

Acer

圆齿两色槭

A. bicolor F.Chun

var. *serrulatum* (Metc.) Fang

(*A. cappadocicum* Gled.

var. *serrulatum* Metc.)

大明山、大瑶山、大苗山、灵川、兴安、龙胜、资源。

马蹄槭

A. bodinieri Lévl.

var. *convexa* Fang

兴安。

桂北槭

A. chingii Hu

大瑶山、大苗山、环江、临桂、兴安。

樟叶槭

A. cinnamomifolium Hay.

(*A. oblongum* Hu, non Wall.,

A. oblongum Wall.

var. *macrocarpum* Hu)

永福、灵川、临桂、罗城。

紫槭

A. cordatum Pax

阳朔、临桂、龙胜、兴安。

革叶槭

A. coriaceifolium Lévl.

临桂、灵川。

青蛤蟆 青榨槭、青皮槭

A. davidii Fr.

(*A. cavaleriei* Lévl.)

资源、全州、恭城、兴安、龙胜、永福、大苗山、大瑶山、罗城、

凌云、乐业、田林、隆林、那坡等地。

树皮和叶可提制栲胶，韧皮纤维是人造棉、造纸、编绳原料。树液可熬糖。

小蕊槭

A. decandrum Merr.

桂南。

罗浮槭☆

A. fabri Hance

(*A. oblongum* Wall.

var. *concolor* Pax,

A. fargesii Fr. apud Rehd.)

区内各地。

果治喊叫过度而引起的声音沙哑，又治双单鹅喉。

绿果罗浮槭 毛梗红翅槭

A. fabri Hance

var. *virescens* Fang

百色、苍梧。

扇叶槭

A. flabellatum Rehd.

兴安、灵川。

广西槭

A. kwangsiense Fang et Fang f.

大新、龙州、靖西、隆林、平乐、全州。

Acer

桂林槭

A. kweilinense Fang et Fang f.

灌阳、龙胜、大苗山、大瑶山。

果治鹅喉。

剑叶槭

A. lanceolatum Moll.

龙州。

疏花槭

A. laxiflorum Pax

资源、灌阳、兴安。

亮叶槭 蝴蝶槭

A. lucidum Metc.

永福、阳朔、临桂、桂林、灵川。

龙胜槭

A. lungshengense Fang

龙胜。

中南槭

A. metcalfii Rehd.

兴安、临桂、大明山、那坡、隆林。

苗山槭

A. miaoshanicum Fang

大苗山。

飞蛾槭

A. oblongum Wall.

永福、临桂、灵川、天峨。

三裂槭

A. oliverianum Pax

大瑶山、凌云。

上思槭

A. shangszeense Fang et Soong

十万大山、上思。

中华槭

A. sinense Pax

兴安、龙胜、临桂、大瑶山、大苗山、凌云、德保。

小果华槭

A. sinense Pax

var. *microcarpum* Metc.

桂西北。

角叶槭

A. sycopseoides Chun

阳朔、罗城、南丹。

岭南槭

A. tutcheri Duthie

苍梧、贺县、永福、龙胜、大瑶山、南宁、大明山。

齿叶岭南槭

A. tutcheri Duthie

var. *serratifolium* Fang

防城、十万大山。

天峨槭

A. wangchii Fang

天峨、南丹。

武陵槭 三峡槭

A. wilsonii Rehd.

资源、灌阳、恭城、兴安、龙胜、灵川、临桂、永福、荔浦、大瑶山、大苗山、容县、大明山、隆林。

都安槭

A. yinkunii Fang

都安。

201 清风藤科 SABIACEAE

狭叶泡花树

Meliosma angustifolia Merr.

十万大山、龙州、靖西、田林、隆林。

山榧叶泡花树 罗壳木

M. buchananifolia Merr.

十万大山、横县、大明山、龙州、都安。

果核油可制油漆和肥皂。

显脉泡花树

M. costata Cuf.

横县、扶绥、灌阳、全州、大苗山、大瑶山、巴马。

叶治咳嗽。

疏枝泡花树

M. depauperata Chun et How

十万大山。

罗浮泡花树

M. fordii Hemsl.

十万大山、龙州、贵县、博白、容县、苍梧、大瑶山、河池、南丹、都安、田林、永福、阳朔、临桂、龙胜、恭城、兴安、全

州。

木材可作家具。种子油供工业用。树皮、叶滑肠；治便秘。

腺毛泡花树

M. glandulosa Cuf.

贺县、全州、龙胜、临桂、大瑶山、大苗山。

贵州泡花树

M. henryi Diels

靖西、宜山。

山青木

M. kirkii Hemsl. et Wils.

大瑶山。

崖县泡花树

M. laui Merr.

十万大山。

多花泡花树

M. myriantha S. et Z.

桂林、龙胜。

狭序泡花树

M. paupera H.-M.

苍梧、永福、阳朔、恭城、融安、南丹。

腋毛泡花树

M. rhoifolia Maxim.

subsp. *barbulata* Cuf.

全州、资源、那坡。

笔罗子 野枇杷

M. rigida S. et Z.

(*M. patens* Hemsl.,

M. rigida S. et Z.

var. *patens* (Hemsl.) Cuf.)

陆川、苍梧、十万大山、临桂、大苗山、凌云。

种子油可制肥皂。树皮、叶可提制栲胶。木材供建筑用。

两广泡花树☆

M. sinii Diels

大瑶山。

绿樟 秤星树、野木棉

M. squamulata Hance

陆川、容县、贺县、十万大山、大瑶山、大苗山、罗城、临桂、

兴安、资源、全州。

木材可供建筑用。

短柄清风藤

Sabia brevipetiolata L. Chen

凌云、南丹。

防已叶清风藤

S. discolor Dunn

凌云、大瑶山、大苗山、临桂、龙胜、兴安、灌阳、全州、贺县。

巴东清风藤☆

S. emarginata Lec.

龙胜。

簇花清风藤☆

S. fasciculata Lec.

凌云、罗城、大瑶山。

茎治风湿骨痛。

清风藤 一刺两口

S. japonica Maxim.

兴安、临桂。

茎祛风湿，通经络；治风湿麻痹，跌打，疮肿。

华清风藤☆

S. japonica Maxim.

var. *sinensis* (Stapf) L.Chen

兴安。

柠檬清风藤☆

S. limoniacea Wall.

藤县、容县、十万大山、龙州、百色、大瑶山、阳朔、临桂。

茎治风湿，产后瘀血。

两广清风藤☆

S. nervosa Chun

大瑶山。

小花清风藤☆

S. parviflora Wall.

(*S. polyantha* H.-M.)

龙州、靖西、百色、田林、凌云、隆林、东兰。

台湾清风藤☆

S. swinhoei Hemsl.

十万大山、容县、永福、灵川、临桂、兴安、大苗山、凌云。

缴房清风藤☆

S. swinhoei Hemsl.

var. *subcorymbosa* (Stapf) L.Chen

融安。

广西清风藤☆

S. wangii L.Chen

南丹。

204 省沽油科 STAPHYLEACEAE

野鸦椿 酒药树、鸡肾果

Euscaphis japonica (Thb.) Kanitz

区内各地。

根皮、树皮、果实、叶入药，通经活络，理气消积，退翳；治小儿疝气，水痘，天花，眼起白膜，月经不调，痢疾泄泻，风湿骨痛。种子油可制肥皂等用。树皮可提制栲胶。木材可作一般器具。

银鹊树 豆腐渣

Tapiscia sinensis Oliv.

全州、荔浦、龙胜、临桂、永福、大苗山、乐业、龙州。

广西山香圆

Turpinia affinis Merr. et Perry

容县、十万大山、大瑶山、大苗山、那坡、百色、隆林。

树干可培养香菇、木耳。

山香圆 五寸铁树、五寸刀

T. arguta Seem.

区内各地。

树干可培养木耳。叶治蛇头指，跌打，痈疮肿毒；又可作饲料。

光山香圆☆

T. glaberrima Merr.

那坡、容县。

狭叶山香圆☆

T. glaberrima Merr.

var. *stenophylla* Merr. et Perry

十万大山。

滇桂山香圆☆

T. indochinensis Merr.

十万大山。

大果山香圆

T. pomifera (Roxb.) DC.

(*T. nepalensis* Wall.)

德保、那坡、百色、凌云、田林、隆林、大瑶山、永福。

琼桂山香圆☆

T. unifoliata Merr. et Chun

上思、大新、靖西。

205 漆 树 科 ANACARDIACEAE

岭南酸枣 假酸枣

Allospondias lakonensis (Pierre) Stapf

(*Spondias chinensis* (Merr.) Metc.

百色、武鸣、天峨、都安、贺县。

木材很软而且极轻，不耐腐，适作小家具、小件文具、箱板等用材。果熟时酸甜可食，有酒香。种子油可制肥皂，点灯。优良庭园绿化树。

●腰果

Anacardium occidentale L.

桂南，原产热带美洲。

热带优良油料树种和果树。果托、种子可食，含油和蛋白质，种

子油为优良食用油，果壳有毒。木材供箱板、造船等用。

小叶山欖子 赤楠

Buchanania microphylla Engl.

田林。

材质稍硬而轻，不耐腐，适作门、窗、农具、一般家具、板料等用材。

酸枣

Choerospondias axillaris (Roxb) Burtt et Hill
(*Spondias axillaris* Roxb)

区内各地。

树皮、根皮和果消炎解毒，收敛止血，消食滞；治烫火伤，外伤出血，食滞腹泻，疮疡溃烂，疝气。木材可作船板、枪托、楼板、桌椅等用材。树皮、叶可提制栲胶。韧皮纤维可供造纸、编绳等用。果可食，酿酒。种壳可制活性炭。叶可作绿肥。

毛脉酸枣

C. axillaris (Roxb) Burtt et Hill
var. *pubinervis* (R. et W.) Burtt et Hill

百色。

人面子

Dracontomelon dao (Blanco) Merr. et Rolfe

陆川、平南、藤县、钟山、武鸣、宁明、龙州、那坡等地，栽培或野生。

果可生食，健胃，生津止渴，促进食欲，又可制成腌渍食品，也有和豆豉、辣椒等制成人面酱作菜。木材耐朽，供建筑、家具等用。种子油可供制肥皂等用。

厚皮树 喃木

Lansea grandis (Dennst.) Engl.

北海。

材质软，很轻，干燥后不开裂，不变形，但不耐腐，适作门、窗、农具、一般家具、板料等用材。心材很耐腐，常用作建筑、车辆、器具用材，又可造纸。树皮内含红色染料，可染渔网等。又可解吃河豚鱼中毒。嫩枝叶是很好绿肥。种子可榨油。

• 芒果

Mangifera indica L.

桂东南一带为多，向北到柳州、宜山、河池。

热带有名果树，果可生食或制成腌渍食品、果酱，亦可酿酒。木材坚致，耐海水，适作车辆、造船、建筑、板料、家具用材。

果实疏风止咳，消滞止痒；治咳嗽，消化不良，皮炎湿疹，水肿，疝气。叶、树皮产黄色染料。优良行道树。

扁桃

M. silvatica Roxb.

左、右江各地最为普遍，野生或栽培。

用途参阅芒果。

泌脂藤☆

Pegia bijuga H.-M.

龙州、靖西、田林、隆林、东兰、天峨、河池。

脉果漆☆ 利黄藤

Phlebochiton sinense Diels

大明山、大新、崇左、天等等地。

全株治黄疸肝炎；叶治蛇伤，风湿，拔子弹。

黄连木 石山漆、楷木

Pistacia chinensis Bunge

桂北、桂西为多。

种子油可制肥皂、润滑油，点灯。木材坚重，供建筑、农具、家具、枕木、雕刻用。果、树皮、叶可提制栲胶。叶含芳香油。

根、枝、叶、皮可制农药，杀各种水稻害虫。嫩叶代茶，叫黄鹂茶或黄儿茶。

细叶楷木

P. weinmannifolia J. Poiss.

贵县、邕宁、武鸣、大新、龙州、那坡、靖西、田阳、凤山、都安。

根、叶治流感，眼痛，头疮。叶含芳香油。

盐肤木 五倍子树、盐酸树

Rhus chinensis Mill.

(*R. semialata* Merr.)

区内各地。

根、果、叶、虫瘿入药，敛肺涩肠，止血消汗，凉血解毒，活血散瘀；治中耳炎，痢疾，蛇伤，咳嗽，咯血，崩漏，脱肛，火伤，白口疮，无名肿毒，盗汗，腹泻。五倍子虫寄生在枝叶上，形成虫瘿，即五倍子，可作收敛剂和生物碱中毒的解毒药，提制鞣酸、墨水和黑色染料，也用于塑料工业。树皮亦含鞣酸。种子油制肥皂、润滑油。树脂作油漆原料。叶煮液作土农药，防治棉蚜、稻苞虫、蔬菜害虫。根煮液防治水稻害虫。嫩果味酸，可泡水代醋，故又称盐酸树。叶作绿肥。

滨盐肤木 盐霜白

R. chinensis Mill.

var. *roxburghiana* (DC.) Rehd.

苍梧、昭平、大苗山、大瑶山、永福、龙胜、临桂、资源、武鸣、龙州、德保、那坡、乐业。

亦产五倍子。根、叶凉血降火，去瘀生新，消肿止痛；治麻疹，咳嗽咯血，跌打骨折，风湿关节炎，喉炎，化脓性炎症，胃

痛，蛇伤。花、果治口腔糜烂。

野漆树

R. succedanea L.

区内各地。

叶、果、根清热解毒，散瘀生肌，利尿通淋；治尿血，血崩，白带，外伤出血，子宫下垂。种子油制肥皂，或掺合干性油作油漆。果皮的蜡质为膏药、蜡纸、蜡烛、香膏等原料。树干可割取漆液，代生漆用，涂漆烟杆、烟袋等器物（见于桂北山区）。树皮和枝可提栲胶。木材为细工用材。叶、根作农药，参阅盐肤木。有人接触本种树液或枝叶，易生漆疮。

山漆树

R. silvestris S. et Z.

区内各地。

种子油可制肥皂、油墨和油漆。叶止血。果治毒蛇伤。叶、根作土农药，参阅盐肤木。用时勿触及皮肤，以免生漆疮。

漆树

R. verniciflua Stokes

桂北。龙胜、兴安、隆林等地有零星栽培。

从树干割取的生漆，是优良的防腐、防锈涂料，耐酸，耐碱，耐醇，耐高温，用于涂漆建筑、家具、器具、电线、广播器材等。种子油可制高级香皂、香脂、油墨、蜡烛等，也可掺合油漆使用，可作灯油。果蜡可制蜡烛、蜡纸。叶可提制栲胶。使用时宜慎，有些人对漆过敏，易生漆疮。

206 牛 栓 藤 科 CONNARACEAE

滇桂牛栓藤

Connarus tonkinensis H.Lec.

靖西、那坡、大新、龙州。

Santalodes-Carya

红叶藤 牛栓藤、牛见愁、荔枝藤

Santalodes microphyllum Hk. et Arn.

(*Rourea microphylla* Pl.)

灵川、龙州、宁明、扶绥、邕宁、横县、武鸣、南宁、百色、那坡、贵县、博白、平南、陆川、容县、梧州、苍梧、藤县、大瑶山。

藤可制绳索，常用以做犁缆，套牛鼻，作牛鞭。叶外敷，埋口生肌，收敛止血；治跌打，刀伤。果可食。

大叶红叶藤

S. roxburghii (Hk. et Arn.) O Ktze.

(*Rourea millettii* Pl.)

靖西、苍梧、贺县、容县、大瑶山、横县、龙州、扶绥、都安。
藤可制绳索。

207 胡桃科 JUGLANDACEAE

喙嘴核桃

Annamocarya sinensis (Dode) Leroy

(*Rhamphocarya integrifoliolata* Kuang)

永福、隆林。

用材。种子油工业用。

山核桃

Carya cathayensis Sarg.

隆林、大苗山、融安。

材质重，少开裂，供建筑、车轮、农械等用。种子可食及制糕饼，果壳制活性炭。

青钱柳

Cyclocarya paliurus (Batal.) Iljinsk.

(*Pterocarya paliurus* Batal.)

乐业、东兰、大苗山、永福。

黄杞

Engelhardtia chrysolepis Hance

区内各地。

木材轻软，富弹性，但不耐腐，可作家具、用具。树皮可提单宁及制人造纤维。叶、树皮防治农业害虫。

短翅黄杞 山马劣树

E. colebrookiana Lindl.

隆林、百色、田林、平果、那坡、东兰、河池。

木材用途同上。

穗序黄杞 云南黄杞

E. spicata Bl.

德保、那坡、靖西、百色、凌云、田阳。

木材用途参阅黄杞。树皮可提制栲胶。茎皮纤维制绳索。

华核桃 野核桃

Juglans cathayensis Dode

凌云、乐业、隆林、阳朔、龙胜。

种子油供食用，制肥皂及润滑油等用。果仁生食或配制糕点。木材可作枪托等军工用材。树皮和外果壳可提制栲胶。茎皮纤维造纸及制人造棉。

● **核桃** 胡桃

J. regia L.

天峨、乐业、凌云、隆林、田林、桂林。

种仁生食或加工为高级食品，配制糕点或配菜佐膳。仁含油率高。

Platycarya-Roiptelea

榨油供食用，又宜配制绘画油料。其他用途参阅华核桃。

小化香树☆

Platycarya glandulosa Chun, ined.

隆林、田林、西林、靖西、凌云、田阳、龙州、全州、桂林、临桂。

木材宜制火柴杆。树皮提制栲胶。烧老木可驱蚊。

长化香树☆

P. longipes Wu

临桂、凌云、隆林。

化香树

P. strobilacea S. et Z.

田阳、隆林、凌云、桂林、临桂、灵川、兴安、龙胜。

木材宜制火柴杆和器具等物。树皮、根皮、叶和果实为良好栲胶

原料。茎皮纤维代麻用。根和老木提芳香油作调香原料。叶作

土农药。花制黄色染料。叶饲茶虫。果实散郁气；治胃病。叶

解毒消肿；治头疮，无名肿毒。烧老木可驱蚊。

枫杨

Pterocarya stenoptera C.DC.

区内各地，桂北较多。

木材制火柴杆、家具、用具。叶和树皮制粉剂、溶剂治棉蚜虫，

地老虎等。种子油制肥皂及润滑油。树皮提制栲胶，制染料染

渔网。茎皮纤维代麻，造纸或人造棉。根、叶杀虫止痒；治血

吸虫病，脚癣，痈疮。为紫胶虫寄主树之一。

207A 马尾树科 RHOIPTELEACEAE

马尾树 漆榆

Roiptelea chiliantha Diels et H.-M.

大苗山、融安、临桂、龙胜、兴安、那坡、田林、凌云、乐业、

百色。

树皮、叶提栲胶。树干可培养香菌。

209 山茱萸科 CORNACEAE

桃叶珊瑚 野蓝靛

Aucuba chinensis Benth.

临桂、龙胜、上思、大苗山、那坡。

叶治跌打，止痛。

狭桃叶珊瑚☆

A. chinensis Benth.

forma angustifolia Rehd.

龙胜、临桂。

纤尾桃叶珊瑚

A. filicauda Chun et How

龙胜、临桂。

灯台树 狗骨木、伞把树、米杯（壮音）

Cornus controversa Hemsl.

临桂、龙胜、兴安、资源、永福、大瑶山、大苗山、凌云、乐业、南丹。

木材坚硬，可作油榨楔木、建筑、器具、雕刻等用材。果可鲜

食，亦可酿酒。树皮提制栲胶。种子油制肥皂和润滑油。

★山茱萸 枣皮、萸肉

C. officinalis S. et Z.

分布于华中、华北，我区有引种。

果实补肝肾，涩精，止汗。治腰膝痠痛，眩晕耳鸣，阳萎遗精，

小便频数，月经过多，虚汗不止等。

贵州楝木。

C. parviflora Chien

南丹、凌云。

茎皮纤维造纸，搓绳。树皮提制栲胶。种子油工业用。全株清热
解毒。

小株木

C. paucinervis Hance

天峨、南丹、隆林、柳城。

鄂西株木 万吉滑

C. wilsoniana Wanger.

桂林、临桂。

狭叶四照花 山荔枝

Dendrobenthamia angustata (Chun) Fang

全州、兴安、临桂、资源、大瑶山、大苗山。

褐毛四照花

D. ferruginea (Wu) Fang

大瑶山。

果可食。

香港四照花 癞杨梅、山荔枝

D. hongkongensis (Hemsl.) Hutch.

(*Cornus hongkongensis* Hemsl.)

各地林区。

果可食。

华青荚叶

Helwingia chinensis Batalin

南丹、凌云、大苗山。

叶清热除湿；治痢疾，便血，落胎。果治胃病。嫩叶可食，并可
焙制茶叶作饮料。嫩枝、叶作饲料。

钝齿华青荚叶

H. chinensis Batalin

var. *crenata* Fang

龙胜。

西南青荚叶☆

H. himalaica Hk.f. et Thoms.

罗城、凌云、隆林、全州。

青荚叶

H. japonica (Thb.) Dietr.

资源、龙胜、隆林。

叶清热除湿；治痢疾，便血，落胎；果治胃病。

210 八角枫科 ALANGIACEAE

八角枫 华瓜木

Alangium chinense (Lour.) Harms

区内各地。

木材轻软，可制家具。叶作饲料。根皮有毒，散瘀止痛；治麻痹，风湿性关节炎，跌打。

全州八角枫

A. chungii H.L.Li

全州。

西南八角枫 小黄花树

A. faberi Oliv.

全州、兴安、临桂、龙胜、大瑶山、大苗山、苍梧、东兰、南丹、罗城。

叶治跌打。

Alangium-Camptotheca

阔叶西南八角枫

A. faberi Oliv.

var. *platyphyllum* Chun et How

十万大山、大瑶山。

根行气去湿；治胃病。

毛八角枫

A. kurzii Craib

(*A. kwangsiense* Melch,

A. tomentosum (Bl) H-M)

天峨、大苗山、大瑶山、上林、武鸣、大明山、龙州、苍梧、梧州。

用途参阅八角枫。

广西八角枫 瓜木、猪耳桐

A. platanifolium (S. et Z) Harms

桂北。

树皮提制栲胶。茎皮纤维造纸，制人造棉。

圆叶八角枫

A. rotundifolium (Hassk.) Bloemb.

var. *laxifolium* Wu

大瑶山。

211 紫 树 科 NYSSACEAE

喜树 水桐树、旱莲

Camptotheca acuminata Decne.

凤山、南丹、河池、罗城、隆林、凌云、靖西、德保、大瑶山、

桂林、临桂、兴安。

木材宜供造纸、制用具等用。根皮、果有毒，含喜树碱，抗癌；

治白血病，胃癌，风湿关节痛。

广西紫树

Nyssa chieniana Fang et Soong

十万大山。

华南紫树

N. javanica (Bl.) Wanger.

十万大山。

紫树

N. sinensis Oliv.

临桂、全州、兴安、龙胜、资源、大苗山、大瑶山、罗城、凤山、
凌云、隆林、十万大山。

木材作舟车、家具、建筑等用材。

212 五 加 科 ARALIACEAE

萸叶五加

Acanthopanax evodiaefolius Fr.

临桂、资源、兴安、象州、大瑶山。

细柄萸叶五加

A. evodiaefolius Fr.

var. *gracilis* W.W.Sm.

十万大山、大瑶山、大明山、资源、兴安、临桂。

五加 细柱五加

A. gracilistylus W.W.Sm.

临桂、兴安、全州、靖西。

根皮祛风湿，壮筋骨；治风湿骨痛，跌打损伤，腰肌劳伤，阳萎，
脚气，阴囊湿疹。枝叶作农药治棉蚜虫、地老虎等。嫩叶可作
蔬菜。全株提芳香油作食品调香原料。

节花五加

A. gracilistylus W.W.Sm.

var. *nodiflorus* (Dunn) H.L Li

扶绥。

三叶五加 白花鞑、三爪风、白鞑

A. trifoliatum (L.) Merr.

兴安、临桂、恭城、大瑶山、柳州、容县、北流、平南、陆川、
田林、隆林、乐业。

根、叶祛风除湿，散瘀止痛；治风湿跌打，刀伤骨折，咳嗽胸痛，

尿路结石，疮疡疖肿等。全株亦可提芳香油作食品调香原料。

刺毛三叶五加

A. trifoliatum (L.) Merr.

var. *setosum* H.L Li

十万大山、百色、隆林、龙胜、兴安。

根皮及茎皮祛风除湿；治风湿脚气，腰膝疼痛，阳萎，阴囊湿痒。

广东槲木

Aralia armata (Wall.) Seem.

龙州、上思、百色。

根皮散瘀消肿，祛风除湿；治跌打损伤，风湿骨痛，肝炎，肾炎，

疔疮疖肿，痢疾，白带等。

拟厚叶槲木

A. chinensis L

var. *dasyphylloides* H.-M.

桂林尧山、临桂、贺县。

光叶槲木☆

A. chinensis L.

var. *nuda* Nakai

凌云、龙胜。

根皮清热利湿，解毒止痛；治咳嗽，疮毒，淋浊带下，血崩，眼生翳膜，蛇伤，犬伤。

心叶榕木 土当归、水白芷、九眼独活

A. cordata Thb.

大苗山、资源、龙胜。

根治风湿疼痛，腰膝痠痛，四肢萎痹，鹤膝风，目眩，牙痛等。

厚叶榕木☆

A. dasyphylla Miq.

龙胜、大瑶山、象州、那坡、隆林、宁明。

鸟不企

A. decaisneana Hance

十万大山、宁明、龙州、武鸣、柳城。

根祛风除湿，散瘀消肿；治风湿腰腿痛，急慢性肝炎，跌打损伤，肾炎水肿。亦作兽药用。

刺茎榕木

A. echinocaulis H.-M.

临桂、灵川、凌云、资源。

秀丽榕木

A. elegans Ho

平南、大瑶山。

小叶榕木

A. foliolosa (Wall.) Seem.

桂西南。

刺叶榕木

A. spinifolia Merr.

临桂、梧州、大瑶山。

Aralia-Brassaiopsis

根驳骨解毒；治头昏头痛，吐血，血崩，风湿，跌打，蛇伤。

波叶榕木

A. undulata H.-M.

凌云、龙州、龙胜。

狭叶掌叶树☆

Brassaiopsis angustiloba (Hu) Hoo

大苗山、大瑶山。

睫毛掌叶树

B. ciliata Dunn

凌云、隆林、龙胜。

黄毛掌叶树

B. ferruginea (Li) Hoo

(*Dendropanax ferrugineus* Li)

大瑶山、大苗山、龙胜、隆林、贺县。

掌叶树 刺鸭脚

B. glomerulata (Bl.) Regel.

龙胜、上思、大瑶山、平南、宁明、龙州、隆林。

根和树皮祛风活络，补肝肾，强筋骨；治骨折，扭挫伤，风湿关节痛，腰肌劳损。叶治牛脱臼。

长花柄掌叶树

B. glomerulata (Bl.) Regel.

var. *longipedicellata* H.L Li

大瑶山、龙州、宁明、靖西、凌云。

细弱掌叶树

B. gracilis H.-M.

乐业。

广西掌叶树☆

B. kwangsiensis Hoo

凌云。

显脉掌叶树☆

B. phanerophlebia (Merr et Chun) Ho

(*Acanthopanax phanerophlebia* Merr et Chun)

大瑶山、容县。

栎叶掌叶树

B. quercifolia Hoo

阳朔。

尖苞掌叶树☆

B. spinibracteata Hoo

隆林。

长尖叶木五加

Dendropanax acuminatissimus Merr.

苍梧、容县、大瑶山。

全株祛风除湿。

狭瓣木五加

D. angustilobus (Hu) Merr.

上思、隆林。

双室木五加

D. bilocularis Ho

容县、大瑶山。

枫桐桂 阴阳枫

D. chevalieri (Vig) Merr.

Dendropanax

资源、临桂、龙胜、恭城、阳朔、兴安、贺县、大明山、象州、大苗山、玉林、乐业。

根和树皮驱风湿，通经络，散瘀血，壮筋骨；治风湿骨痛，瘫痪，扭挫伤，痈，疖等。

齿叶枫桐桂

D. chevalieri (Vig.) Merr.

var. *dentigerus* (Harms) H.L.Li

临桂、大瑶山。

密花木五加

D. confertus H.L.Li

大瑶山、临桂。

细梗木五加☆

D. gracilis Tseng et Hoo

十万大山。

海南木五加

D. hainanensis (Merr. et Chun) Chun

十万大山、龙州、凌云、百色、大瑶山、大苗山、象州、临桂、龙胜、兴安、贺县、平南。

培养香茵树种。

胀果木五加

D. inflatus H.L.Li

凌云。

广西木五加

D. kwangsiensis H.L.Li

十万大山。

大果木五加

D. macrocarpus Ho

那坡、武鸣。

假小花木五加

D. parvifloroides Ho

龙州。

小花木五加

D. parviflorus (Champ.) Benth.

武鸣、大瑶山。

三层楼 半枫荷

D. proteus (Champ.) Benth.

十万大山、大明山、容县、平南。

根祛风除湿，活血通络；治风湿痹痛，腰肌劳损，跌打瘀积肿痛，
产后风瘫，疮毒。

星花木五加

D. stellatus H.L.Li

龙州。

大果五加 马蹄蕨、野枇杷

Diplopanax stachyanthus H.-M.

上思、十万大山、大明山、大瑶山、大苗山、融安、罗城、龙
胜。

材用。

常春藤

Hedera nepalensis K.Koch

var. *sinensis* (Tobler) Rehd.

乐业、龙胜、桂林、永福、临桂、全州、容县、贵县。
全株舒筋散风；治肚痛，咳嗽、风湿。

短柄幌伞枫

Heteropanax brevipedicellatus H.L.Li

上思、平南、大瑶山、阳朔、临桂、永福、大明山。

根和树皮治跌打损伤，烫火伤，疮毒。

华幌伞枫

H. chinensis (Dunn) H.L.Li

十万大山。

根和树皮治疗疮，跌打。

幌伞枫 阿婆伞、凉伞木、五加通、大蛇药

H. fragrans (Roxb.) Seem.

百色、龙州。

根皮凉血解毒，消肿止血；治烧伤，脓疮，疖肿，无名肿毒，

骨髓炎，骨折，扭挫伤，蛇伤，风热感冒。髓心利尿。

刺楸 百鸟不落

Kalopanax pictus (Thb.) Nakai

临桂、阳朔、龙胜。

木材供建筑、船舰、车辆等用材。根清热除湿，止痛生肌；治骨

折，湿热疼痛，周身浮肿。皮代中药海桐皮治赤白痢，风湿痛，

脚气，疮疥。树皮和叶提制栲胶。种子油制肥皂用。嫩叶可食。

节梗大蓨☆ 小五加

Macropanax rosthornii (Harms) Wu ex Hoo

(*Nothopanax rosthornii* Harms)

临桂、龙胜、隆林。

根、茎皮驱风除湿，化瘀生新；治骨折，风湿痛。

光缘大蓨

M. undulatus (Wall.) Seem.

龙州。

野三七 蜈蚣七、竹节三七、竹节人参

Panax noto-ginseng (Burk.) Hoo

(*P. pseudo-ginseng* auct., non Wall.,

Aralia quinquefolia A Gray

var. *notoginseng* Burk.)

兴安、全州、龙胜、资源、临桂、灵川、大苗山。

医药用途同田七。

★田七 三七、田州三七

P. sanchi Hoo, ms.

靖西、德保、那坡、田东等地。

根茎止血散瘀，消肿止痛；治跌打损伤，肿痛，出血，吐血，衄血，便血，子宫出血，经闭症瘕，产后瘀阻腹痛，以及痈疽疮肿等症。

七叶莲 七加皮、鹅掌藤

Schefflera arboricola Hayata

本区南部较多，永福、鹿寨、荔浦、临桂，也有分布。

全株舒筋活络，消肿止痛；治风湿骨痛，跌打损伤，瘫痪，胃痛。

川黔鸭脚木☆

S. bodinieri (Lévl.) Rehd.

凌云、乐业。

绒毛鸭脚木☆ 大加皮

S. delavayi (Fr.) Harms

(*S. delavayi* Fr.

var. *ochrascens* (H.-M.) Ho

S. discolor Merr.)

龙胜、兴安、临桂、容县、苍梧、大瑶山、田林、凌云。

根、皮祛风活络，强筋骨，补肝肾；治骨折，扭伤，风湿骨痛，

Schefflera

腰肌劳损。

团花鸭脚木

S. glomerulata H.L.Li

百色、靖西、隆林、龙州、上林、凤山、平南、临桂、永福。

白叶鸭脚木

S. hypoleuca (Kurz) Harms

大瑶山、田林、凌云。

根、皮消肿止痛；治骨折，便秘，腹痛。

广西鸭脚木

S. kwangsiensis Merr. ex H.L.Li

十万大山、扶绥、大明山。

上思鸭脚木☆

S. metcalfiana Merr. ex H.L.Li

上思。

小星鸭脚木

S. minutistellata Merr. ex H.L.Li

大瑶山、龙胜、那坡、武鸣、大明山。

鸭脚木 鹅掌柴

S. octophylla (Lour.) Harms

区内各地。

木材宜制火柴杆、蒸笼、筛头及家具。全株作枳椇原料。树皮、嫩枝叶提取芳香油用于食品香精中。全株凉血解毒，散瘀消肿；治流感咽喉肿痛，风湿骨痛，跌打损伤，皮炎湿疹。根、茎皮作兽药治牛、猪斑痧大热，风湿筋骨痛，跌打肿痛，痈疮湿毒。蜜源植物。

密脉鸭脚木

S. venulosa (W. et A.) Harms

靖西、百色。

通脱木 五加通、大通、通草

Tetrapanax papyriferus (Hk) K Koch

融安、凌云、乐业。

茎髓清热利尿，散瘀下乳；治水肿，尿路感染，症瘕腹痛，月经不调，乳汁不下。

广叶参树

Trevesia palmata (Roxb.) Vis.

大明山、龙州、南丹。

叶治跌打。

212A 烂泥树科 TORRICELLIACEAE

烂泥树

Torricellia angulata Oliv.

隆林、田林。

绿肥用。

齿叶烂泥树☆ 烂泥巴树、接骨丹、懒茶叶

T. angulata Oliv.

var. *intermedia* (Harms) Hu

隆林、凌云、那坡、大苗山。

绿肥用。

213 伞形科 UMBELLIFERAE

芎藭

Anethum graveolens L.

果行气健胃，散瘀止血；治气胀，两胁痞满，小腹冷痛。果可提芳香油，作调合香精原料。

Angelica-Bupleurum

香白芷 柠檬香咸草、人参归

Angelica citriodora Hance

全州、临桂、桂林、柳州、柳江、大瑶山、平南、桂平、贵县、玉林、博白等地。

根止血活血，散瘀消肿，行气止痛；治鼻衄，咳嗽咯血，肝硬化腹水，胃痛，风湿关节痛，跌打，闭经。

*白芷

A. dahurica Benth. et Hk.

桂林、昭平、南宁等地。

根祛风止痛，发表；治感冒头痛，眉棱骨痛，鼻窦头胀痛，疮疖脓肿痛，蛇伤，白带。种子、根含芳香油。种子含脂肪油。

柔毛当归 香独活

A. pubescens Maxim.

全州。

根祛风止痛；治风湿关节痛，腰膝痠痛，感冒风寒头痛，疮疖肿痛。

*芹菜

Apium graveolens L.

蔬菜。全草治高血压，根治气管炎。果可提芳香油，可调合香精，用于食品、香皂、香脂等。

柴胡 南柴胡、竹叶柴胡

Bupleurum falcatum L.

永福、桂林、龙胜、资源、全州、大瑶山，武鸣。

全草发表退热，疏肝解郁，调经；治感冒发热，疟疾，月经不调，子宫下垂，肝炎，原发性非典型肝炎，胸胁痛。种子含脂肪油。

● 南柴胡 狭叶柴胡

B. scorzoneraefolium Willd.

我区有引种。

根、全草疏肝解郁，升阳举陷，发表和里；治肝郁不舒，胸胁胀痛，感冒，寒热阵发，头眩呕吐，疟疾，月经不调，中气下陷，久泻脱肛，子宫下坠等。

崩大碗 积雪草、雷公根、灯盏菜

Centella asiatica (L.) Urb.

区内各地。

全草清热解毒，凉血，消炎；治感冒，扁桃体炎，肝炎，尿路感染，解断肠草、木薯、毒蕈中毒；又可作凉茶。作农药，可防治蚜虫和菜青虫。作兽药，治家畜大热症，暑症，尿少，疮痍疗毒，跌打，蛇伤，鼠咬，牛、猪皮肤痒疹。

蛇床子

Cnidium monnieri (L.) Cuss.

(*Selinum monnieri* L.)

桂林、龙胜、梧州、大苗山、河池、隆林。

果温肾壮阳，燥湿杀虫；治阴道滴虫，皮肤及阴囊湿疹，子宫下垂，宫寒不孕，阳萎，白带。果可提取芳香油，配制香精。种子含脂肪油。作农药，果水浸或煮液可防治小麦和玉米蚜虫、红蜘蛛，可抑制红薯黑斑病、稻斑病等孢子发芽。

● 芫荽

Coriandrum sativum L.

区内各地。

蔬菜。全草、种子发表透疹，散寒理气；治麻疹、痘疹不透，胸胁满闷，食积不消，外治牙痛，脱肛。果可提制芳香油，有二氢茉莉酮气味，可调制香精。又含脂肪油，可作肥皂、油酸原料。

Cryptotaenia-Hydrocotyle

鸭儿芹 鸭脚板

Cryptotaenia canadensis (L.) DC.

var. *japonica* (Hassk.) Mak.

(*C. japonica* Hassk.)

临桂、龙胜、大苗山、大瑶山、南丹、东兰、龙州等地。

根或全草发表散寒，温肺止咳；治风寒感冒，寒咳，尿闭。

• 胡萝卜 红萝卜

Daucus carota L.

var. *sativa* DC.

区内各地。

根作蔬菜。又可提取胡萝卜素。种子治虫积腹痛，腹泻，慢性痢疾。果可提芳香油，作调香原料。

刺芫荽 洋芫荽、香芫荽

Eryngium foetidum L.

玉林、梧州、贺县、桂林、大瑶山、武鸣、南宁等地。

全草疏风除热，芳香健胃；治感冒，胸痛，消化不良，肠炎腹泻，蛇伤。又作食用香料。

• 茴香 小茴香

Foeniculum vulgare Mill.

区内各地。

种子理气开胃；治胃痛，脘腹胀满。根、叶治风湿痛，疝气痛。

蔬菜。果含芳香油，可作食品调味的香料，配制酒、糖果、牙膏、牙粉等香精用。

红马蹄草

Hydrocotyle nepalensis Hk.

(*H. javanica* auct., non Thb.)

区内各地。

全草清凉解热，散瘀消肿；治吐血，咳嗽，跌打，腹痛，湿疹。
闹鱼。

天胡荽 满天星、盆上芫荽

H. sibthorpioides Lam.

区内各地。

全草清热利尿，散瘀消肿；治黄疸肝炎，感冒发热，尿路结石，
疖肿，结膜炎。

破铜钱 花边灯盏

H. sibthorpioides Lam.

var. *batrachium* (Hance) H.-M.

(*H. rotundifolia* auct., non Roxb.)

区内各地。

用途参阅天胡荽。

肾叶天胡荽 小灯盏、鱼藤草

H. wilfordii Maxim.

兴安、全州、龙胜、临桂、大苗山、柳州、贺县。

闹鱼。

藁本 川香(广西)、西芎

Ligusticum sinense Oliv.

全州、资源、兴安、龙胜、大苗山、乐业。

全草或根茎发散风寒，祛风止痛；治风寒感冒，发热头痛，巅顶
痛，身疼，腹痛，泄泻。果实和根含芳香油，可作调香原料。

●川芎

L. wallichii Fr.

大瑶山、大苗山、乐业。

根茎活血行气，祛风止痛；治月经不调，偏正头痛，头风眩晕，
胸胁作痛，疮疡肿痛。

Oenanthe-Peucedanum

少花水芹

Oenanthe benghalensis Benth et Hk.f.

区内各地。

水芹

O. decumbens (Thb.) K.-Pol.

(*O. javanica* DC.,

O. stolonifera (Roxb.) Wall. ex DC.)

区内各地。

可充蔬菜。全草治头目眩晕，肾虚浮肿。

野芹

O. sinensis Dunn

(*O. stolonifera* (Roxb) Wall. ex DC.

forma elongata Metc.)

区内各地。

猪饲料。

前胡 紫花前胡

Peucedanum decursivum (Miq.) Maxim.

区内各地。

根发散风热，降气祛痰；治感冒发热，咳嗽，痰稠，胸闷不适，

外敷疮疖肿毒。果含芳香油，为香精原料。根作兽药，治家畜

外感，风热咳嗽，痰多气喘。

白花前胡

P. praeruptorum Dunn

桂北、昭平、贵县等地。

根发散风热，降气止咳；治感冒咳嗽，咽喉肿痛，胸胁胀满。果

含芳香油，供香精用。

鹅脚板

Pimpinella diversifolia (Wall) DC.

柳州、桂林。

根、全草消肿止痛，祛风散寒；治大蜂刺伤后疼痛，蛇伤，感冒，胃痛，痢疾，外敷手腕脉上治疟疾。果含芳香油，有茴香的香气，可作调香原料。

江西肿瓣芹☆

Pternopetalum kiangsiense (Wolff) H.-M.

资源、兴安、龙胜、大苗山、大瑶山。

入地蛇

P. nudicaule (de Boiss.) H.-M.

var. *esetosum* H.-M.

桂北。

山芹菜☆

Sanicula chinensis Bunge

全州、资源、龙胜、东兰。

蒙自山芹菜☆

S. henryi Wolff

桂西北。

掌脉山芹菜 肺筋草

S. lamelligera Hance

兴安、龙胜、临桂、大苗山、容县。

全草润肺止咳，清热解表，行血调经；治感冒咳嗽，劳伤咳嗽，月经不调，小儿脐风。

直刺山芹菜

S. orthacantha S.Moore

全州、大苗山、隆林。

窃衣

Torilis anthriscus (L.) Gmel.

全州、临桂、柳州、罗城、天峨、乐业、隆林等地。
果能驱蛔虫，外用作消炎药，又含芳香油。

214 山 柳 科 CLETHRACEAE

小山柳☆

Clethra bodinieri Lévl.

十万大山、大瑶山、大苗山、凌云。

小叶山柳

C. bodinieri Lévl.

var. *parvifolia* S.Y.Hu

上思。

萍乡山柳☆

C. brammeriana H.-M.

大苗山、全州。

华中山柳☆

C. cavaleriei Lévl.

凌云、大明山、大瑶山、昭平、永福、荔浦、灵川、龙胜、兴安、全州。

贵州山柳☆

C. esquirolii Lévl.

兴安、龙胜、贺县、大苗山、田林。

山柳

C. fabri Hance

(*C. liangii* H.L.Li)

十万大山、武鸣、扶绥、龙州、靖西、田林、凌云。

嘉宝山柳

C. kaipoensis Lévl.

兴安、龙胜、临桂、永福、大苗山、宜山。

根、叶祛风镇痛；治风湿关节痛。

广西山柳

C. kwangsiensis S.Y.Hu

资源、全州。

平伐山柳

C. pinfaensis Lévl.

大苗山、凌云。

多脉山柳

C. polyneura H.L.Li

凌云、阳朔、灵川、龙胜、兴安、恭城。

云南山柳☆

C. smithiana Fang

凌云。

215 杜鹃花科 ERICACEAE

广东假吊钟

Craibiodendron kwangtungense S.Y.Hu

十万大山、北流。

矮假吊钟

C. kwangtungense S.Y.Hu

var. *frutescens* S.Y.Hu

十万大山。

假吊钟 火炭木、厚皮树

C. stellatum (Pierre) W.W.Sm.

Enkianthus-Gaultheria

龙州、靖西、德保、平果、田林、那坡、百色、凌云、乐业、隆林、凤山、南丹、都安、巴马、梧州。

叶有毒，舒筋活络；治风湿，跌打，瘫痪。树皮可提制栲胶。防火林带树种。

灯笼树

Enkianthus chinensis Fr.

全州、资源、灌阳、兴安、龙胜、大瑶山、大苗山、大明山。

少花吊钟

E. pauciflorus Wils.

大瑶山。

吊钟花

E. quinqueflorus Lour.

容县、贺县、大瑶山、临桂、龙胜、全州、十万大山、大明山、大新。

绿化花木；广州等地，在农历春节时，常用作大型瓶花。

晚花吊钟

E. serotina Chun et Fang

龙胜、临桂、大苗山、大瑶山、凌云、隆林、德保、大明山。

细齿吊钟

E. serrulatus (Wils.) Schneid.

临桂、龙胜、灌阳、大苗山、大瑶山、罗城、容县。

满山香 白珠木

Gaultheria yunnanensis (Fr.) Rehd.

(*G. laxiflora* Diels,

Vaccinium yunnanensis Fr.)

昭平、永福、临桂、龙胜、兴安、恭城、资源、全州、大苗山、大瑶山、罗城、南丹、凌云、乐业、田林、隆林、那坡、大明山、马山。

全株或根祛风除湿，活血散瘀；治风湿，跌打，骨折，脉管炎，闭经，劳伤，感冒，水肿，疮疡。枝、叶可提取芳香油，主要成分为水杨酸甲脂，供调配牙膏、牙粉、食用香精。

硬毛满山香☆ 硬毛滇白珠

G. yunnanensis (Fr) Rehd.

var. *hirsuta* D.Fang et N K Liang, ined.

桂平。

宽叶南烛☆

Lyonia doyonensis H.-M.

隆林、那坡。

美丽南烛

L. formosa (Wall) H.-M.

全州、资源、灌阳、恭城、兴安、龙胜、灵川、临桂、大苗山、凌云、田林。

粉绿南烛☆

L. glaucoides Chun

大瑶山。

南烛 泪木

L. ovalifolia (Wall) Drude

全州、资源、临桂、永福、大苗山、大瑶山、田林、隆林、那坡、十万大山等地。

叶有毒。根、叶收敛止泻，强筋，强壮益气。茎、叶的液汁可作染料。

椭圆叶南烛

L. ovalifolia (Wall.) Drude

var. *elliptica* (S. et Z.) H.-M.

临桂、龙胜、兴安、隆林、大瑶山、十万大山等地。

剑叶南烛

L. ovalifolia (Wall.) Drude
var. *lanceolata* (Rehd.) H.-M.

全州、临桂、永福、大瑶山、南丹、东兰、凌云、乐业、靖西、
大明山、横县、玉林等地。

红脉南烛

L. rubrovenia (Merr.) Chun
宁明、那坡、凌云。

安徽杜鹃(注)

Rhododendron anhweiense Wils.
资源、兴安。

石壁杜鹃☆ 石壁柴

R. bachii Lévl.
兴安、龙胜、灵川、临桂、阳朔、大苗山等地。

短脉杜鹃

R. brevinerve Chun et Fang
资源、兴安、龙胜、临桂、大苗山、大瑶山、靖西、田林。

心型杜鹃

R. cardiobasis Sleum.
全州、资源、兴安、龙胜、大苗山、大瑶山、横县。

羊角杜鹃☆ 羊角柴

R. cavaleriei Lévl.
全州、资源、灌阳、兴安、龙胜、大瑶山、容县。

太平杜鹃 广东杜鹃

R. championae Hk.
大瑶山、大苗山、恭城。

注：本属植物的花美丽，多可供庭园绿化用。有些种类还可供药用。

红滩杜鹃

R. chihsinianum Chun et Fang

龙胜、资源、大苗山。

金萼杜鹃

R. chrysocalyx Lévl. et Van.

十万大山。

花坪杜鹃

R. chunnienii Chun et Fang

龙胜、临桂、兴安、灌阳、资源、全州、大苗山、大瑶山。

苍山杜鹃

R. delavayi Fr.

隆林。

花有小毒，清热，拔毒，止血，调经；治骨髓炎，消化道出血，衄血，咯血，月经不调。

信宜杜鹃

R. faithae Chun

容县、大瑶山、大苗山。

华丽杜鹃

R. farrerae Tate

龙胜、临桂、阳朔、大明山。

天目杜鹃

R. fortunei Lindl.

全州、资源、兴安、临桂、容县。

血色杜鹃

R. haematodes Fr.

大瑶山。

Rhododendron

海南杜鹃

R. hainanensis Merr.

十万大山。

蒙自杜鹃

R. hancockii Hemsl.

十万大山、凌云、乐业。

红岩杜鹃

R. haofui Chun et Fang

资源、兴安、龙胜、大苗山、大瑶山、田林。

罗浮杜鹃

R. henryi Hance

凌云、乐业、田林、南丹、十万大山。

古陈杜鹃

R. kuchunense Chun

大瑶山。

广福杜鹃

R. kwangfuense Chun et Fang

龙胜、大苗山。

广西杜鹃

R. kwangsiense Hu

龙胜、大苗山、大瑶山、凌云、乐业。

广东杜鹃

R. kwangtungense Merr. et Chun

桂林、阳朔、兴安、罗城。

岩杜鹃

R. latoucheae Fr.

全州、苍梧、十万大山、那坡。

北江杜鹃

R. levinei Merr.

全州、资源、灌阳、兴安、大瑶山。

百合杜鹃

R. liliiflorum Lévl.

全州、兴安、大瑶山、那坡。

岭南杜鹃

R. mariae Hance

全州、兴安、龙胜、临桂、大苗山、大瑶山、南丹、东兰、凌云、田林、靖西、容县、陆川、龙州。

根皮清凉解热，止咳祛痰；治慢性气管炎。

满山红

R. mariesii Hemsl.

全州、资源、兴安、灵川、临桂、大瑶山。

小杜鹃

R. microphyton Fr.

大瑶山。

细花杜鹃

R. minutiflorum Hu

灌阳、龙胜、灵川、临桂、大苗山、罗城、贺县、横县、马山、大明山、隆林。

黄杜鹃 羊躑躅、闹羊花、闹头花、毛老虎、三钱三

R. molle (Bl.) G Don

桂北。

根、花、果有大毒，入药，祛风除湿，散瘀消肿，麻醉止痛；治风湿，跌打，神经痛，疟疾，牙痛，疮疥。花煮液作农药，可杀地老虎、蝗虫、螟虫、蚜虫、青虫、椿象、猿叶虫、浮尘

Rhododendron

子、斜纹夜蛾等，又可杀蛆、臭虫，灭钉螺。庭园绿化植物。

白杜鹃

R. moultmainense Hk.

(*R. westlandii* Hemsl.)

区内各地。

圆叶杜鹃☆

R. orbiculare Decne.

(*R. rotundifolium* David)

全州、资源。

卵叶杜鹃 马银花

R. ovatum (Lindl.) Pl.

阳朔、永福、临桂、灵川、全州、大苗山、罗城。

根和水、酒、肉同煎，白糖冲服，可治白带下黄浊水。花可煮食。木材供细工用。

尖叶杜鹃

R. oxyphyllum Fr.

大明山、大新。

美艳杜鹃

R. pulchroides Chun et Fang

龙胜、大明山。

贵州杜鹃

R. rivulare H.-M.

恭城、龙胜、灵川、临桂、永福、大苗山、大瑶山、蒙山、贺县。

上林杜鹃

R. shufëniae Fang

大明山。

南华杜鹃

R. simiarum Hance

全州、资源、兴安、大苗山、大瑶山、大明山、扶绥、十万大山。

杜鹃花 映山红

R. simsii Pl.

区内各地。

全株、根、花行气活血，补虚；治内伤咳嗽，肾虚耳聋，月经不调，跌打疼痛，风湿，血崩，白带，吐血，痔血，衄血，乳痛，口疮，荨麻疹。叶、茎、皮都可提制栲胶。作兽药，用根或枝、叶止血，治便血，阴道流血。我国中南和西南地区的酸性土指示植物。花鲜红色，为有名的绿化植物。

爆仗杜鹃

R. spinuliferum Fr.

隆林。

越桔杜鹃

R. vaccinioides Hk.f.

十万大山。

变色杜鹃

R. versicolor Chun et Fang

龙胜、大明山。

武鸣杜鹃

R. wumingensis Fang

大明山。

瑶山杜鹃☆

R. yaoshanense Chun in herb.

那坡。

215A 鹿蹄草科 PYROLACEAE

雅致鹿蹄草

Pyrola elegantula Andr.

全州、兴安、灵川。

全草润肺止咳，祛风除湿，补虚敛汗；治咳嗽咯血，盗汗，百日咳，哮喘，劳伤骨痛，痈肿。

216 乌饭树科^(注) VACCINIACEAE

越桔爱花

Agapetes vaccinioides Dunn

靖西、大瑶山。

乌饭小蘗☆ 山小蘗

Hugeria japonica (Miq.) Nakai

var. *sinica* (Nak.) H.-M.

龙胜、大苗山。

乌饭树

Vaccinium bracteatum Thb.

全州、灌阳、龙胜、临桂、阳朔、永福、大苗山、容县、十万大山、大明山等地。

果、树皮强筋骨，益气力，固精，又治头痛，衄血。果味甜，可生食，又可熬糖、制果酱和酿酒。树皮可提制栲胶。

水泡乌饭树

V. bullatum (Dop) Sleum.

桂西南。

注：本科也叫石楠科、越橘科。

福建乌饭树

V. carlesii Dunn

临桂、永福、大瑶山、大明山。

粗脉乌饭树

V. crassivenium Sleum.

大瑶山。

尾叶乌饭树

V. dunnalianum Wight

var. *urophyllum* R. et W.

那坡。

镰叶乌饭树

V. falcatum Merr.

桂南。

缝萼乌饭树

V. fimbriicalyx Chun et Fang

龙胜。

广东乌饭树

V. hancockiae Merr.

容县。

鼠刺乌饭树

V. iteaphyllum Hance

兴安、龙胜、荔浦、临桂、大苗山、大瑶山、环江、南丹、东兰、凤山、凌云、乐业、田林、隆林、大明山、容县。

果可酿酒，又可生食。

广西乌饭树☆

V. kwangsiense Chun et Fang, ined.

灵川、大苗山、罗城。

Vaccinium

龙胜乌饭树☆

V. lungshengense Chun et Fang, ined.

龙胜。

壮叶乌饭树

V. pseudorobustum Sleum.

大瑶山。

根补血，壮身，去癆症。

厚叶乌饭树

V. robustum Chun, ined.

十万大山。

越桔

V. sinicum Sleum.

全州、资源、灌阳、兴安、龙胜、大瑶山。

米饭花

V. sprengelii (Don) Sleum.

(*V. mandarinorum* Diels,

V. donianum auct., non Wight)

全州、资源、兴安、灵川、临桂、大瑶山、十万大山、田林、隆林。

果实、叶散瘀消肿；治跌打，全身浮肿；又能拔弹，去砂。

假镰叶乌饭树

V. subfalcatum Merr. ex Sleum.

十万大山。

显脉乌饭树

V. supracostatum H.-M.

罗城。

瑶山乌饭树

V. yaoshanicum Sleum.

大瑶山。

218 水晶兰科 MONOTROPACEAE

水晶兰

Monotropa uniflora L.

龙胜、大苗山、大瑶山、大明山。

221 柿 科 EBENACEAE

小叶山柿 崖柿

Diospyros dumetorum W.W.Sm.

隆林、柳州、龙州。

乌材

D. eriantha Champ.

十万大山、龙州、梧州等地。

果可提柿漆。树皮可提栲胶。木材致密而硬，适作梁、柱、门、窗、机械器具，在海南岛亦用作牛栏建筑、车辕、家具等用材。

• 柿

D. kaki L.f.

区内各地。

果树。果可生食，又可制成柿饼或酿酒，也是木本粮食之一。果润肺止咳，生津，润肠。柿霜治咽喉痛，咳嗽咽干。柿漆降血压。宿萼（柿蒂）治呃逆。根清热凉血；治吐血，痔血，直肠出血。嫩果可制柿漆供制伞等用。嫩果和树皮可提制栲胶。木材细致轻软，供梁、柱、门窗、家具和木梳、装饰等用材。叶可作农药，杀害虫。作兽药，治牛红白痢。

野柿

D. kaki L f.

var. silvestris Mak.

龙胜、临桂、阳朔、平乐、大苗山、大瑶山、凌云、乐业、田林。
用途参阅柿。

龙胜柿☆

D. lungshengensis S.Lee, ined.

龙胜。

君迁子

D. lotus L.

全州、龙胜、临桂、大苗山、大瑶山、南丹。

果树。果亦可制糖，酿酒、醋。树皮和未成熟果实可提制栲胶。果实和叶可提制维生素丙，供食品和医药用。木材作各种用具、农具用材。种子油可制肥皂。叶可制农药，防治造桥虫、菜青虫、地老虎、瓢虫、棉蚜、孑孓等害虫。此树又可作嫁接柿树的砧木。

罗浮柿

D. morrisiana Hance

区内各地。

未成熟果实可制柿漆，作防水布和雨伞等涂料。茎皮、叶、果消炎解毒，收敛；治食物中毒，烫火伤，腹泻，赤白痢。木材可作家具、用具等用材。

洞柿 油柿

D. oleifera Cheng

临桂、恭城、阳朔、容县等地。

果树。用途参阅柿。

枚辣柿 山欖叶柿、米亚律（壮音）

D. siderophyllus H.L.Li

龙州、靖西等地。

未成熟果实可制柿漆。枝、叶作农药，防治菜青虫、地老虎等。

岭南柿

D. tutcheri Dunn

龙胜、大苗山、苍梧、容县。

叶可作绿肥和农药。

222 山榄科(赤铁科) SAPOTACEAE

●人心果

Achras zapota L.

桂南。

果生食或制成饮料。树干流出的乳汁为香口糖重要原料。树皮含有一种名赤铁素的植物硷，可治热症。

金叶树

Chrysophyllum roxburghii G. Don

合浦、十万大山、大明山、崇左、宁明、龙州。

墨叶 血胶树、山枇杷

Eberhardtia aurata (Pierre ex Dubard) Lec.

(Planchonella aurata Pierre ex Dubard,

Pouteria aurata (Pierre ex Dubard) Baehni)

上思、十万大山、宁明、龙州、德保、那坡、靖西、百色。

木材纹理直，结构紧密，材质坚韧；为栋梁、桥柱、家具等良材。

种子油可供制肥皂用。

铁色

Madhuca pasquieri (Dubard) H J. Lam

桂西南。

材用。

紫荆木 木花生

M. subquincuncialis H.J.Lam et Kerpel

宁明、龙州、容县。

木材坚韧，不裂不变形，不易被虫蛀，色调花纹美观，为建筑及工业强材，适于造船、水工、桥梁、车辆、建筑等用，并作机械器具、运动器械、农具、上等家具、美工用材。种子油可供制肥皂用。

铁线子

Manilkara hexandra (Roxb.) Dubard

合浦。

铁榄

Mastichodendron wightianum (Hk. et Arn.) van Royen
(*Sideroxylon wightianum* Hk. et Arn.)

临桂、罗城、柳州、苍梧、上思、十万大山、大新、龙州、靖西。

木材供用具、农械、磨齿等用。

假水石梓 山胶木

Planchonella pedunculatum (Hemsl.) H J Lam et Kerpel
(*Sarcosperma pedunculata* Hemsl.)

桂林、临桂、阳朔、平乐、富川、钟山、凌云、乐业、天峨、平南。

木材供农具、农械、器具用。

敏果

Pouteria annamensis (Pierre) Baehni

(*P. hainanensis* (Merr.) Baehni,

Sideroxylon hainanense Merr.)

龙州。

木材供建筑用。

222A 肉实科(水石梓科)

SARCOSPERMACEAE

肉实树

Sarcosperma arboreum Benth.

隆林、田林、凌云、乐业、田阳、那坡、百色、田东、天峨、巴马。

木材稍轻软；宜供家具、农具、器具等用。

枚辣叶肉实

S. kachinense (King et Prain) Exell

龙州、扶绥、宁明、靖西、凌云、乐业、巴马。

材用。

水石梓 月桂肉实树

S. laurinum (Benth.) Hk f.

上思、十万大山、博白、横县、那坡。

木材纹理直，结构细，质地稍轻软；宜作门窗、车辆、家具、农具、器具用材。

223 紫金牛科 MYRSINACEAE

桐花树

Aegiceras corniculatum (Lour.) Blanco

合浦。

小狮子头

Ardisia affinis Hemsl.

桂林。

全株治跌打，双单喉蛾。

念珠藤叶紫金牛☆

A. alyxiaefolia Tsiang

龙胜、大苗山、大瑶山、象州、恭城、兴安、贺县。

石狮子

A. arborescens Wall.

大新、龙州、武鸣、梧州。

全株作产妇用药。

两色紫金牛

A. bicolor Walk.

桂西。

短茎紫金牛

A. brevicaulis Diels

大苗山、大瑶山、兴安、临桂、灵川、龙胜、贺县、昭平。

全株除风湿，解热毒；治风湿筋骨痛，瘀伤咳嗽，喉蛾，无名肿毒，蛇咬伤。

棕紫金牛

A. brunescens Walk.

桂南。

小紫金牛

A. chinensis Benth.

上思、容县、平南、大苗山、三江、阳朔、蒙山、大明山、桂林、恭城。

全株活血散瘀，解毒止血；治肺结核，咯血，呕血，跌打损伤，黄疸，睾丸炎，尿路感染，闭经等。

伞房紫金牛 紫背绿

A. corymbifera Mez

桂西南。

用途参阅朱砂根。

朱砂根 圆齿紫金牛

A. crenata Sims.

区内各地。

根、叶祛风除湿，散瘀止痛，通经活络；治风湿痛，跌打，骨折，喉炎，牙痛，月经不调，咽喉炎，胃痛，消化不良等。种子油制肥皂，亦可食。

百两金 大罗伞

A. crispa (Thb.) A.DC.

(*A. hortorum* Maxim.)

大瑶山、大苗山、平南、龙胜、资源、凌云、乐业、那坡、凤山、蒙山。根、叶清热利咽，舒筋活血；治咽喉痛，跌打，风湿，肝炎，肾炎水肿，白浊，劳伤咳血，扁桃腺炎，骨结核，疔，疖，蛇伤等。种子油制肥皂，亦可食。

细柄百两金☆

A. crispa (Thb.) A.DC.

var. *dielsii* (Lévl.)

全州、资源、阳朔、天峨、隆林、大瑶山、大苗山、容县。全株止血；治刀伤，喉痛。

平顶紫金牛

A. depressa C.B.Clarks

百色、田阳、西林、隆林、东兰、都安、凤山、龙州。

珍珠盖罗伞 雀儿肾

A. elegans Andr.

阳朔、临桂、永福、大瑶山、大苗山、苍梧、平南、大明山、龙州、横县、邕宁、凌云、乐业、巴马、都安、罗城。

根、叶止痛；治跌打，内伤，弹伤。

Ardisia

剑叶紫金牛

A. ensifolia Walk.

凌云、乐业、田林、都安、凤山、巴马、恭城。

峨眉紫金牛 毛虫草

A. faberi Hemsl.

上思、大苗山、三江、兴安、凌云、乐业。

根、叶治感冒咳嗽，喉蛾。

线状紫金牛

A. filiformis Walk.

宁明、龙州。

两广紫金牛

A. fordii Hemsl.

平南、大瑶山、河池、凤山、藤县、百色、扶绥。

走马胎 大叶紫金牛

A. gigantifolia Stapf

大苗山、大瑶山、象州、平南、蒙山、马山、扶绥、上思、隆林、

凌云、乐业、永福、阳朔。

根或全株行血祛风，消肿止痛；治风湿，跌打，痈疖溃烂，经闭，

不孕症，产后血瘀腹痛，半身不遂等。作兽药主治风湿痛，风

痰壅塞，气促鼻煽，跌打，便秘。

紫金牛 不出林、矮地茶、平地木

A. japonica (Hornst.) Bl.

桂林、临桂、阳朔、兴安、永福、恭城、苍梧、藤县、昭平、岑

溪、大瑶山、平南、博白、邕宁、上思、浦北、灵山、凤山。

全草、根活血散瘀；治肺结核，咯血，咳嗽，慢性气管炎，跌打，

风湿，黄疸肝炎，睾丸炎，白带，尿路感染，闭经等。

红云草

A. maclurei Merr.

大瑶山、苍梧、蒙山、凤山、大明山、河池。

全草止痛，散血，调经；治崩血，吐血，难产，疮疥，跌打。

红毛毡 老虎须

A. mamillata Hance

龙胜、临桂、阳朔、兴安、苍梧、昭平、平乐、藤县、平南、容县、大瑶山、大苗山、三江、上思、大明山、田林、那坡、德保、都安、凤山、天峨。

全草清热利湿，活血止血，去腐生肌；治风湿，跌打，痢疾，肝炎，胆囊炎，月经不调，痛经，疔肿，肺结核咯血，外伤出血，小儿疳积，产后虚弱等。

榄色紫金牛

A. olivacea Walk.

桂西南。

尖叶紫金牛

A. oxyphylla Wall.

var. cochinchinensis Pitard

上思。

落地紫金牛 老虎毛虫药、打铁树

A. primulaefolia Gardn. et Champ.

恭城、兴安、龙胜、苍梧、上思、大明山、宁明、马山、龙州、大苗山、象州、大瑶山、容县、凤山、东兰。

全草补血；治劳伤咳嗽，风湿，跌打，疮疥等。

斑叶朱砂根 血党、脉点紫金牛、活血盐

A. punctata Lindl.

临桂、阳朔、大瑶山、平南、玉林、北流、苍梧。

Ardisia

根活血通经，祛风止痛；治月经不调，经闭，不孕，产后风瘫，
风湿，跌打，扁桃腺炎，牙痛等。

细小紫金牛☆

A. pusilla A.DC.

阳朔。

全草消肿止痛；治跌打损伤，黄疸，月经不调。

罗伞树 五脚紫金牛

A. quinquegona Bl.

各地林区。

全株消肿，清热解毒；治跌打。作兽药，治跌打肿痛，骨折创伤，
脚软无力。

海南罗伞树☆

A. quinquegona Bl.

var. *hainanensis* Walk.

桂西南。

似茄罗伞☆

A. solanacea Roxb.

桂西北。

细罗伞

A. tenera Mez

桂西北。

三花紫金牛

A. triflora Hemsl.

桂中。

雪下红 大罗伞树、矮脚三郎

A. villosa Roxb.

灵山、合浦、上思、大明山、龙州、容县、陆川。

全株消肿,活血散瘀;治风湿骨痛,内伤,吐血,跌打,红白痢,疮疥。

宽叶雪下红

A. villosa Roxb.

var. *latifolia* Walk.

博白。

圆齿紫金牛 大罗伞

A. virens Kurz

隆林、宁明、龙州。

云南紫金牛

A. yunnanensis Mez

桂西北。

云南酸藤子☆

Embelia henryi Walk.

凌云、乐业、德保。

酸藤子 酸藤果

E. laeta (L.) Mez

桂南各地。

根、叶散瘀止痛,收敛止泻;治跌打肿痛,肠炎腹泻,咽喉炎,胃酸缺乏,痛经,闭经等。果可食,强壮补血。兽医用根、叶治牛伤食腹胀,热病口渴。

长叶酸藤子☆ 吊罗果

E. longifolia (Benth.) Hemsl.

区内各地。

全株治产后腹痛。

长圆叶酸藤子 断骨藤

E. oblongifolia Hemsl.

区内各地。

果实驱虫，祛风，止泻；治蛔虫，绦虫。

当归藤 小花酸藤子、筛箕藤

E. parviflora Wall.

(*E. myrtifolia* Hemsl. et Mez)

区内各地。

根、藤通经活络，补虚益肾；治不孕症，月经不调，白带，萎黄病，腰腿痛，闭经，贫血，胃痛，跌打骨折。

滇桂酸藤子☆

E. polypodioides Hemsl. et Mez

那坡、德保。

褐毛酸藤子☆

E. pulchella Mez

靖西、那坡、隆林。

白花酸藤子

E. ribes Burm.f.

区内各地。

根清热祛湿，止血消炎；治急性肠胃炎，赤白痢，腹泻，刀枪伤，外伤出血，毒蛇咬伤。

大样酸藤子 了哥隔

E. rudis H.-M.

区内各地。

根、茎清凉解毒，滋阴补肾；治经闭，月经不调，风湿。

假刺藤

E. scandens (Lour.) Mez

凤山、东兰、德保、靖西、百色、都安、邕宁。

厚叶酸藤子☆

E. subcoriacea (C B Cl.) Mez

龙州、大新、那坡、靖西。

果可食。

尖叶杜茎山

Maesa acuminatissima Merr.

上思。

银叶杜茎山 嫩肉木

M. argentea Wall.

var. *kwangsiensis* H.-M.

梧州。

中越杜茎山☆

M. balansae Mez

龙州、宁明、大新、巴马。

信宜杜茎山

M. insignis Chun

容县、南丹。

杜茎山 野胡椒

M. japonica (Thb.) Mor.

区内各地。

全株祛风寒，消肿胀；治腰痛，头痛，心躁，烦渴，眼目晕眩。

根与白糖煎服治皮肤风毒。

山杜茎山

M. montana A.DC.

上思、田林、昭平。

叶可代茶，又可制蓝色染料。

小叶杜茎山☆

M. parvifolia A.DC.

桂南。

空心花 鲫鱼胆

M. perlarius (Lour.) Merr.

区内各地。

全草消肿去腐，生肌接骨；治跌打刀伤，疔疮，肺病。

鳞秕杜茎山☆

M. ramentacea (Roxb.) A.DC.

上思、都安、天峨、巴马、百色、那坡、凌云、乐业、平果。

假茶叶

M. tenera Mez

融安、大苗山、凌云、乐业。

铁仔 明立花

Myrsine africana L.

桂西。

根、枝、叶祛风止痛，补虚活血；治风湿，虚劳，脱肛，尿血，

子宫脱垂，咽喉痛，牙痛。刀伤用鲜叶嚼烂外敷。皮、叶提制
栲胶。种子榨油供工业用。

广西铁仔☆

M. elliptica Walk.

大瑶山、武鸣、上林。

刺叶铁仔

M. semiserrata Wall.

那坡、凌云、乐业、隆林、田林、平南。

皮、叶提制栲胶。种子榨油供工业用。

小铁仔

M. stolonifera (Koidz.) Walk.

(M. marginata Mez)

龙胜、大瑶山、大苗山、凌云、乐业。

海南密花树

Rapanea faberi Mez

乐业、德保。

广西密花树

R. kwangsiensis Walk.

龙州、大新、德保、靖西、那坡、百色、隆林、凤山、东兰、天峨、河池、都安、桂林。

打铁树 雀仔肾

R. linearis (Lour.) Moore

上思、合浦、邕宁、陆川。

密花树

R. neriifolia (S. et Z.) Mez

(*Myrsine neriifolia* S. et Z.)

区内各地。

材用。树皮提制栲胶。叶治外伤。

224 安息香科 STYRACACEAE

牛角树

Alniphyllum eberhardtii Guillaum.

田林、那坡、靖西、凌云、乐业、德保、龙州、都安、凤山。

用途参阅拟赤杨。

拟赤杨 水冬瓜

A. fortunei (Hemsl.) Perk.

各地林区。

木材轻软，易于加工；适作模型、水瓢、火柴杆、茶叶箱和其他板箱用材，亦可制纸浆。种子可榨油供工业用。

大叶拟赤杨

A. fortunei (Hemsl.) Perk.

var. *megaphyllum* (Hemsl. et Wils.) C.Y. Wu

Alniphyllum-Huodendron

(**A. megaphyllum** Hemsl. et Wils.)

罗城、十万大山。

用途参考拟赤杨。

小果拟赤杨

A. fortunei (Hemsl.) Perk.

var. **microcarpa** C.Y.Wu

隆林、那坡。

用途参考拟赤杨。

银钟树

Halesia macgregorii Chun

临桂、灵川、龙胜、大苗山。

材用。

钝齿银钟树

H. macgregorii Chun

var. **crenata** Chun

兴安、临桂。

材用。

云贵山茉莉 螺丝木

Huodendron biaristatum (W.W.Sm.) Rehd.

龙胜、兴安、永福、大苗山、南丹、德保、凌云、乐业、那坡、
田林、龙州。

材用。

广西山茉莉

H. biaristatum (W.W.Sm.) Rehd.

var. **kwangsiense** Hu

临桂。

材用。

岭南山茉莉

H. biaristatum (W.W.Sm.) Rehd.

var. *parviflorum* (Merr.) Rehd.

那坡、龙胜、临桂、兴安、恭城、容县、平南、南丹、大瑶山、
象州、武鸣、大明山、蒙山、龙州。

材用。

西藏山茉莉 “脱皮树、熊巴树

H. tibeticum (Anth.) Rehd.

龙胜、阳朔、大苗山。

木材坚且韧，适宜制刨壳、扁担一类工具、农具。

陀螺果

Meliiodendron xylocarpum H.-M.

大瑶山、象州、大苗山、平南、凌云、乐业、田林、德保、全
州、龙胜、荔浦、临桂、永福、兴安、罗城、天峨、龙州。

木材作建筑、家具、用具用材。

白辛树 大叶白辛树

Pterostyrax hispida S. et Z.

全州、兴安、隆林。

裂叶白辛树

P. leveillei (Fedde) Chun

龙胜、兴安、资源、全州、临桂、大苗山、田林。

小果白辛树

P. microcarpa Diels

桂南。

广东木瓜红☆ 岭南木瓜红

Rehderodendron kwangtungense Chun

苍梧、龙胜、资源、兴安、大苗山、贺县。

贵州木瓜红

R. kweichowense Hu

那坡。

矩圆果木瓜红

R. praeteritum Sleum.

大瑶山。

云南木瓜红

R. tsiangii Hu et Cheng

大苗山、那坡。

银叶安息香☆

Styrax argentifolia H.L.Li

苍梧、龙胜、龙州、那坡。

叶止痛消肿；治跌打刀伤，疮疥。

江苏安息香☆

S. argyi Lévl.

大瑶山。

变秃安息香☆

S. calvescens Perk.

大瑶山。

种子油可制肥皂，作润滑油，掺合油漆用。

狗奶柴

S. confusa Hemsl.

桂西北、桂林。

垂珠花

S. dasyantha Perk.

大瑶山。

种子榨油供工业用。种子含油量40%，为半干性油。

白花笼

***S. faberi* Perk.**

区内各地。

种子榨油供制肥皂和润滑油，照明用。果实治头昏发热。

老鸦铃

***S. hemsleyana* Diels**

大瑶山、大苗山、贺县。

种子油可制肥皂和润滑油。

滇桂安息香 滇桂野茉莉

***S. hypoglauca* Perk.**

十万大山、百色、大苗山。

树脂治中风昏厥，产后血晕及心腹诸痛。

安息香 野茉莉

***S. japonica* S. et Z.**

大苗山、龙胜、全州、兴安、灌阳、临桂。

木材作伞柄、拐杖、玩具等细工用材。种子油可制肥皂和润滑油，掺合作油漆。果、叶及寄生包（指虫瘿内的白粉）祛风除湿；可治瘫痪。果皮有毒，能闹鱼。

大花安息香☆

***S. macrantha* Perk.**

罗城。

青山安息香

***S. macrothyrsas* Perk.**

龙州、南宁。

树脂治中风昏厥，产后血晕及心腹诸痛。

毛安息香 白扣子

***S. mollis* Dunn**

Styrax

苍梧、平南、陆川、大瑶山、大苗山、象州、永福、兴安、阳朔、龙胜。
种子油可制肥皂、油墨和润滑油。

玉铃花

***S. obassia* S. et Z.**

平南。

木材作细工用材。种子油可制肥皂和润滑油。花可提取芳香油。

芬芳安息香

***S. odoratissima* Champ.**

龙胜、全州、临桂、恭城、大苗山、大瑶山、贺县、凌云、乐业。
木材供建筑、船舰、车辆、家具等用。

上思安息香☆

***S. oligophlebia* Merr. ex H.L.Li**

太平安息香 赛山梅

***S. philadelphoides* Perk.**

隆林、靖西、那坡、南丹、罗城、大瑶山、融安、贺县、永福、
全州、资源。

木材造农具。种子油可制肥皂和润滑油。

红皮

***S. suberifolia* Hk. et Arn.**

上思、大瑶山、大苗山、柳城、三江、罗城、龙胜、兴安、临桂、
恭城、永福、全州、龙州、苍梧。

种子油可制肥皂或油漆。根、叶祛风除湿，理气止痛；治风湿关
节痛，胃痛。

白叶安息香 白叶野茉莉、白花木

***S. subnivea* Merr. et Chun**

龙胜、资源、灵川、兴安、大苗山、大瑶山、苍梧、贺县、巴马、
凌云、乐业、德保、平果、靖西、上思。

树脂治中风昏厥，产后血晕及心腹诸痛。种子油治皮肤痒。木材松软，可作火柴杆、家具及板材。

越南安息香

***S. tonkinensis* (Pierre) Craib**

田林、龙州、南宁。

树脂祛风除湿，行气开窍，镇静止咳；治哮喘，咳嗽，感冒，中暑，胃痛，产后血晕，遗精，中风昏厥。

225 山矾科(灰木科) SYMPLOCACEAE

腺叶山矾

***Symplocos adenophylla* Wall.**

大瑶山。

腺柄山矾

***S. adenopus* Hance**

十万大山、大瑶山。

少脉腺柄山矾☆

***S. adenopus* Hce.**

var. *oligophlebius* Merr.

苍梧。

薄叶山矾 白塔木

***S. anomala* Brand**

临桂、灵川、龙胜、阳朔、兴安、全州、资源、大苗山、象州、大瑶山、上思、十万大山、容县、龙州。

木材造农具、家具，亦甚宜作火柴杆。种子油作润滑油。

亮薄叶山矾☆

***S. anomala* Brand**

var. *nitida* H.L.Li

十万大山。

Symplocos

总状山矾

S. botryantha Fr.

(*S. leucophylla* Brand)

永福。

山矾 山桂花

S. caudata Wall.

(*S. prunifolia* S. et Z.)

资源、兴安、大瑶山、上思、凌云、乐业。

根、花、叶清热利湿，理气化痰；治黄疸，咳嗽，扁桃腺炎，关节炎。叶能杀蚤蠹；煎汁可得黄色染料；烧灰可作染料，不需白矾作媒染剂。叶片三十张和老姜三片浸水蒸热，用水洗烂弦风眼有特效。木材造农具、工具。种子油制肥皂和润滑油。花可提取芳香油。

大萼山矾☆

S. caudata Wall.

var. *macrocalyx* H.-M.

大瑶山、宜山。

华山矾 土常山、地黄木、猪糠木

S. chinensis (Lour.) Druce

区内各地。

根、叶、果清热解毒，祛风除湿，止血止痢；治病疾，疟疾，肾炎，便秘，牙痛，筋骨痛，疮疥，蛇伤，感冒。种子油制肥皂。叶充猪饲料。

上身眉

S. chunii Merr.

十万大山、灵川、桂林。

柃叶山矾☆

S. cochinchinensis (Lour.) Moore

苍梧、大瑶山、罗城、凤山、东兰、十万大山、百色、靖西、那坡、平果、北流、玉林、陆川、阳朔、平乐、恭城、永福。
木材作建筑、家具、器具用材。种子油供工业用。

南岭山矾

S. confusa Brand

十万大山、大明山、临桂、龙胜、阳朔、兴安、大瑶山、贺县。

构花山矾

S. confusa Brand

var. *lysiostemon* H -M.

大瑶山、龙胜、象州。

密花山矾

S. congesta Benth.

(*S. cuspidata* Brand)

兴安、大瑶山、大苗山、宁明、凌云、靖西、乐业、容县、象州。

厚叶山矾☆

S. crassifolia Benth.

容县。

美山矾

S. decora Hance

十万大山、龙胜、全州、田阳。

长毛山矾

S. dolichotricha Merr.

(*S. indochinensis* H L Li,

S. kwangtungensis H.L.Li)

龙州、大明山、大瑶山、罗城、苍梧、昭平、玉林、平南。

Symplocos

茶条山矾 茶条果

S. ernestii Dunn

乐业、大苗山、兴安。

腺山矾

S. glandulifera Brand

那坡、靖西。

羊屎木 羊舌树

S. glauca (Thb.) Koidz.

(*S. neriifolia* S. et Z.)

陆川、上思。

木材造农具、器具，造纸。树皮散寒，清热；治伤风头痛，热邪口燥，感冒身热。种子油制肥皂和润滑油。

大叶山矾

S. grandis H.-M.

大瑶山。

毛山矾☆

S. groffii Merr.

(*S. lungtauensis* Merr.,

S. mollipila H.L.Li)

东兰、南丹、大苗山、三江、大瑶山、平南、武鸣、宁明、凌云、乐业、那坡、德保。

华南山矾

S. handelii Chun et Ting, ined.

(*S. austrosinensis* H.-M., non Migo).

大瑶山、龙胜、象州。

岂山山矾☆

S. heishanensis Hayata

大瑶山。

万宁山矾☆

S. howii Merr. et Chun ex H.L.Li

临桂。

广西山矾

S. kwangsiensis Merr. ex H.L.Li

光叶山矾 滑叶常山

S. lancifolia S. et Z.

区内各地。

木材造农具、用具。根治跌打。

圆萼山矾

S. latouchei W.W.Sm. ex H.-M.

凌云、全州。

月桂山矾 黄牛奶树、四季青

S. laurina (Retz.) Wall.

(*S. spicata* Roxb.)

各地林区。

木材制农具、家具。树皮散寒清热；治伤风头痛，热邪，口燥，感冒身热。种子油制肥皂和润滑油。

狭叶月桂山矾

S. laurina (Retz.) Wall.

var. *bodinieri* (Brand) H.-M.

(*S. bodinieri* Brand)

大苗山、大瑶山。

骨齿山矾☆

S. mairei Lévl.

(*S. myriadenia* Merr.)

Symplocos

十万大山、大瑶山、凌云。

细毛山矾

S. microtricha H.-M.

龙州、武鸣、柳州、大瑶山、大苗山、龙胜。

木材作建筑板料及制家具用。种子油制肥皂和润滑油。

桂南山矾☆

S. migoi Chun

(*Babua austro-sinensis* Migo)

桂南。

卵叶山矾

S. ovalifolia H.-M.

临桂、灵川。

白檀 山矾、灰木

S. paniculata (Thb.) Miq.

(*S. crataegoides* Buch.-Ham.)

梧州、容县、南宁、上思、大瑶山、象州、临桂、兴安、全州、
阳朔、永福、恭城。

木材供细工及建筑用。种子油制肥皂、油漆。叶充猪饲料。根制
土农药。叶止血；治刀伤。根治斑痧。

海桐山矾

S. pittosporifolia H.-M.

十万大山、大瑶山、宜山。

铁山矾

S. pseudobarberina Gontsch.

大瑶山、大苗山、龙胜、临桂、东兰。

腺边山矾

S. punctato-marginata A.Chev. ex Guillaum.

(*S. stewardii* Sleumer)

十万大山、平南、苍梧、容县。

总序山矾☆

S. racemosa Roxb.

(*S. propinqua* Hance,

S. intermedia Brand,

S. macrostachya Brand,

S. petelotii Merr.)

龙州、宁明、南宁、武鸣、扶绥、隆林、田阳、百色、桂林。
叶治眼热症。

波缘山矾

S. sinuata Brand

大瑶山、资源、全州、那坡。

多花山矾

S. stapfiana Lévl.

(*S. fasciculata* Zoll.

var *chinensis* Brand,

S. myriantha Rehd.,

S. ramosissima Wall.

var. *salwinensis* H.-M.)

武鸣、隆林、田林、乐业、大瑶山、大苗山、贺县、龙胜、灵川、
临桂、上思。

滑萼山矾

S. stapfiana Lévl.

var. *leiocalyx* H.-M.

罗城。

星状山矾 老鼠矢

S. stellaris Brand

Symplocos-Buddleia

(*S. limprichtii* H.Winkl.,

S. wilsoni Hemsl.,

S. neriifolia Guill.)

龙胜、临桂、全州、阳朔、大苗山、贺县、东兰。

根治跌打。茎皮纤维造纸，制绳索。种子油制肥皂。

银色山矾☆

S. subconnata H.-M.

(*S. alata* Brand,

S. argentea Brand)

全州、合浦。

壶果山矾

S. urceolaris Hance

龙胜、临桂、合浦。

228 马 钱 科 LOGANIACEAE

驳骨醉鱼草 驳骨丹

Buddleia asiatica Lour.

区内各地。

根、叶驱风化湿，行气活络；治痢疾。脾湿腹胀，关节炎，跌打，无名肿毒，小儿口疮，哮喘。花可提芳香油。枝叶作农药，防治农作物害虫。

绛花醉鱼草

B. davidii Fr.

var. *magnifica* (Wils.) R. et W.

全州、资源、兴安。

用途参考下一种。

穆坪醉鱼草

***B. davidii* Fr.**

var. *superba* R. et W.

龙胜、临桂、全州、资源、兴安、南丹、那坡、凌云、大苗山。
全株止咳杀虫，祛风散寒，消积止痛；治感冒，风湿痛，跌打刀伤，痞积，脚癣，妇女阴痒，咳嗽。

醉鱼草 驴尾草、苦叶菜、鸡公尾

***B. lindleyana* Forst.**

区内各地。

花、叶、根有毒，行血活血，止咳定喘；治急性腹炎，风湿关节炎，支气管炎，哮喘，腮腺炎，淋巴结核，跌打损伤，疖肿，烫火伤，外伤出血，崩带，牙痛等。孕妇慎用。兽医用枝叶治牛泻血。花、叶可闹鱼，灭钉螺。枝叶作农药杀螟虫，又可防治小麦吸浆虫、蚊、蝇、蛆等。花可提芳香油。本种全株有毒，多服会引起头晕、呕吐等症。中毒的解救方法用洗胃、导泻等法。

假黄花

***B. madagascariensis* Lam.**

龙州、藤县、凤山、巴马、桂林。

根、叶清凉止血；治痞积，疮疥，刀伤，黄疸。蜜源植物。

密蒙花

***B. officinalis* Maxim.**

宜山、桂林、容县、平南、武鸣、扶绥、龙州、大瑶山、柳州、柳城、大苗山、凌云、乐业、隆林、靖西、田林、平果。

花清热利湿，明目退翳，为眼科要药；治青盲翳障，赤肿流泪，羞明畏光，眼热痛。根治黄疸，水肿等。花、叶作农药杀秧苗害虫，亦可闹鱼。兽医用枝叶治牛红白痢。花可提芳香油，又可作黄色食用染料。茎皮纤维可造纸。

灰莉

Fagraea chinensis Merr.

桂西南。

西南灰莉☆

F. khasiana Benth.

那坡。

香港蓬菜葛☆

Gardneria hongkongensis Hayata

南丹、大苗山、田阳。

狭叶蓬菜葛☆

G. lanceolata R. et W.

隆林。

多花蓬菜葛☆

G. multiflora Makino

龙州、凌云、乐业、南丹、大苗山、全州。

蓬菜葛

G. ovata Makino

凌云、乐业。

断肠草 胡蔓藤、大茶药

Gelsemium elegans Benth.

区内各地，南部地区较多。

全草有剧毒；消肿止痛，拔毒杀虫；外用治疗疮，癣疥，皮肤湿疹，跌打，骨折等。根、茎、叶均可用作杀虫农药，兽医用适量内治牛、羊、猪肠虫；外用杀蟥止痒，除虱，拔毒生肌。误食断肠草中毒的解救方法：立即灌大量猪、羊等动物鲜血；给身体保暖；血压低时注射麻黄碱，静脉滴注葡萄糖盐水；呼吸障碍时注射尼可刹米等兴奋剂，输氧或行人工呼吸；腹部剧痛时可

用镇痛剂。民间解毒方法有：1. 灌大量猪油或生油；2. 薤菜的根、茎一斤捣烂榨汁灌服；3. 雷公根捣烂拌茶油灌服；4. 金银花连叶捣烂榨汁拌黄糖灌服。

度量草

Mitreola pedicellata Benth.

南丹、隆林。

狭花马钱 牛眼珠

Strychnos angustiflora Benth.

合浦、博白。

种子散血热，消肿毒；治伤寒热病，咽喉肿痛，痞块，痈疽，恶疮。本属植物的种子有剧毒，用时注意。中毒症状是全身肌肉痉挛，呼吸困难，面色青紫，牙关紧闭，角弓反张，怕声音、光线等刺激。解救法主要是将病人安置在安静的暗室内用解痉剂等对症治疗。

华马钱

S. cathayensis Merr.

平南、苍梧、大瑶山、扶绥。

种子和根解热，止血；治头痛，心气痛，刀伤，疟疾。

●吕宋果 解热豆

S. ignatii Bergius

原产亚洲热带地区。

代马钱子药用。

●马钱子

S. nux-vomica L.

原产印度、锡兰、泰国。

种子有毒；散血热，消肿毒；治咽喉肿痛，肿瘤痞块，痈疽恶疮等。

229 木犀科 OLEACEAE

连翘

Forsythia suspensa (Thb.) Vahl

南宁栽培。

果实清热解毒，散结消肿，排脓，利尿。治热病初起，痈肿疮疡，瘰癧，丹毒，淋病等。

白蜡树

Fraxinus chinensis Roxb.

临桂、桂林、龙胜、阳朔、兴安、资源、罗城。

枝条柔软，称白蜡条，适宜于编制提篮、抬筐等物；较粗者制作手杖、缨枪、工具柄等物，并可作搭棚建房材料。树皮调经解毒；治月经不调，小儿头疮。本树种是白蜡虫寄主，能放养白蜡虫产白蜡。

光蜡树

F. griffithii C.B. Clarke

桂林、临桂、南丹、容县、大新。

苦枥木 白蜡树、水蜡树

F. retusa Champ.

全州、阳朔、临桂、龙胜、大苗山。

白蜡虫寄主树种。

白萼素馨

Jasminum albicalyx Kobuski

柳城、龙州、武鸣、平乐。

扭肚藤 波形素馨

J. amplexicaule Buch.-Ham.

区内各地。

茎、叶清热化湿，消滞；治急性肠胃炎，痢疾腹痛，消化不良，

急性结膜炎，风湿性关节炎，跌打骨折。

短萼素馨

J. brevidentatum Chia

临桂。

华南素馨

J. cathayense Chun ex Chia

大瑶山。

梔花素馨

J. gardeniiflorum Chia

上思。

光清香藤

J. lanceolarium Roxb.

区内各地。

根、藤行血理气，祛风解毒；治风湿麻木，无名肿毒，跌打损伤，头痛腰痛等。花可提芳香油。

清香藤

J. lanceolarium Roxb.

var. *puberulum* Hemsl.

罗城、容县、全州。

藤治风湿跌打。

桂叶素馨

J. laurifolium Roxb.

罗城、大瑶山、全州。

全草清热解毒，消炎利尿，消肿散瘀；治痢疾，尿路感染，膀胱炎，尿道炎，肾炎水肿，跌打扭伤。

长管素馨☆ 白坑藤

J. longitubum Chia

Jasminum

龙州。

●云南黄素馨

J. mesnyi Hance

临桂、桂林。

作绿篱。

·小萼素馨

J. microcalyx Hance

上思、龙州、天峨、隆林、柳城、平乐。

青藤仔 鸡骨香

J. nervosum Lour.

隆林、凌云、百色、田林、平果、东兰、巴马、河池、都安、武

鸣、扶绥、龙州、临桂。

藤、花解毒消肿；治热痢，跌打，疮疖。

小叶青藤仔

J. nervosum Lour.

var. *elegans* (Hemsl.) Chia

天峨、百色。

毛青藤仔

J. nervosum Lour.

var. *villosum* (Lévl.) Chia

隆林。

厚叶素馨 鲫鱼胆

J. pentaneurum H.-M.

大瑶山、玉林、平南、博白、容县、北流、梧州、苍梧、藤县、

贺县、上思、横县、宁明、上林、百色、桂林、平乐。

全株清热行气，去瘀生新；治跌打刀伤，蛇伤，烂疮。

●茉莉花

J. sambac (L.) Ait.

各地。

花提芳香油，又可薰茶。药用花清热解表；治外感发热，腹痛，
疮毒疽瘤，眼红肿。根有毒；镇痛麻醉。绿化植物。

贵州素馨☆

J. seguini Lévl.

临桂、桂林、阳朔、武鸣。

大花贵州素馨☆

J. seguini Lévl.

var. *latilobum* H.-M.

南丹、宜山、河池、容县、靖西。

根健胃，强壮。

华素馨

J. sinense Hemsl.

凌云、田林、南丹、凤山、恭城、阳朔、荔浦、临桂、龙胜、全州、
贺县、富川、钟山。

花清热解毒；治疮疥。

毛女贞

Ligustrum groffiae Merr.

罗城、都安、大瑶山、融安、平南、南宁、大新、武鸣、田林、
百色、那坡、平果、龙胜、恭城、永福、昭平。

叶治喉痛，口唇糜烂。

东女贞

L. japonicum Thb.

十万大山、容县、大瑶山、大苗山、柳城、象州。

作绿篱用。作靠接月季、丹桂的砧木用。

女贞 大叶女贞、冬青

L. lucidum Ait.

桂林、临桂、兴安、龙胜、资源、全州、恭城、永福、大瑶山、南丹、罗城、东兰、上林、那坡、田林、隆林、凌云、乐业、蒙山、贺县。

种子补肾强腰；治肝肾阴亏，腰膝痠软，头晕目昏。树皮和叶清热解毒，消炎止痛；治口腔炎，咽喉炎，烫火伤，痈肿。种子油工业用。为较好绿化树种，又可放养白蜡虫。

亮叶女贞

L. nitidum Ait.

凹叶女贞☆

L. retusum Merr.

桂林、临桂、阳朔。

虫蜡树

L. robustum Bl.

放养白蜡虫。树皮提制栲胶。

山指甲 小叶女贞、小蜡树

L. sinense Lour.

区内各地。

放养白蜡虫。花提芳香油。种子可榨油和提取淀粉。叶清热解毒，消肿止痛；治跌打损伤，刀伤，疮疡肿毒。根通小便，治劳伤吐血。兽医用全株治跌打损伤，洗烂脚及皮肤搔痒。常作绿篱用。

蜡树

L. sinense Lour.

var. *myrianthum* (Diels) Hoefk.

容县、上思。

用途同上。

海南李榄

Linociera hainanensis Merr. et Chun

龙州。

枝花李榄

L. ramiflora (Roxb) Wall.

(*L. macrophylla* Wall)

扶绥、龙州、宁明、十万大山、平南、苍梧、龙胜、临桂、田林。

材用。树皮提制栲胶。叶、嫩枝及果实可提取芳香油供调合香精用。

毛萼李榄

L. ramiflora (Roxb.) Wall.

forma *pubisepala* Chia

大苗山、上思。

*油橄榄 洋橄榄、齐墩果

Olea europaea L.

南宁、柳州、桂林等市有引种。

果肉榨油供食用；油在医药上用作软膏、硬膏、缓泻剂等；亦有用来制润滑油和肥皂。半成熟的果及等外果可腌泡作菜食。木材很坚重，可作工具、箱盒、刷背等用材。

狭叶木犀榄

O. neriifolia H L Li

区内有记录。

方枝木犀榄

O. tetragonoclada Chia

十万大山、东兴、防城。

狭叶木犀

Osmanthus attenuatus P.S.Green

平南、龙胜。

石山桂花☆

O. fordii Hemsl.

桂林、临桂、灵川、阳朔。

绿化花木。比桂花矮小。适用于庭园和公园。花亦很盛，但不及桂花的芬芳。

桂花 木犀

O. fragrans Lour.

桂林地区和富川、钟山、河池、天峨、德保、靖西、南宁、合浦等县。

花提芳香油，制桂花浸膏，用以配制高级香料，用于各种香脂、香皂及食品中。鲜花用盐或糖浸渍保存作为食品香料。花用以薰茶和制桂花糖、桂花糕、桂花酒等。花散寒破结，化痰生津，明目；治风虫牙痛，痰饮喘咳，经闭腹痛。根祛风除湿，散寒；治筋骨疼痛，风湿麻木，肾虚牙痛。优良绿化和行道树种。

●丹桂

O. fragrans Lour.

var. *aurantiacus* Mak.

桂林。

用途同桂花。在绿化上不同的特点是花颜色为橙红色。

月桂

O. marginatus (Champ. ex Benth.) Hemsl.

容县、武鸣、大瑶山、大苗山、龙胜、兴安、临桂、全州。

花提芳香油。绿化树种。

牛矢果

O. matsumuranus Hayata

平南、博白、北流、大瑶山、上思、都安、龙州、大明山、宁明、
龙胜、恭城。

叶杀菌，消炎；治烂疮。

显脉木犀☆

O. phanerophlebius Chia

全州、资源、大瑶山。

华木犀☆

O. sinensis (H-M.) H-M.

(*Gonocaryum sinense* H-M)

十万大山。

•扁球丁香☆

Syringa oblata Lindl.

桂林有引种。

显苞齐墩果 滨木犀榄

Tetrapilus brachiatus Lour.

异株木犀榄

T. dioicus (Roxb.) Johns.

(*Olea dioica* Roxb.)

平南、上思。

树皮解热。木材供细工、用具等用。

海南木犀榄

• *T. hainanensis* (H.L.Li) Johns.

(*Olea hainanensis* H.L.Li)

十万大山、大瑶山。

230 夹竹桃科 APOCYNACEAE

广西香花藤

Aganosma kwangsiensis Tsiang

上思、大明山、那坡、天峨、凤山、融安。

全株治水肿。

罗甸香花藤☆

A. navailei (Lévl.) Tsiang

(*Trachelosperma navailei* Lévl.)

南丹。

香花藤☆

A. schlechterianum Lévl.

(*A. odorum* Tsiang,

A. radiatum Merr.)

隆林、田林、凤山、南丹。

●黄蝉

Allamanda neriifolia Hk.

常栽培供庭园绿化。

糖胶树 面条树、灯台木

Alstonia scholaris (L.) R.Br.

(*Echites scholaris* L.,

Pala scholaris (L.) Roberty)

东兴、南宁、武鸣、宁明、龙州、那坡、陆川、北流。

叶镇静止咳，消炎退热；治百日咳，伤风咳嗽，气管炎，支气管炎，肺炎，哮喘。叶止血生肌；治外伤出血，疮疖。树胶植物，树干的白色乳汁含树胶，可提取作橡胶代用品原料，亦用作

口香糖原料。绿化树种。

云南糖胶树 ☆ 鸡骨常山

A. yunnanensis Diels

隆林、田林、乐业。

根、叶消炎止血，接骨止痛；叶治疟疾，肝炎，外伤出血，骨折。

根治发热头痛，外洗红肿痛。种子含油。

尖叶念珠藤 ☆

Alyxia acutifolia Tsiang

兴安。

海南念珠藤 ☆

A. hainanensis Merr. et Chun

大瑶山、十万大山。

广东念珠藤 ☆

A. levinei Merr.

十万大山、大明山、宁明、龙州、大瑶山、大苗山、南丹、平乐、
阳朔、荔浦、临桂、兴安、恭城、贺县、苍梧。

茎、叶消肿止痛，去腐生新；治抽筋，风湿，病后虚弱，腰痛，
心胃气痛。

野念珠藤

A. schlechteri Lévl.

大瑶山、南丹、凌云、乐业。

串珠子

A. vulgaris Tsiang

大瑶山、贺县、兴安。

念珠藤

A. sinensis Champ.

靖西、龙州、大瑶山。

Alyxia-Catharanthus

信宜念珠藤 ☆

A. yunkuniana Tsiang

十万大山、大瑶山、南丹。

铁骨藤 神葛藤

Anodendron affine (Hk. et Arn.) Druce

合浦、苍梧、十万大山、大瑶山。

海南铁骨藤

A. howii Tsiang

防城、十万大山。

短筒清明花

Beaumontia brevītuba Oliv.

宁明。

大花清明花 炮弹果

B. grandiflora Wall.

龙州、隆林。

根、叶祛风湿，散瘀活血，接骨；治骨折，跌打损伤，风湿性腰腿痛，腰肌劳损。

●长春花 日日新

Catharanthus roseus (L.) G Don

桂林、南宁等市。

全草凉血降压，镇静安神；主治高血压。近年发现为抗癌药物，治白血病，肺癌，绒毛膜上皮癌，淋巴肿瘤。常栽作庭园绿化植物。

●白长春花 白日新

C. roseus (L.) G. Don

var. *albus* (Sweet) G. Don

用途同长春花。

海芒果

Cerbera manghas L.

合浦、钦州海岸砂地或近海河岸。

枝、叶、果有毒，核仁最毒（含氢氰酸和海芒果甙等）。种子可毒鱼。树液可作泻下剂。误食果实中毒时，可用对症疗法；民间用灌鲜羊血、饮椰子水解毒。

鹿角藤 大叶鹿角藤、奶汁藤、康膜藤

Chonemorpha eriostylis Pitard

苍梧、东兴、十万大山、大明山、宁明、龙州。

老茎治妇女黄疸。橡胶植物，胶乳可作橡胶原料。

酸叶胶藤

Ecdysanthera rosea Hk. et Arn.

博白、宁明、龙州、田林、十万大山、大瑶山、南丹、天峨、阳朔、临桂、灵川。

全株健胃，解热，消肿，收敛，止汗；治跌打，风湿骨痛，痈痛，溃疡，疔疮，眼肿。作兽药，治牛瘟。韧皮纤维可作造纸和人造棉原料。

花皮胶藤

E. utilis Hay. et Kaw.

十万大山、宁明、大瑶山。

橡胶植物，胶乳可制橡胶用品；如力车胎、救生圈、医疗器械等。

树皮治小儿白泡疮。

桂南花皮胶藤

E. utilis Hay. et Kaw.

var. *dilatata* Tsiang

十万大山。

用途参阅花皮胶藤。

中国狗牙花

Ervatamia chinensis (Merr.) Tsiang

东兴。

大陆狗牙花

E. continentalis Tsiang

东兴、十万大山。

毛狗牙花

E. continentalis Tsiang

var. *pubiflora* Tsiang

十万大山。

●狗牙花

E. divaricata (L) Burk.

常栽作庭园绿化植物。叶清凉解热，利水消肿；治眼病，疮疥，乳疮，疯狗咬伤。

●重瓣狗牙花 狗癫木

E. divaricata (L) Burk.

cultivar. "Couyahua"

用途同狗牙花。

广西狗牙花

E. kwangsiensis Tsiang

田阳、百色、田林。

药用狗牙花

E. officinalis Tsiang

龙州、靖西。

纤花狗牙花

E. tenuiflora Tsiang

凌云。

云南狗牙花

E. yunnanensis Tsiang

田林。

止泻木

Holarrhena antidysenterica Wall.

龙州、南宁有栽培。

树皮可治痢疾，肠胃气胀，发热。种子补肾壮阳。木材可制梳和模型。

腰骨藤 青豆藤

Ichnocarpus frutescens (L.) R.Br.

苍梧、大明山、田阳、百色、东兰。

种子浸酒，可治腰骨风湿痛。根可提取橡胶。韧皮纤维可提取利用。

疏花腰骨藤

I. oliganthus Tsiang

岑溪、南宁。

尖山橙

Melodinus fusiformis Champ.

大瑶山。

全株活血祛风；治风湿性心脏病。

大山橙

M. magnificus Tsiang

苍梧、大瑶山、象州、十万大山、靖西。

叶可代茶。

桂山橙

M. morsei Tsiang

龙州。

贵州山橙

M. seguinii Lév.

十万大山、大瑶山、龙州、那坡、罗城。

山橙

M. suaveolens Champ.

十万大山、合浦、陆川、博白、宁明。

常栽培作庭园绿化植物。韧皮纤维可制绳，织麻袋。

小花藤

Microchites polyantha (Bl.) Miq.

十万大山、大明山、龙州、靖西。

两广小花藤

M. rehderiana Tsiang

十万大山。

●夹竹桃

Nerium indicum Mill

常栽培庭园绿化和行道树种。枝、叶、树皮有大毒，入药，强心利尿，发汗祛痰，祛瘀止痛，解毒透疹；治哮喘，羊癫疯，跌打，亦有用治小儿麻疹不透。孕妇忌用。韧皮纤维是高级混纺原料，可混纺织成平布、帆布供衣着等用，亦可单纺或供制绳、造纸等用。种子油可作润滑油。叶、树皮和花浸液可防治稻飞虱、浮尘子等害虫。木材供细工用。

华杜仲藤 华胶藤、结衣藤

Parabarium chinense Tsiang

十万大山。

橡胶植物。胶乳可制鞋底等橡胶制品。全株强壮补腰；治跌打，风湿，功用近毛杜仲藤。

红杜仲藤 陶林模、红喉崩

***P. chunianum* Tsiang**

十万大山。

全株入药，功用近毛杜仲藤。橡胶植物，胶乳可制鞋底等橡胶制品。

两广杜仲藤 乳汁藤

***P. handelianum* Tsiang**

十万大山、苍梧。

全株入药，功用近毛杜仲藤。橡胶植物，胶乳可制橡胶制品。

毛杜仲藤 大白皮胶藤、白喉崩、麦卡吐、引汁藤、鸡头藤

***P. huitingii* Chun et Tsiang**

陆川、十万大山、南宁、大明山、宁明、龙州、苍梧、大瑶山、融水、三江、兴安、临桂、永福、凤山。

根、藤祛风活络，强腰壮骨；治肾虚腰痛，扭伤，骨折，风湿关节炎。

兽医用老茎治牛软筋症。橡胶植物，胶乳可制鞋底等橡胶制品。

杜仲藤 老鸦嘴藤、白皮胶藤、小白皮胶藤、白杜仲藤、白喉崩

***P. micranthum* (Wall.) Pierre**

十万大山、博白、苍梧、临桂、大瑶山、龙州、靖西、百色。

全藤入药，功用近毛杜仲藤。橡胶植物，胶乳可制橡胶制品。

棱蕊同心结

***Parsonsia goniostemon* H.-M.**

龙州、河池。

● **鸡蛋花**

***Plumeria rubra* L.**

var. *acutifolia* (Poir.) Bail.

(*P. acuminata* Ait.)

常栽作庭园绿化植物。花清热利湿，润肺止咳；治菌痢，肝炎，

Pottsia-Rauvolfia

气管炎，咳喘，肺炎，消化不良，小儿疳积。花代茶，叫鸡蛋花茶。鲜花可提芳香油，用作皂用香精或香脂等香精的原料。

大花腰鼓藤

Pottsia grandiflora Markgr.

苍梧、大瑶山、罗城、全州。

麻子藤

P. laxiflora (Bl.) O.Ktze.

十万大山、大瑶山、龙州、横县、贵县、苍梧、平乐、永福。
全株浸酒，治风湿腰痛。根治贫血。橡胶植物。

毛麻子藤

P. pubescens Tsiang

凌云。

阔叶萝芙木

Rauvolfia latifrons Tsiang

龙州、那坡。

根、茎接骨，又治风湿。

●蛇根木 印度萝芙木

R. serpentina (L.) Benth. ex Kurz

南宁、桂林。

根、叶清热，凉血解毒，降压。

四叶萝芙木

R. tetraphylla L.

南宁有栽培。

萝芙木 矮青木、马蹄根、野辣椒

R. verticillata (Lour.) Baill.

区内各地。

根、叶清热，凉血解毒，降压；治高血压，头痛，跌打，蛇伤，失眠，

眩晕，癫狂，刀伤出血，喉痛，腰痛，急性肝炎，疟疾，胃痛。
叶、根、皮作兽药；治牛跌打断骨。

海南萝芙木

R. verticillata (Lour.) Baill.

var. *hainanensis* Tsiang

马山。

全株治高血压。

百色萝芙木☆ 倒披针叶萝芙木

R. verticillata (Lour.) Baill.

var. *oblanceolata* Tsiang

百色。

全株治高血压。

药用萝芙木

R. verticillata (Lour.) Baill.

var. *officinalis* Tsiang

天等、龙州、德保、靖西。

全株治风寒感冒，头痛，骨痛，胃痛，肚痛，咳嗽，蛇伤。

红果萝芙木

R. verticillata (Lour.) Baill.

var. *rubrocarpa* Tsiang

凌云。

云南萝芙木

R. yunnanensis Tsiang

龙州、靖西。

根治癣疥。

毛药藤

Sindechites henryi Oliv.

凌云。

羊角拗 羊角扭

Strophanthus divaricatus (Lour.) Hk. et Arn.

苍梧、梧州、昭平、藤县、贺县、富川、平乐、桂林（栽培）、
容县、陆川、博白、合浦、十万大山、武鸣、马山、柳州、河池。

叶、种子有剧毒，入药，强心消肿，止痒杀虫；外用治跌打，癰
疥，风湿，小儿麻痹后遗症，多发性脓肿，蛇伤，骨折，赘
疣。作兽药，全株杀虫止痒，洗癰疥，泻下通便，催产；根治
跌打骨折。全株作农药，可防治三化螟幼虫蛾、稻瘿蝇和地下
害虫。全株可毒雀和老鼠。种毛很柔软，可作枕褥的填充物。

●黄花夹竹桃

Thevetia peruviana (Pers.) K.Schum.

梧州、柳州、灵山、桂林。

树液、种子、花、根、茎皮、叶都有毒，含多种强心甙，叶入药，
有强心作用。种子油亦有毒，可制肥皂和鞣革用油。

腋花络石☆

Trachelospermum axillaris Hk f.

全州、龙胜、临桂、罗城、南丹、隆林。

川西络石☆

T. bodinieri (Lévl.) Woods.

凌云。

短柱络石☆

T. brevistylum H.-M.

全州、罗城、大瑶山。

贵州络石☆

T. dunnii Lévl.

凌云。

细柄络石☆

T. gracilipes Hk f.

大瑶山、柳州、贺县、隆林。

络石

T. jasminoides (Lindl.) Lem.

区内各地。

藤祛风散热，活血通络；治风湿痹痛，痈肿，刀伤，腰痛，肺结核，吐血。兽医用老茎治牛风湿症，软脚症，跌打断骨等。韧皮纤维可制人造棉、绳索，造纸。花可提取芳香油。种子棉毛可作枕褥等填充物。亦栽植供庭园绿化用。

组子花

Vallaris grandiflora Hemsl. et Wils.

柳州。

海南倒吊笔

Wrightia hainanensis Merr.

南宁、扶绥、宁明、凌云、贺县。

两广倒吊笔☆

W. hainanensis Merr.

var. *chingii* Tsiang

十万大山、龙州、横县、藤县、罗城、南丹、天峨、凌云、那坡、临桂。根、叶止血；治刀伤，跌打。

倒吊笔

W. pubescens R. Br.

百色、龙州、大瑶山、北流、陆川、博白、合浦、钦州。

根、茎的皮部祛风活络，散结化痰；治颈淋巴结核，风湿关节炎，腰腿痛，慢性支气管炎，黄疸肝炎，肝硬化腹水。作兽

Wrightia-Calotropis

药，治痰多咳嗽，淋巴结炎，风湿关节痛等症。木材不易裂，宜作轻巧的上等家具、天花板、门、窗、铅笔杆、乐器、板鞋等。韧皮纤维可制人造棉，造纸。绿化树种。

广西倒吊笔

W. schlechteri Lévl.

凌云、百色、靖西、龙州。

毛倒吊笔

W. tomentosa Roem. et Schult.

横县、宁明、龙州、田林、隆林。

韧皮纤维可造纸。

231 萝 藦 科 ASCLEPIADACEAE

毛冠藤

Adelostemma gracillimum (Wall.) Hk.f.

百色、武鸣、平乐。

●莲生桂子花 马利筋

Asclepias curassavica L.

常栽培庭园绿化植物。全草、叶、花活血调经，消炎止痛，生肌；治月经不调，崩漏带下，扁桃体炎，肺炎，支气管炎，膀胱炎，尿道炎，感冒，刀伤。根为催吐、缓下剂。种子毛可作褥垫等填充物。

食用短梗藤

Brachystelma edulis Coll. et Hemsl.

南宁。

块根润肺。

牛角瓜

Calotropis gigantea (L.) Dryand

宁明、南宁。

茎皮纤维可供造纸、制绳索及人造棉。种子毛可作填充物。叶可止咳。根皮可治癩及梅毒。根、茎、叶、树液均有毒，含剧烈毒性和强烈刺激性的牛角瓜碱。

蜂出巢

Centrostemma platypetalum Merr.

(*C. multiflora* Chun, non Decne.)

十万大山。

狭瓣吊灯花

Ceropegia trichantha Hemsl.

(*C. angustilimba* Merr.)

凌云。

全株治癩癣。

古钩藤 牛奶藤

Cryptolepis buchanani Roem. et Schult.

南宁、武鸣、大新、宁明、龙州、靖西、那坡、田阳、凌云、百色、隆林。

根、果发散，止鼻血，催乳；治乳癌，衄血。全藤可扭制绳索。

种子毛可作垫褥等填充物。

白叶藤 七娘藤

C. sinensis (Lour.) Merr.

玉林、容县、博白、苍梧、昭平、十万大山、横县、龙州、靖西、柳州。

全株凉血败毒，通乳；治蛇伤，跌打，刀伤，疮疥。

海南杯冠藤

Cyathella insulana (Hance) Tsiang et Zhang

(*Cynanchum insulanum* Hance)

北海涠洲岛。

Cynanchum

白薇

Cynanchum atratum Bunge

全州、临桂、贺县、柳州、马山、乐业、隆林。

根清血热，利小便，消炎，止咳；治阴虚内热，产后虚烦，小便淋沥，肺结核潮热，支气管炎，风湿痛。作兽药，治牛慢性炭疽病。

耳叶牛皮消

C. auriculatum Royle

龙州、凌云、罗城、大苗山、柳州。

根清热解毒，消肿止痛；治痢疾，腹胀疼痛，小儿高热，蛇伤，疗毒。

牛皮消

C. caudatum Maxim.

龙胜。

根消积利水，祛风解毒；治肾炎，水肿，胃溃疡，胃炎，白带多，肝硬化腹水，便血。

刺果牛皮消☆ 小刺瓜

C. corymbosum Wight

阳朔、永福、临桂、大瑶山、容县、宁明、乐业、隆林。

粉绿牛皮消 荒花叶白前、水竹消

C. glaucescens (Decne.) H.-M.

昭平、全州。

根行气消积，健脾和胃，清肺化痰；治胃痛，疟疾，跌打，咳嗽。

广西牛皮消

C. kwangsiense Tsiang

罗城。

八叶牛皮消

C. octophyllum Schneid.

罗城、大瑶山。

水结草

C. simplex Tsiang

全州、资源、龙胜、临桂、大瑶山。

狭叶牛皮消 水杨柳

C. stauntonii (DC.) H.-M.

兴安、大瑶山。

根清肺热，化痰止咳；治肺热咳嗽，痰多，胸闷。又解砒中毒或
666中毒。

轮叶牛皮消

C. verticillatum Hemsl.

南丹。

假瓜子金

Dischidanthus urceolatus (Decne.) Tsiang

南瓜子金

Dischidia australis Tsiang

桂南。

全株清热解毒，补气血，消肿毒；治哮喘，咳嗽，湿疹，疮痒，
关节炎。

瓜子金 石仙桃

D. chinensis Champ. ex Benth.

龙州、南宁、靖西、那坡、隆林、东兰、十万大山、博白。

藤、叶清肺化痰，凉血解毒；治肺燥咳血，疔疮肿毒，小儿疳
积，跌打肿痛，蛇伤，痢疾。

金瓜核藤

D. esquirolii (Lévl.) Tsiang

十万大山、龙州、武鸣、靖西、隆林、柳州、罗城、河池。

越南瓜子金

D. tonkinensis Coste

龙州、靖西。

广西长梗藤☆

Dolichostelma kwangsiensis Tsiang, ined.

隆林。

纤冠藤

Gongronema nepalense (Wall.) Decne.

苍梧、龙州、凌云。

全株通乳，又治子宫下垂。韧皮纤维可织麻袋，造纸。

天星藤 年藤

Graphistemma pictum (Champ.) Benth. et Hk f.

十万大山、博白、容县、苍梧、东兰、天峨。

全草驳骨，催乳；治跌打。

匙羹藤

Gymnema alterniflorum (Lour.) Merr.

(*G. affine* Decne.)

钦州、梧州、贺县、桂平、贵县、北流、博白、横县、南宁、崇左、宁明、龙州、柳州。

全株外用，止血生肌；治枪弹创伤；又能杀虱。

番禺匙羹藤 无香藤

G. inodorum (Lour.) Decne.

龙州、十万大山、大瑶山。

染色无香藤

G. tingens (Roxb.) Spreng.

隆林。

翅脉百灵藤☆ 醉魂藤

Heterostemma alatum (Wall.) Wight

龙州、大瑶山、灵川、兴安。

黔桂百灵藤☆ 黔桂醉魂藤

H. esquirolii (Lévl.) Tsiang

百色、凌云。

广西百灵藤☆ 广西醉魂藤

H. renchangii Tsiang

龙州、罗城、阳朔。

灵山百灵藤☆

H. tsoongii Tsiang

阳朔。

较剪藤 金丝花

Holostemma annularis (Roxb.) K.Schum.

西林。

球兰 玉蝶梅

Hoya carnosa (L.) R.Br.

龙州、宁明。

全草清热解毒，补虚下乳；治肺炎，麻疹高热，关节炎，睾丸炎，痈疔，乳汁不下，目赤肿痛。作兽药，治牛关节肿痛，肝胆火热，外敷疮痍疔肿。常栽培供庭园绿化用。

陵水球兰

H. fungii Merr.

龙州、凌云、乐业。

全株驳骨，又治跌打。

Hoya-Huthamnus

褐色球兰

H. fusca Wall.

十万大山。

剑叶球兰

H. lancilimba Merr.

百色。

狭叶球兰☆

H. lancilimba Merr.

forma tsoi (Merr.) Tsiang

十万大山、大瑶山、永福、上林、靖西、凌云。

全株驳骨消肿；治跌打，刀伤。

三脉球兰☆

H. pottsii Traill

(*H. obscurinervia* Merr.)

灵山、陆川、博白。

毛球兰

H. villosa Cost.

十万大山、大瑶山、扶绥、龙州、靖西、凌云、东兰、河池、融水。

叶治跌打。

滇球兰

H. yunnanensis H.-M.

南丹。

滇桂茶药

Huthamnus pilosus (Kerr) Tsiang

(*H. sinicus* Tsiang)

十万大山。

牛奶菜

Marsdenia cambodiensis Cost.

博白、桂平、贵县。

根补精，通乳，强壮，补气血；治气虚。

光牛奶菜☆

M. glabra Cost.

柳州。

两广牛奶藤

M. koi Tsiang

凌云。

黔桂牛奶藤

M. pseudotinctoria Tsiang

南丹和贵州交界。

肖牛耳藤

M. tinctoria (Roxb.) R.Br.

十万大山、扶绥、龙州、靖西、百色、隆林、临桂。

乳汁有毒。果治心胃气痛。叶含蓝靛，可作染料，国外已栽作为染料原料之一。韧皮纤维可织粗布，制绳和渔网。种子毛可作枕褥等填充物。

短梗牛奶藤☆

M. tinctoria (Roxb.) R.Br.

var. *brevis* Cost.

龙州、凌云、阳朔。

华萝藦

Metaplexis hemsleyana Oliv.

永福、南丹、凌云。

Myriopteron-Pycnostelma

多翅果☆

Myriopteron extensum (Wight) K.Schum.

隆林。

尖槐藤

Oxystelma esculentum (L.f.) R.Br.

龙州、大明山、东兰。

根治跌打；叶治蛇伤。

南石萝藦☆ 假了刁竹

Pentasacme championi Benth.

东兴、容县、武鸣、临桂、兴安。

全株清热，解毒；治肝炎，风火眼痛。

青蛇藤

Periploca calophylla (Wight) Falc.

南丹、乐业。

茎治蛇伤，腰痛，风湿麻木，跌打损伤。韧皮纤维可制绳，造纸。

西南杠柳☆

P. forrestii Schltr.

靖西、田阳、凌云、乐业。

茎、叶清凉止血；治跌打骨折，伤寒，劳伤，疟疾。

了刁竹 瑶山竹、山刁竹、徐长卿、蛇蒴草

Pycnostelma paniculatum (Bunge) K.Schum.

全州、资源、龙胜、临桂、桂林、贺县、玉林、大瑶山、大苗山、邕宁、凌云等地。

全草祛风利湿，行气止痛；治蛇伤，胃痛，牙痛，肝硬化，腹水，癌肿，风湿痛，小儿疳积，痛经。作兽药，治蛇伤，痢疮，疔疖，无名肿毒，跌打，风湿肿痛。

小花四粉块藤☆ 小花青藤

Secamone minutiflora (Woods.) Tsiang

(*Tylophora minutiflora* Woods.)

凌云。

华四粉块藤☆ 细叶青藤

S. sinica H.-M.

临桂、阳朔、柳州、大苗山、罗城、东兰、南丹、武鸣、大新、
龙州、田阳、乐业、贵县。

叶强筋壮骨，补精，催乳。

须药藤

Stelmatocrypton khasianum (Benth.) H.Baill.

那坡、隆林。

全草祛风解表，温中行气，止痛；治感冒，流感，头痛，咳嗽，
气管炎，胃痛，食积气胀。根可提制芳香油，供调配香精。

两广千金子藤☆

Stephanotis chunii Tsiang

十万大山、大瑶山。

华千金子藤☆

S. mucronata (Blanco) Merr.

(*S. chinensis* Champ. ex Benth.)

玉林有栽培。

藤补虚益气，调经；治产后虚弱，经闭，腰骨酸痛。

马连鞍

Streptocaulon griffithii Hk.f.

十万大山、横县、邕宁、南宁、武鸣、马山、宁明、龙州、那
坡、百色、凌云、都安、凤山。

根、叶清热解毒，行气止痛；治心胃气痛，痢疾，肠炎，感冒，

Streptocaulon-Toxocarpus

蛇伤，跌打，肾炎。

小马连鞍

S. juvenas (Lour.) Merr.

那坡、龙州、十万大山。

广东夜来香

Telosma cathayensis Merr.

平果。

●夜香花☆

T. cordatum (Burm.f.) Merr.

常栽培作庭园绿化植物。根、花平肝清目；治眼热，去膜。花亦可和肉作菜。

褐毛弓果藤☆

Toxocarpus fuscus Tsiang

博白、武鸣、扶绥。

南弓果藤

T. himalensis Falc. ex Hk.f.

苍梧、横县、大瑶山、隆林。

卵叶弓果藤

T. ovalifolius Tsiang

钦州。

疏脉弓果藤☆

T. paucinervius Tsiang

柳州、凌云。

弓果藤 牛角藤

T. wightianus Hk. et Arn.

陆川。

宜昌娃儿藤☆

Tylophora angustiniana (Hemsl.) Craib
(*Henrya angustiniana* Hemsl.)

河池。

黑果娃儿藤 蛇花藤

T. atrofolliculata Metc.

柳州、融安、三江、罗城、马山、龙州、靖西、田阳。

全株治跌打，蛇指疮。

多花娃儿藤☆

T. floribunda Miq.

河池、柳州。

根清热明目，祛风化痰，通经散瘀，补虚益损；治火眼，虚弱，

丝虫病，小儿惊风，白喉，跌打肿痛，蛇伤，哮喘。

信宜娃儿藤☆

T. koi Merr.

大瑶山、南宁、龙州、东兰。

全株治手指疮。

广花娃儿藤

T. leptantha Tsiang

十万大山。

贵州娃儿藤☆

T. leveilleana Schltr. ex Lévl.

十万大山、田林、凌云、隆林、东兰。

绵毛娃儿藤

T. mollissima Wight

马山、靖西。

根清肺热，化痰止咳。

Tylophora-Adina

卵叶娃儿藤 三十六荡、双飞蝴蝶

T. ovata (Lindl.) Hook. et Stend.

(*T. hispida* Decne.)

陆川、平南、藤县、南宁、宁明等地。

根有小毒，止咳平喘，祛风止痛；治支气管炎，哮喘，风湿痛，跌打肿痛，蛇伤。

上思娃儿藤☆

T. renchangii Tsiang

十万大山。

小娃儿藤☆

T. tenuis Bl.

南宁、东兴、合浦。

假夜来香 假猫豆

Wattakaka volubilis (L.f.) Stapf

那坡、凌云、宁明、南宁、横县、巴马。

232 茜 草 科 RUBIACEAE

水团花

Adina pilulifera (Lam.) Fr.

区内各地。

茎皮纤维代麻用或制人造棉供棉絮用或与棉花混纺。木材作雕刻一类细工用材。根、茎提制栲胶。药用全株清热解毒，散瘀消肿；治感冒发热，上呼吸道感染，腮腺炎，肠胃炎，肝炎，浮肿，痢疾，跌打骨折，外伤出血等。兽医用根治斑痧热症，跌打刀伤，皮肤糜烂，湿痒和牛炭疽病。

大叶水团花 黄棉树

A. polycephala Benth.

龙胜、资源、全州、阳朔、临桂、大苗山、大瑶山、凤山、巴

马、东兰、凌云、平果、那坡、田林、乐业、龙州、上思、贺县、平南、合浦。

木材坚韧，为农具优良用材，宜作扁担。

光叶水团花☆ 青榨木

A. polycephala Benth.

var. *glabra* How

兴安、全州、大苗山、平南、上思。

用途同上。

水冬瓜 鸡仔木

A. racemosa Miq.

临桂、桂林、融安、天峨、罗城、靖西、平果、百色、龙州。

茎皮纤维代麻制绳，织麻袋，制人造棉供棉絮及土纺用，又作造纸原料。木材轻韧，最适合于制牙签和火柴杆等。

小叶水团花☆ 串鱼木、水杨梅

A. rubella Hance

桂林、临桂、永福、兴安、灌阳、平乐、昭平、梧州、南宁、龙州、罗城、宜山、贵县。

茎皮纤维代麻制绳，织袋，造纸，制人造棉。根和树皮可提制栲胶。

药用根治小儿惊风。兽医用根治牛臃胀症，转圈症，喉风症等。

臭假耳草☆

Anotis ingrata (Wall.) Hk.f.

龙胜、阳朔、临桂、昭平。

全株治毒蛇咬伤。

广东假耳草

A. kwangtungensis Merr. et Metc.

龙胜。

滇桂假耳草

A. wightiana (Wall.) Hk.f.

桂西北。

团花

Anthocephalus cadamba (Roxb.) Miq.

龙州。

假蛇舌草☆ 波利亚草

Borreria stricta (L.f.) G.F.W.Mey

龙州、藤县。

铁屎米

Canthium dicoccum (Gaertn.) Merr.

上思、龙州、那坡、靖西、天峨、南丹、平乐、阳朔、桂林。

木材可供建筑、船舰、车辆、枕木用，民间常用作水车脚和扁担等物。

刺鱼骨木☆

C. horridum Bl.

罗城、平南、龙州、隆林。

树皮治赤痢。叶治手指生疮，肺癆。

小叶铁屎米

C. parvifolium Roxb.

平南、隆林、上林、龙州。

根驱虫。

似铁屎米

C. simile Merr. et Chun

龙州、武鸣、扶绥、靖西、田林、都安。

根、茎、叶驳骨。木材适宜作梁、柱、桁、桷、门窗、农具、板料等。

风箱树

Cephalanthus occidentalis L.

大瑶山、柳州、南宁、宁明、横县、临桂、桂林、梧州、田阳。

本树种不怕水淹，宜作固堤植物。根、叶、花清热利湿，收敛止泻，

祛痰止咳；治感冒发热，肺热咳嗽，风火牙痛，咽喉肿痛，肠炎

腹泻，菌痢等。兽医用根治牛、猪热泻，咽喉肿痛，痰多咳嗽。

假九节木☆ 柴沙利

Chasalia curviflora Thew.

隆林、田林、龙州、平南。

根治风湿，肺炎，耳疾，眼疾，喉痛。

●金鸡纳

Cinchona succirubra Pav.

南宁。

树皮镇痛解热，抗疟；治疟疾，高热。也可作苦味健胃剂。

●咖啡

Coffea arabica L.

桂南各地农场。

种子加工(炒)后作饮料。干燥成熟的种子作药用有兴奋、利尿之效。种子和叶又是提制咖啡碱的原料。

●大粒咖啡

C. robusta Lindl.

龙州。

狭叶绣花针

Damnacanthus angustifolius Hayata

临桂、南丹、那坡。

绣花针 虎刺、伏牛花

D. indicus Gaertn.f.

Damnacanthus-Galium

全州、临桂、资源、桂林、阳朔、柳州、柳城、钦州。

全株清热解毒，行血祛风，消肿利尿；治急慢性肝炎，结合膜炎，感冒咳嗽，跌打内伤，风湿骨痛，脾虚浮肿，小儿疳积。

大叶绣花针☆

***D. macrophyllus* Sieb. ex Miq.**

那坡。

小叶绣花针☆

***D. major* S. et Z.**

南宁。

长柱山丹

***Duperrea pavetaefolia* (Kurz) Pitard**

龙州、宁明。

香果树

***Emmenopterys henryi* Oliv.**

龙胜、兴安、隆林、大新。

茎皮纤维可作蜡纸及人造棉原料。木材制家具用。本树种耐涝，宜作固堤植物。

拉拉藤 猪殃殃

***Galium aparine* L.**

忻城、大苗山、柳州、凌云。

全草活血行瘀；治跌打扭伤，劳伤胸痛，痛经，乳腺癌，疔疮，牙疳，眼生白翳等。根可提取红色染料。

粗叶拉拉藤☆

***G. asperifolium* Wall.**

大苗山、隆林、凌云、乐业。

四叶拉拉藤☆

G. bungei (Bl.) Steud.

隆林、柳州、龙胜、东兰。

全株接筋。

腺叶拉拉藤

G. glandulosum H.-M.

柳州、凌云。

宽叶拉拉藤☆

G. kamtschaticum Stellar

凌云、乐业。

海南黄梔

Gardenia hainanensis Merr.

大苗山、上思、十万大山。

梔子 山枝、枝子

G. jasminoides Ellis

区内各地。

花提制芳香浸膏，用于化妆品和香皂香精调合剂。果提取黄色染料，供食品和纤维染色用。果、根清热泻火，利尿消肿，凉血止血；治黄疸肝炎，感冒高热，肾炎水肿，菌痢，乳腺炎，淋巴结核，吐血，衄血，尿血，烫火伤等。作兽药治牛肺炎，喉风症，红白痢，猪瘟，马肺病等。

●白蟬 梔子花

G. jasminoides Ellis

var. *fortuniana* Lindl.

桂林、柳州、南宁等市。

为绿化用栽培花木。花亦可提制芳香浸膏。

狭叶梔子☆

G. stenophylla Merr.

上思。

爱地草

Geophila herbacea (L.) O.Ktze.

龙州、昭平。

全株消肿排脓。

土连翘 网膜木

Hymenodictyon flaccidum Wall.

龙州、靖西。

龙船花

Ixora chinensis Lam.

柳州、邕宁、南宁、龙州、桂林、合浦、凌云、苍梧。

全株活血散瘀，清热解毒；花治月经不调，闭经，高血压；根治肺结核咳嗽，咯血；茎、叶治跌打损伤，瘀血疼痛，疮疖肿痛等。兽医用治跌打，疮疡等症。

白龙船花

I. henryi Lévl.

区内各地。

绿化花木。

长叶龙船花☆

I. nienkui Merr. et Chun

上思、龙州、龙胜。

假红芽大戟☆

Knoxia corymbosa Willd.

临桂、象州、邕宁、南宁、宁明。

红芽大戟

K. valerianoides Thorel ex Pitard

(*K. corymbosa* auct., non Willd.)

邕宁。

根泻水，通便；治水肿胀满，痰饮积聚。

尖叶粗叶木☆ 尖叶鸡矢树

Lasianthus acuminatissimus Merr.

桂西北。

粗叶木

L. chinensis (Champ.) Benth.

上思、南宁、容县、北流。

叶治黄疸湿热症。

罗浮粗叶木☆

L. fordii Hance

苍梧、宁明、平南。

光粗叶木☆

L. glaberrima Chun

桂林、临桂、龙胜、全州。

福建粗叶木☆

L. hartii Fr.

桂林、临桂、龙胜、恭城、全州、大苗山、大明山、昭平、蒙山、南丹、东兰、凌云、靖西、那坡、上思。

叶治刀伤。

云南粗叶木☆

L. henryi Hutch.

大苗山、靖西、田林、那坡、凌云、昭平、蒙山。

Lasianthus

广西粗叶木

L. kwangsiensis Merr. et H.L.Li

上思。

广东粗叶木☆

L. kwangtungensis Merr.

平南、博白、龙州。

披针叶粗叶木☆

L. lancilimbus Merr.

武鸣、大苗山、容县、平南、龙胜、靖西。

两广粗叶木

L. lei Merr. et Metc.

长尾粗叶木☆

L. longicauda Hk.f.

凌云、乐业、大瑶山、大苗山、兴安、龙胜、容县。

小花粗叶木☆

L. micranthus Hk.f.

大瑶山。

八脉粗叶木☆

L. octonervius H.-M.

百色。

西南粗叶木☆

L. sikkimensis Hk.f.

桂西北。

上思粗叶木☆

L. tsiangii Merr. ex H.L.Li

上思。

小叶鸡屎树

L. wallichii Wight

(*L. plagiophyllus* Hance)

藤县、博白、上思、巴马、横县、龙州、宁明、扶绥。

根舒筋活血；治跌打。

假野丁香☆

Leptodermis affinis How, ined.

龙州、德保、那坡、靖西、南丹、临桂。

卵叶野丁香☆

L. ovata H. Winkl.

阳朔、临桂、那坡。

桂丁香

Luculia intermedia Hutch.

德保、靖西、河池、凤山。

叶消肿；治跌打。

小滇丁香

L. minor Chun et How

田阳、那坡、靖西、德保、天峨。

毛鸡眼藤☆

Morinda cochinchinensis DC.

贺县、龙州、桂平、博白。

根驱风，止咳。

巴戟天 鸡肠风

M. officinalis How

上思、龙州、宁明、大新、靖西、玉林、苍梧、贺县、临桂、大苗山。

根补肾壮阳，强筋骨，祛风湿；治肾虚腰酸，痿痹瘫痪，风湿骨

痛，神经衰弱，阳萎，遗精，早泄，失眠，宫寒不孕。

鸡眼藤 黑藤钻、糠藤、三角藤、羊角藤

M. umbellata L.

区内各地。

根消肿去毒，祛风湿。兽医治牛、猪皮肤疮疥，炭疽病，猪丹毒等症。

异形玉叶金花☆

Mussaenda anomala H L.Li

大瑶山。

密花玉叶金花☆

M. densiflora H.L Li

龙州。

散玉叶金花

M. divaricata Hutch.

临桂、龙胜、大瑶山、融安、大苗山、三江、河池、南丹、天峨、田林、隆林、平果、南宁、武鸣、昭平、苍梧、贵县。

长玉叶金花☆

M. elongata Hutch.

那坡。

啮状玉叶金花 胶鸟藤

M. erosa Champ.

武鸣、龙州、宁明、横县、上思、桂平、平南、东兰、田阳、大瑶山、桂林。

枝叶清热，消炎，解热毒；治疮疥，热积。茎皮纤维代麻制绳及织麻袋。根捣烂加水过滤的胶液可粘捕麻雀、老鼠、野兔。还可做造纸糊料。

贵州玉叶金花☆

M. esquirolii Lévl.

全州、兴安、龙胜、临桂、桂林、资源、永福、象州、大瑶山、
大苗山、贺县、容县、平南、龙州、凌云。

云南玉叶金花☆

M. henryi Hutch.

龙州。

硬毛玉叶金花☆ 半夜开门

M. hirsutula Miq.

广西玉叶金花☆

M. kwangsiensis H.L.Li

大瑶山。

长萼玉叶金花☆

M. longisepala Chun et How

象州、大瑶山、大苗山、河池、东兰、龙州、都安、扶绥、田林。

大叶玉叶金花

M. macrophylla Wall.

南宁、永福、恭城、大瑶山。

玉叶金花

M. pubescens Ait.f.

区内各地。

藤、叶清热解毒，消暑利湿；治流感，中暑，支气管炎，扁桃腺炎，咽喉炎，肾炎水肿，肠炎腹泻，毒蛇咬伤等。兽医用治风热感冒，口舌生疮，伏热中暑，外洗疮疡。茎皮纤维代麻制绳作缆。根捣烂滤取胶液作造纸糊料。

腺萼木

Mycetia sinensis Craib

Myrioneuron-Oldenlandia

苍梧、容县、龙州、大瑶山。

根除湿，利大小便。

密脉木☆

Myrioneuron faberi Hemsl.

天峨、河池、南丹、都安、田林、隆林、德保、那坡、百色、永福、恭城、阳朔、龙州、三江。

中越密脉木☆

M. tonkinensis Pitard

宁明、龙州。

药乌檀

Nauclea officinalis Pierre ex Pitard

大瑶山、平南。

木材适于造上等家具及作建筑板料。枝和树皮清热解毒，消肿止痛；治急性扁桃体炎，咽喉炎，乳腺炎，肠炎，菌痢，胆囊炎，下肢溃疡，疖肿，脚癣湿疹等。

薄柱草

Nertera sinensis Hemsl. ex Forbes et Hemsl.

大苗山、罗城、龙胜。

耳草

Oldenlandia auricularia (L.) F. Muell.

梧州、玉林、博白、容县、贵县、南宁、邕宁、龙州、宁明、崇左、兴安、桂林、平果。

全草清热解毒，散瘀消肿；治感冒发热，肺热咳嗽，咽喉痛，肠炎痢疾，疮疖肿毒，乳痈，湿疹，跌打损伤。兽医用以治牛、猪热症，牛瘟，牛腹胀，牛锁喉，蛇伤，蜈蚣伤，刀伤出血，大便出血，疮疡等。

二花耳草

O. biflora L.

梧州。

尾叶耳草☆

O. caudatifolia (Merr. et Metc.) Chun, in herb.

上思、南宁、平南。

黄毛耳草 铺地蜈蚣

O. chrysotricha (Palib.) Chun

桂林、临桂、全州、兴安、龙胜、永福、大苗山、大瑶山、玉林。

全株消肿止血；治刀伤，蛇伤；又治牛挫伤，跌伤等。

繖房花耳草

O. corymbosa L.

梧州、富川、钟山、南宁、横县、龙州、宁明、桂林。

全株消肿去毒；治蛇伤，功近白花蛇舌草。

中肋耳草☆

O. costata (Roxb.) K.Schum.

武鸣大明山。

白花蛇舌草 小竹叶菜、一摸消

O. diffusa (Willd.) Roxb.

大苗山、大瑶山、柳城、贵县、苍梧、桂林、兴安。

全草清热解毒，利尿消肿；治毒蛇咬伤，尿路感染，阑尾炎，痢疾，肝炎，癌症，痈疖，咽喉炎，扁扁桃体炎，小儿疳积，小儿惊风，跌打损伤。兽医治一切疮疡，喉肿，喉痛，蛇伤，跌打，出血性败血症。

牛白藤

O. hedyotideia (DC.) H.-M.

区内各地。

Oldenlandia

全草清热解毒，祛风除湿，活血通络；治中暑，感冒咳嗽，胃肠炎，痔疮出血，痈疮肿毒，皮肤湿疹，跌打损伤，风湿骨痛。兽医用治牛、猪湿热泄泻，尿少尿短，风热感冒。根捣烂滤取胶汁作造纸糊料。

丹草

***O. herbacea* (L.) Roxb.**

兴安、桂林。

粗叶耳草

***O. hispida* Poir.**

武鸣、马山、百色、田林、隆林、凌云、天峨、昭平、梧州。

全草止呕，杀虫；治肺癆咳血，痢疾。兽医用治牛牙龈肿烂，口舌生疮。

剑叶耳草 少年红

***O. lancea* (Thb.) O.Ktze.**

玉林、博白、容县、平南、大瑶山、永福、临桂、阳朔、恭城、灌阳、藤县、昭平、贺县。

全草祛风，止血；治小儿疳积，五劳七伤。根、茎治肺病，咳嗽，哮喘，支气管炎，跌打。

长突耳草☆

***O. longiexserta* (Merr. et Metc.) Chun, in herb.**

上思。

全株治眼热。

两广耳草☆

***O. matthewii* (Dunn) Chun**

苍梧、大苗山、永福。

光叶耳草

***O. mellii* (Tutch.) Dunn**

兴安、全州、临桂、桂林、龙胜。

松叶耳草

O. pinifolia (Wall.) K.Schum.

玉林、陆川、贺县、那坡、钦州。

全草清热止血，散结消肿；治潮热，小儿疳积。功近纤花耳草。

山耳草

O. platystipula (Merr.) Chun

(*Hedyotis platystipula* Merr.)

桂西北。

全草治妇女风肿，骨痛。

鼎湖耳草☆

O. pterita (Bl.) Miq.

龙州。

纤花耳草

O. tenelliflora (Bl.) O.Ktze.

大瑶山、大苗山、兴安、龙胜、桂林、容县、龙州、凌云、田林、梧州。

全草清热解毒，消肿止痛；治毒蛇咬伤，肺热咳嗽，跌打损伤，刀伤出血，小儿疳积。

方茎耳草

O. tetragonalis (Korth.) Merr.

博白。

全株治热症。

长节耳草

O. uncinella (H. et A.) O.Ktze.

柳州、大瑶山、临桂、龙胜、兴安、桂林、昭平、苍梧、玉林、容县。

全草治蛇伤，风湿，小儿腹泻。

糙叶长节耳草

O. uncinella (H. et A.) O.Ktze.

var. *scabrida* (Fr.) Chun

南宁。

叶凉血。

大蛇根草☆ 蚂蚁菜

Ophiorrhiza cantoniensis Hance

大苗山、大瑶山、龙胜、临桂、全州、阳朔、桂林、平南、容县、
藤县、昭平、龙州、横县、扶绥、凌云、田林、凤山、天峨。
全草作猪饲料。

中蛇根草☆

O. japonica Bl.

蒙山、昭平、梧州、大苗山、融安、永福、临桂、龙胜、兴安、
全州、凌云、田林、百色、德保、东兰、龙州。

广西蛇根草☆

O. kwangsiensis Merr. ex H.L.Li

十万大山。

木质蛇根草

O. lignosa Merr.

南丹。

透明蛇根草☆

O. pellucida Lévl.

南丹。

小蛇根草☆

O. pumila Champ.

大瑶山、藤县、龙州、隆林、凌云。
根、叶消肿去毒。

滇桂蛇根草☆

O. succirubra King ex Hk.f.

大瑶山、上思。

圆叶鸡矢藤 山豆叶

Paederia cavaleriei Lévl.

临桂、桂林、龙胜、大瑶山、大苗山、罗城。

广西鸡矢藤☆

P. pertomentosa Merr. ex H.L.Li

南丹、临桂。

鸡矢藤 牛皮冻

P. scandens (Lour.) Merr.

(*P. chinensis* Hance)

区内各地。

全草消食化积，化痰止咳，祛风除湿，散瘀解毒；治小儿疳积，胃痛腹胀，支气管炎，百日咳，肺结核咳嗽，肝炎；痢疾，风湿骨痛，跌打损伤，毒蛇咬伤。茎皮纤维作造纸和人造棉原料。兽医用全草治牛腹胀，小猪白痢，跌打骨折，蛇虫咬伤。

毛鸡矢藤

P. scandens (Lour.) Merr.

var. *tomentosa* (Bl.) H.-M.

(*P. tomentosa* Bl.)

大瑶山、临桂、龙胜、资源、贺县、南丹、凤山、平果、龙州、博白、玉林。

全草解毒，健胃；治黄疸，疟疾，腹痛，消化不良。

云南鸡矢藤

P. yunnanensis (Lévl.) Rehd.

(*Cynanchum yunnanensis* Lévl.)

Pavetta-Prismatomeris

凌云、乐业、百色、龙州。

茜木 猪屎栏、大沙叶

Pavetta hongkongensis Brem.

(*Tarenna kwangsiensis* H.-M.)

永福、兴安、临桂、阳朔、平乐、恭城、大苗山、大瑶山、田林、
天峨、苍梧、蒙山、博白、容县、上思、宁明、龙州、宾阳。

多花茜木

P. polyantha R.Br.

大苗山、大瑶山、容县、上林、武鸣、靖西、隆林。

西南三角瓣花☆

Prismatomeris henryi (Lévl.) Rehd.

临桂、龙胜、凌云、乐业、东兰。

叶治跌打。

黔桂三角瓣花☆

P. labordei (Lévl.) Merr.

(*Lasianthus labordei* (Lévl.) Rehd.)

桂西北、龙胜。

三角瓣花

P. linearis Hutch.

龙胜、资源、灌阳、融安、大瑶山、大苗山、那坡、凌云、乐业、靖西、德保、上思、容县。

四蕊三角瓣花 黄根

P. tetrandra (Roxb.) K.Schum.

上思、陆川、博白。

治再生障碍性贫血，亚急性粒细胞白血病。对溶血性贫血、地中海贫血及肝炎亦有一定疗效。

九节 刀枪木、山大颜

Psychotria rubra (Lour.) Poir.

(*P. elliptica* Ker)

区内各地。

根、叶清热解毒，祛风除湿，接骨生肌；治感冒发热，扁桃腺炎，咽喉炎，白喉，风湿骨痛，腰肌劳损，跌打损伤，骨折，毒蛇咬伤，疮疡肿毒，疟疾，牙痛，产后风瘫。兽医用根、茎、叶治牛、猪跌打骨折，流感，高热，脑胀等症。

穿根藤

P. serpens L.

苍梧、大瑶山、上思、合浦。

全草祛风止痛，舒筋活络；治虚弱无力，风湿骨痛，腰肌劳损，四肢酸痛，小儿疳积，跌打骨折。

驳骨九节☆ 驳骨草

P. siamica (Craib) Hutch.

龙州、大新、天峨、河池、南丹、那坡、田林、平果、隆林、靖西、凌云、乐业、十万大山、凤山、东兰、阳朔、贺县。

全株清热解毒，祛风消肿，止血，止痛；治菌痢，肠炎，上感，风湿骨痛，跌打损伤，蛇伤。

灰九节

P. straminea Hutch.

十万大山。

小叶九节

P. tutcheri Dunn

上思、龙州、宁明、大苗山、大瑶山、罗城、永福、临桂、苍梧。

云南九节

P. yunnanensis Hutch.

Randia

那坡、平果。

厚叶茜草树

Randia accedens Hance

博白、平南、百色、武鸣、龙州。

多毛茜草树 黄棉木

R. acuminatissima Merr.

临桂、平乐、大瑶山、大苗山、凌云、乐业、龙州、上思、蒙山、贺县、平南。

香楠☆ 水棉木

R. canthioides Champ. ex Benth.

苍梧、藤县、大瑶山、武鸣、大明山、上林。

越南香楠☆

R. cochinchinensis (Lour.) Merr.

龙州、容县、大瑶山、大苗山、贺县、苍梧、阳朔、龙胜。

西南香楠☆

R. henryi Pritz.

全州、兴安、龙胜、临桂、永福、阳朔、三江、大苗山、大瑶山、蒙山、武鸣、大明山、龙州、凌云、乐业、南丹。

广西香楠☆

R. kwangsiensis Chun et How, ined.

田林、凌云、乐业。

白果香楠☆

R. leucocarpa Champ.

尾叶香楠☆

R. merrillii Chun

(*R. caudatifolia* Merr.)

大苗山、百色、贺县。

柳叶香楠☆

R. salicifolia H.L.Li

平南、容县。

根驳骨。叶治胃痛，筋骨痛，风湿痛。

鸡爪箬 凉粉木

R. sinensis (Lour.) Schult.

临桂、南宁、龙州、大新、宁明、上思、岑溪。

山石榴 对面花、霸泡木

R. spinosa (Thb.) Poir.

(*R. dumetorum* Lam.)

区内各地。

根利尿，驳骨，祛风湿；治跌打，腹痛。叶止血，治衄血。木材

供制家具、器具、农具、雕刻用，尤宜做扁担。果实可作农药。

果皮作洗涤原料用。又可作刺篱和绿化植物。

茜草

Rubia cordifolia L.

桂林、临桂、全州、龙胜、融安、大苗山、大瑶山、平南、百色、那坡、龙州、贺县。

根凉血止血，活血祛瘀；治月经不调，经闭腹痛，跌打损伤，瘀血肿痛。根炒炭治吐血，衄血，便血，血崩，尿血。根提取红色的茜素，用于染动物性或植物性纤维，为一种媒染性的天然染料，亦是天然的红色食用色素。茎、叶、果作农药治蚜虫、椿象等害虫。

肉叶茜草

R. cordifolia L.

var. *herbacea* Chun et How, ined.

Rubia-Schizomussaenda

隆林。

用途参阅茜草。

长叶茜草

R. cordifolia L.

var. *longifolia* H.-M.

桂西北、凌云、兴安。

用途参阅茜草。

柔毛茜草

R. cordifolia L.

var. *mollis* Chun et How

河池、龙胜。

用途参阅茜草。

狭叶茜草 土茜草、四棱草

R. cordifolia L.

var. *stenophylla* Fr.

大苗山、龙胜、兴安。

根止血止痛。全株治风湿脚气。

延叶茜草☆

R. decurrens Chun et How

南丹。

裂果金花

Schizomussaenda dehiscens (Craib) H.L.Li

南宁、龙州、大新、宁明、扶绥、上思、那坡、平果、德保、河池。

根、茎清热解毒，消炎利尿；治支气管炎，肺热咳嗽，咽喉炎，

扁桃体炎，肾炎水肿，尿路感染，声哑等。

六月雪

Serissa foetida (L.f.) Comm.

桂林、临桂、大瑶山、隆林。

全株舒肝解郁，清热利湿，消肿拔毒，止咳化痰；治急性肝炎，风湿性腰腿痛，痈肿恶疮，蛇伤，脾虚泄泻，小儿疳积，白浊，白带，目翳，阑尾炎，狂犬病等。庭园绿化。

白马骨

S. serissoides (DC.) Druce

柳州、大苗山、大瑶山、临桂、灌阳、恭城、桂林、龙胜、南宁、贺县。功近六月雪。作兽药治牛、猪跌打骨折，水泻，恶疮痈肿等。

假螺序草☆

Spiradiclis pseudocaespitosa How, ined.

河池。

中华螺序草☆

S. sinensis Chun et How, ined.

百色、南丹。

假桂乌口树☆

Tarennia attenuata Hutch.

容县、柳城、罗城、宜山、都安、东兰、靖西、平果、田阳、上林、武鸣、宁明、龙州。

叶治口疳，跌打。

白骨木

T. depauperata Hutch.

容县、柳州、扶绥、兴安、临桂、阳朔、平乐、田阳。

种子油供药用，制肥皂、润滑油用。

石楠乌口树☆

T. inserta Koorders et Valetton

Tarennia-Tricalysia

隆林、那坡。

木材适用于建筑、造桥、车、船等用，亦可作器具、农具、家具等用材。

披针叶乌口树☆

T. lancilimba How, ined.

十万大山。

乌口树 达仑木

T. mollissima (Hk. et Arn.) Robins.

(*Webera mollissima* Benth. ex Hance)

容县、苍梧、龙州、大瑶山、象州。

毛脉乌口树☆

T. pubinervis Hutch.

龙胜。

牛老药藤 流苏子

Thysanosperrum diffusum Champ.

区内各地。

茎皮纤维造纸和人造棉。

小狗骨柴

Tricalysia fruticosa (Hemsl.) K.Schum.

临桂、龙胜、永福、大苗山、象州、大瑶山、宁明、武鸣、桂平、平南、凌云、乐业、那坡、蒙山。

狗骨柴 三萼木

T. viridiflora (DC.) Matsum.

(*Diplospora viridiflora* DC.)

容县、武鸣、横县、上思、大瑶山、阳朔、永福、兴安、龙胜、全州、蒙山。

木材作器具及雕刻等细工用材。

毛钩藤

Uncaria hirsuta Haviland

龙州、马山、大瑶山、西林、田林、那坡、容县。

功近钩藤。

平滑钩藤

U. laevigata Wall.

那坡。

功近钩藤。

大叶钩藤

U. macrophylla Wall.

百色、靖西、凌云、上思、博白、上林、巴马。

功近钩藤。

膜叶钩藤

U. membranifolia How

宁明、靖西。

功近钩藤。

钩藤 桂钩藤、孩儿茶

U. rhynchophylla (Miq.) Jacks.

区内各地。

带钩的茎枝清热平肝，熄风定惊，镇静镇痉；治小儿高热抽搐、寒热、夜啼及受惊症，成年人高血压、头晕、目眩、神经性头痛。根治风湿性关节炎，坐骨神经痛。作兽药治牛臃胀、风湿、斑麻、寒湿等症。茎皮富含纤维，可作人造棉及造纸原料。

假钩藤

U. rhynchophylloides How

大瑶山、罗城。

功近钩藤。

Uncaria-Wendlandia

攀茎钩藤

U. scandens (Sm.) Hutch.

桂平、上思、龙州、宁明、横县。

功效与大叶钩藤相似。

无柄果钩藤

U. sessilifructus Roxb.

桂西北、扶绥。

根皮含鞣质，可提取栲胶。

华钩藤

U. sinensis (Oliv.) Haviland

灵川、桂林。

药用功近钩藤。

云南钩藤☆

U. wangii How

隆林。

尖叶木

Urophyllum chinense Merr. et Chun

苍梧、宁明、上思、大瑶山。

广西水锦树

Wendlandia aberrans How

那坡。

木姜子叶水锦树

W. litseifolia How

龙州、田林、靖西。

密花水锦树

W. myriantha How

上思、十万大山、龙州。

粗叶水锦树

***W. scabra* Kurz**

上思、龙州、田林、隆林。

台湾水锦树☆

***W. taiwaniana* Cowan**

藤县。

短花台湾水锦树☆

***W. taiwaniana* Cowan**

subsp. *breviflora* How

上思、武鸣、百色。

叶治跌打。

三花水锦树☆

***W. terniflora* Cowan**

宁明、扶绥、都安。

粗毛水锦树☆

***W. tinctoria* DC.**

subsp. *barbata* Cowan

武鸣大明山、田阳。

滇桂水锦树☆

***W. tinctoria* DC.**

subsp. *handelii* Cowan

武鸣大明山。

东方水锦树☆

***W. tinctoria* DC.**

subsp. *orientalis* Cowan

武鸣大明山。

Wendlandia-Xanthophytopsis

水锦树 饭汤木

W. uvariifolia Hance

大瑶山、梧州、藤县、平南、玉林、武鸣、龙州、凌云、乐业。
叶治崩漏恶疮，根治风湿跌打。

中华水锦树☆ 猪血树、饭汤树

W. uvariifolia Hance

subsp. chinensis (Merr.) Cowan

容县、玉林、横县、十万大山、苍梧。

滇黔水锦树☆

W. uvariifolia Hance

subsp. dunniana (Lévl.) Cowan

凌云、乐业、大瑶山。

圆叶水锦树☆

W. uvariifolia Hance

subsp. rotundifolia (H.-M.) Cowan

平南、龙胜。

微红水锦树

W. uvariifolia Hance

subsp. rufula Cowan

大瑶山。

百色水锦树☆

W. zooi How

百色。

广东拟黄树☆

Xanthophytopsis kwangtungensis Chun et How, ined.

十万大山。

233 忍冬科 CAPRIFOLIACEAE

糯米条

Abelia chinensis R.Br.

临桂。

花艳丽，供庭园绿化。

细叶银花

Lonicera affinis Hk. et Arn.

恭城、兴安、临桂、三江。

毛金银花 腺背忍冬

L. affinis Hk. et Arn.

var. *pubescens* Maxim.

(*L. hypoglauca* Miq.)

玉林、梧州、藤县、贺县、临桂、昭平、三江、平果、凌云、乐业、隆林、靖西、都安、马山、武鸣、邕宁、龙州、横县等地。

用途参阅山银花。

山银花 土金银花、山金银花、土忍冬

L. confusa DC.

全州、桂林、天峨、田阳、陆川等地。

花清热解毒；治感冒发热，咽喉炎，菌痢，肠炎，疖肿，淋巴腺炎，湿疹。藤治风湿痛、痈肿疮毒。花或全藤作兽药，治牛赤痢，炭疽病，猪瘟，猪丹毒等症。亦常栽培作庭园绿化植物。

毛柱金银花

L. dasystyla Rehd.

柳州、桂林。

花蕾、茎、叶清热解毒，止痢，消炎。有用花蕾代金银花用。

Lonicera

锈毛金银花

L. ferruginea Rehd.

田阳。

光冠银花

L. henryi Hemsl.

全州、大瑶山。

金银花 忍冬

L. japonica Thb.

全州、桂林。

花蕾、花清热解毒，抗菌消炎；治感冒发热，痢疾，痈疮疔毒，眼发
炎，湿疹，疥癣。炒炭止白痢。藤治风湿骨痛。作兽药，治牛腹胀
症，肠炎，淋病和化脓性疾病。花含芳香油，可作调配香脂等香精
用。从花提取金银花露，能止咳，消暑。茎、叶作农药，能防治菜青
虫、稻飞虱、水稻浮尘子，又可杀蛆。常栽培作庭园绿化植物。

长花银花

L. longiflora DC.

十万大山。

大花金银花 大花忍冬

L. macrantha DC.

全州、兴安、龙胜、临桂、大苗山、融安、大瑶山、平南、容县、
大新、龙州、乐业等地。

花蕾清热解毒，祛风镇惊；治小儿急惊风，疮毒等。亦有作代金
银花用。

野金银花

L. macranthoides H.-M.

全州、资源、灌阳、兴安、龙胜、临桂、永福、大苗山、罗城。
花蕾清热解毒；有作代金银花用。

湖南金银花

L. nubium (H.-M.) H.-M.

(*L. giraldii* Rehd. forma *nubium* H.-M.)

全州、龙胜、大苗山、罗城。

线叶常绿忍冬

L. pileata Oliv.

var. *linearis* Rehd.

隆林。

网脉银花☆ 网脉忍冬

L. reticulata Champ.

容县、平南、苍梧、大瑶山、临桂、龙胜、兴安、恭城、乐业。

花蕾清热解毒；有作代金银花用。

蒴藋 五加皮、接骨草、陆英

Sambucus javanica Reinw. ex Bl.

(*S. chinensis* Lindl.)

区内各地。

全草活血散瘀，祛风除湿，通经活络；治扭伤，腰肌劳损，骨折，风湿痹痛，水肿，湿疹，黄疸腹胀，消化不良。作兽药，治牛跌打。

接骨木 欧接骨木

S. racemosa L.

贺县、富川、钟山、桂林、资源、全州、大苗山、大瑶山。

全草接骨，理跌打，祛风除湿；治跌打损伤，风湿，黄疸，热痢，汗疹。

短总序荚蒾

Viburnum brachybotryum Hemsl.

临桂、龙胜、南丹、容县。

Viburnum

金腺荚蒾☆

V. chunii P.S.Hsu

陆川、贺县、昭平、龙胜、兴安、全州、大苗山、大瑶山、大明山。

毛金腺荚蒾☆

V. chunii P.S.Hsu

var. *piliferum* P.S.Hsu

大苗山。

樟叶荚蒾

V. cinnamomifolium Rehd.

临桂、桂林、龙州。

圆齿荚蒾☆

V. colebrookianum Wall.

灵川。

榛叶荚蒾

V. corylifolium Hk.f. et Thoms.

灵川、龙胜、隆林。

繖房荚蒾

V. corymbiflorum P.S.Hsu et S.C.Hsu

全州、龙胜、临桂、大苗山、凌云、隆林、陆川。

四季青 水红木

V. cylindricum Buch.-Ham. ex D.Don

(*V. coriaceum* Bl.,

V. crassifolium Rehd.)

区内各地。

树皮和叶清热解毒，利湿；治脓疮，痒疹，疥癣，汗斑。树皮、果实可提制栲胶。种子油可制肥皂。嫩叶可作猪饲料。

荚蒾

V. dilatatum Thb.

全州、龙胜、临桂、大苗山、凌云、乐业。

枝、叶清热解毒，疏风解表；治感冒发热，疔疮发热。韧皮纤维可制绳和人造棉。种子油可制肥皂和润滑油。果实熟时可食，可酿酒。绿化植物。

变红荚蒾

V. erubescens Wall.

龙胜。

臭荚蒾

V. foetidum Wall.

var. *rectangulatum* (Graebn.) Rehd.

龙胜。

火柴子树 酸闷木

V. fordiae Hance

梧州、桂林、柳州、河池、南宁、百色等地区，容县、十万大山等地。嫩枝叶可作绿肥。绿化植物。

海南荚蒾

V. hainanense Merr. et Chun

(*V. tsangii* Rehd.)

东兴、合浦、十万大山、陆川、博白。

毛荚蒾

V. harryanum Rehd.

凌云。

硬毛荚蒾

V. hirtulum Rehd.

兴安、永福、大瑶山、贺县、藤县、苍梧、容县、龙州。

Viburnum

小鳞荚蒾

V. lepidotulum Merr. et Chun

苍梧、十万大山、龙州、靖西。

黄荚蒾☆

V. lutescens Bl.

兴安、龙胜、临桂、桂林、永福、大苗山、融安、大瑶山、横县、凌云。

叶去瘀生新，消肿。

罗盖荚蒾☆ 罗盖叶

V. luzonicum Rolfe

容县、大瑶山、柳州。

茎、叶驳骨；治骨折，又治枪伤。果实可酿酒。

红子仔

V. luzonicum Rolfe

var. *taiwanianum* (Hance) Rehd.

容县、大瑶山、罗城、龙州。

珊瑚树 猪耳木

V. odoratissimum Ker

全州、资源、兴安、临桂、灵川、大苗山、大瑶山、苍梧、藤县、平南、容县、陆川、博白、十万大山、合浦。

嫩叶、枝消肿，止痛；治刀伤，又治蛇伤。也可做绿肥。作兽药，治牛、猪感冒发热，跌打创伤。可作绿篱和庭园绿化植物。木材供细工用。

少花荚蒾☆

V. oliganthum Batal.

大苗山、龙胜。

兴山荚蒾

V. propinquum Hemsl.

田阳、那坡、靖西、武鸣、临桂。

全株治跌打，风湿痛。

坚荚蒾 长叶火柴枝树、罗芥叶

V. sempervirens C Koch

十万大山、大瑶山、贺县、桂林、龙胜、兴安。

茎、叶接骨，活血消肿；治跌打，又治风湿骨痛，痧气，驱缘

虫。作兽药，治牛、猪跌打外伤。叶可作绿肥。果实味酸甜，

可生食。绿化树种。

刚毛荚蒾

V. setigerum Hance

资源、兴安、龙胜。

丛轴荚蒾

V. sympodiale Graebn.

大苗山、龙胜、全州。

光果台湾荚蒾

V. taiwanicum Hay.

subsp. *leiogynum* P.S.Hsu

凌云。

蝴蝶树

V. tomentosum Thb.

龙胜、临桂。

根、茎清热解毒，健脾消积；治淋巴腺炎，小儿疳积。

三脉荚蒾

V. triplinerve H -M.

龙州。

Viburnum-Patrinia

叶消肿止痛；治跌打。

管花荚蒾

V. tubulosum P.S.Hsu

兴安、临桂、桂林、灵川。

杨枰

Weigela japonica Thb.

var. *sinica* (Rehd.) Bail.

资源、兴安、隆林。

235 败 酱 科 VALERIANACEAE

狭叶败酱

Patrinia angustifolia Hemsl.

龙州。

幼嫩部分可食，作猪饲料。根治疟疾。

异叶败酱

P. heterophylla Bunge

藤县、昭平、贺县、龙胜、全州、资源、临桂、阳朔、荔浦、
灌阳、平乐、兴安、大瑶山、大苗山、柳州、河池、凤山、那
坡、平南、马山。

全草和根茎清热解毒，消肿生肌；治急性阑尾炎初起，瘰癧，疮
疖，痈肿，子宫颈癌，白带。

单雄蕊败酱☆

P. monandra C.B. Clarke

临桂、兴安、宁明、大瑶山、那坡。

斑花败酱

P. punctiflora P.S.Hsu et H.J.Wang

东兰、贺县、富川、钟山。

败酱

P. scabiosaefolia Fisch. ex Link

灵川、临桂、永福、恭城、龙胜、昭平、贺县。

根清热解毒，消肿排脓；治肠炎下痢，慢性结肠炎，急性阑尾炎初起，腹膜炎，眼结膜充血等症。根可提取芳香油。作兽药治牛耳流脓。幼嫩部分可食，可饲猪。

粗毛败酱☆

P. scabiosaefolia Fisch. ex Link

var. *hispida* (Bunge) Fr.

龙州、邕宁、贵县、隆林、凌云、乐业、柳州、大瑶山、大苗山、临桂、昭平、富川、钟山。

根消炎排脓；治白带，肠炎，腹部肿胀。

白花败酱 胭脂麻

P. villosa (Thb.) Juss.

(*P. sinensis* (Lévl.) Koidz.)

临桂、龙胜、全州、兴安、资源、平乐、藤县、贺县、富川、上思、武鸣、马山、南丹。

全草清热解毒，消肿排脓；治急性阑尾炎初起，疔疮肿毒，蛇伤，痢疾，便秘，痔疮等。

阔叶缬草

Valeriana hardwickii Wall.

凌云、乐业。

根兴奋，镇痉，安神；治神经衰弱，失眠，心跳。根茎皮层可提缬草油。

马蹄香 蜘蛛香

V. jatamansi Jones

(*V. wallichii* DC.)

隆林、凌云、乐业。

根茎理气止痛，开胃；治消化不良，腹胀，胃痛，小儿疳积。根茎皮层可提芳香油。

236 续断科 DIPSACACEAE

川续断 平地跑马

Dipsacus asper Wall.

龙胜、兴安、资源、全州、临桂、灌阳、南宁、龙州、柳州、大苗山、凌云、隆林、贺县。

根补肝肾，通血脉；治腰膝酸痛，月经不调，胎漏，崩漏，带下，遗精，咳嗽，咳血，赤白痢，痈痔肿毒，草乌中毒，跌打损伤。

续断

D. japonicus Miq.

临桂、桂林、全州。

药用功效同川续断。

238 菊科 COMPOSITAE

飞天蜈蚣

Achillea wilsoniana (Heim.) H.-M.

区内各地有少量栽培。

全草消炎解毒，驱风镇痛；治蛇咬伤，无名肿毒，跌打损伤，外伤出血，牙痛，胃痛，经闭腹痛等。

下田菊

Adenostemma lavenia (L.) O.Ktze.

(*A. viscosum* Forst.)

贺县、藤县、巴马、靖西、那坡、临桂、阳朔、兴安、大苗山、宁明。

全草祛风解表，解痉止痛；治风湿骨痛，外感，乳痈，牙痛等。

胜红蓟 鱼草、鱼花草

Ageratum conyzoides L.

区内各地。

全草清热解毒，止血止痛；治感冒风热，外伤出血，疮疖湿疹等。

作鱼花饲料。作绿肥。又可提取芳香油。

熊耳草

A. houstonianum Mill.

南宁、柳州。

杏香兔儿风

Ainsliaea fragrans Champ.

临桂、全州、兴安、恭城、融安、三江、大苗山、大瑶山、昭平、上思。

全草消炎解毒，止血生肌，利水除湿；治咳嗽吐血，跌打损伤，蛇伤肿毒，水肿腹胀等。

黄毛柄兔儿风

A. fulvipes J.F.Jeffrey et W.W.Sm.

桂西北。

软兔儿风

A. gracilis Fr.

龙胜、那坡、昭平。

全株治咳血。

滇桂兔儿风☆

A. henryi Diels

临桂、龙胜、凌云、田林、大苗山。

卵叶兔儿风☆

A. hui Diels

Ainsliaea-Anaphalis

昭平、贺县。

多枝兔儿风

A. ramosa Hemsl.

兴安、龙胜、阳朔、大苗山、象州、平南。

全株清热解毒，润肺止咳；治痢疾，喉痛，吐血，小儿哮喘。

蒲公山鼠菊

A. walkeri Hk.f.

上思、武鸣、龙胜、临桂、罗城、大苗山。

蛛毛香青 火绒艾

Anaphalis busua (Buch.-Ham.) H.-M.

(Gnaphalium busua Buch.-Ham.,

A. araneosa DC.)

宁明。

全草治眼病。

细白艾

A. forrestii Diels

柳城。

香青 火草、珍珠香青、山萩

A. margaritacea (L.) Benth. et Hk.f.

灌阳。

全草止痢，止血，驱虫；治痢疾，刀伤，蛔虫病。茎、叶、花提芳香油作调香原料。

肉桂香青 肉桂山萩

A. margaritacea (L.) Benth. et Hk.f.

var. cinnamomea (Wall) H.-M.

(A. cinnamomea Clarke)

靖西、武鸣。

山黄菊 旱山菊

Anisopappus chinensis (L.) Hk. et Arn.

容县、陆川、藤县、梧州、邕宁、龙州、柳州、南丹、临桂。

花有小毒，下气行水，消痰，软坚；治头晕目眩，喘咳，水肿，胸满肋痛。花亦作旋复花用。

牛蒡

Arctium lappa L.

隆林、全州。

种子疏风散热，宣肺透疹，消肿解毒；治感冒咳嗽，咽喉肿痛，疹出不透，痈疮肿毒。根治劳伤，阳萎，肾虚耳聋，产后无乳。

黄花蒿 青蒿

Artemisia annua L.

百色、隆林、富川、钟山、贺县、贵县、南宁、宁明。

全草清虚热，退骨蒸；治疟疾，胸闷不舒，寒热往来，肺结核潮热盗汗等。

异形蒿 奇蒿

A. anomala S.Moore

永福、临桂、全州、兴安、恭城、灌阳、龙胜、罗城、大瑶山、大苗山。

全草破血通经，止痛敛疮；治小便不通，经闭症瘕，胸腹胀痛，产后血瘀，金疮出血。

假青蒿

A. apiacea Hance

var. carvifolia (Mattf.) Pamp.

凌云、天峨、柳城。

艾 祈艾

A. argyi Lévl. et Van.

兴安、龙胜、临桂等县。

全草温经，安胎，止血，逐寒湿；治月经不调，腹痛，吐血，衄血，崩漏带下，胎动不安，久痢不止，疝气作痛等。叶作艾绒。

茵陈蒿 扫把艾

A. capillaris Thb.

容县、昭平、临桂、平乐。

全草清湿热，利水道；治黄疸肝炎，胆囊炎，尿少短赤。茎、叶提芳香油，配制各种清凉剂及香精用。作农药可防治蚜虫。嫩叶可食。

广西蒿☆

A. chingii Pamp.

桂西北。

叶理气血，逐寒湿，止血，温经，安胎。

五月艾

A. dubia Wall.

var. *acuminata* Pamp.

靖西、龙州。

小野艾 野艾、野菊花

A. indica Willd.

区内各地。

花、叶敷洗疮毒，又可提芳香油。嫩枝叶作猪饲料。

牡蒿 假柴胡、齐头蒿

A. japonica Thb.

容县、龙州、武鸣、上思、大瑶山、大苗山、龙胜、桂林、阳朔。

灌阳、隆林、百色、凌云。

全草祛风解暑，行血散瘀，降血压；治中暑，跌打，风湿，高血压，刀伤，蛇伤，痞积，喉痛，疔疮热毒。全草提芳香油。作牛、马饲料。作绿肥。作农药制成肥皂合剂杀蚜虫、红铃虫等。

白花蒿 甜艾、甜菜子、刘寄奴

A. lactiflora Wall.

临桂、桂林、龙胜、兴安、平乐、平南、象州、大瑶山、大苗山、藤县、昭平、富川、钟山、宁明、武鸣、南宁。

全草通经散瘀，理气消肿；治月经不调，闭经，慢性肝炎，肝硬化，跌打肿痛，胃肠胀气，肾炎水肿，疮疡湿毒。作兽药治牛腹痛下痢，胃肠气胀，子宫出血。又可提芳香油。

野艾蒿 细叶艾

A. lavandulaefolia DC.

隆林。

全草止血，代艾叶用。

臭蚊艾

A. lavandulaefolia DC.

var. *feddei* (Lévl. et Van.) Pamp.

永福、桂林。

根、叶治流感，又可薰蚊。

小花艾

A. parviflora Wight

南宁、藤县。

全草下血；治痰火。代青蒿用。

多头蒿

A. pleiocephala Pamp.

艾叶 端午艾

A. principis Pamp.

Artemisia-Aster

桂林、临桂、阳朔、隆林。

全草理气血，逐寒湿；治产后腹痛，月经过多，子宫出血。

小叶艾

A. roxburghiana Bess.

兴安、临桂、平南。

石山蒿

A. sacrorum Ledeb.

柳城。

白背五叶艾

A. simulens Pamp.

龙州、隆林、凌云、乐业。

光叶艾

A. thellungiana Pamp.

宁明、南宁。

白背蚊艾

A. vestita Wall.

龙州。

野艾 艾、五月艾

A. vulgaris L.

区内各地。

老叶制艾绒，作印泥原料。嫩叶可制糍粑。茎、叶提芳香油（艾油）调配香精用。全草温经止血，逐风止痒；治吐血，便血，月经不调，血崩，胎动不安，肠炎，痢疾，跌打扭伤，小儿夜啼。

三脉山白菊☆

Aster ageratoides Turcz.

var. *trinervius* (Roxb.) H.-M.

隆林、容县、藤县、上思、武鸣、大苗山、临桂、龙胜。

全草清热解表；治感冒，跌打，蛇伤。

耳状紫菀☆

A. auriculatus Fr.

隆林、临桂。

两广紫菀☆

A. baccharoides Steetz

桂江河岸、昭平。

南岭紫菀☆

A. gerlachii Hance

全州。

滇黔紫菀☆

A. marchandii Lévl.

平南、南丹、全州。

北紫菀☆

A. mongolicus Fr.

昭平。

广州紫菀☆

A. sampsoni (Hance) Hemsl.

东风菜

A. scaber Thb.

区内各地。

全草祛风解毒，行气止痛；治目赤肿痛，咽喉肿痛，肠炎腹泻，蛇伤。作兽药用，功效类同。亦可作猪饲料。

路边菊 田边菊、鸡儿肠

Asteromaea indica Bl.

(*Aster indicus* L.,

Boltonia indica (L.) Benth.)

区内各地。

全草清热解表，健脾去积；治外感风热，肝炎，消化不良，胃溃

Atractylodes-Blumea

疡，中耳炎，疖肿等。

●白术

Atractylodes macrocephala Koidz.

平南、容县、桂平。

根茎补中健胃，化湿安胎；治食少便溏，消化不良，脘腹胀满，胎动不安。

婆婆针 鬼针草

Bidens bipinnata L.

桂林、梧州、贺县、富川、贵县、邕宁、平果、百色。

全草清热解毒，活血散瘀；治风湿疼痛，湿热黄疸，毒蛇咬伤，跌打损伤，疳积，高血压等症。茎、叶作农药杀蚜虫、螟虫。

三叶婆婆针 虾钳草、三叶鬼针草

B. pilosa L.

区内各地。

全草清热解毒，活血散瘀；治流感，感冒，咽喉肿痛，肠炎腹泻，黄疸肝炎，跌打损伤，风湿骨痛，痈疮肿毒，蛇伤。亦作兽药用，功效类同。又作猪饲料。

异冠毛菊☆ 百能葳

Blainvillea latifolia (L.) DC.

武鸣。

香艾 山风

Blumea aromatica (Wall.) DC.

(*Conyza aromatica* Wall.)

宁明、那坡、百色、大苗山、兴安、龙胜。
全草治风湿。

大艾 大风艾、冰片艾、艾纳香

B. balsamifera (L.) DC.

容县、龙州、百色、田林、凌云、乐业、天峨、河池、宜山。叶经蒸馏提取芳香油，结晶为冰片，是多种清热解毒、消肿止痛一类中药成药和痱子粉的重要原料，又可调制迷迭香等香精和皂用香精。作草药用，全草有小毒，祛风消肿，活血调经；治风湿骨痛，跌打肿痛，急慢惊风，头风痛，月经痛，痈疮疖肿，皮肤湿痒。作兽药治牛、猪神昏气闭，喉风，箭脚，眼翳，腹胀，胃肠积气等症。

田芥菜仔

B. cavaleriei Lévl. et Van.

桂林。

聚花艾纳香

B. fistulosa (Roxb.) Kurz

隆林、田林、凌云、乐业。

全草作强壮剂。

毛毡草

B. hieracifolia DC.

大瑶山。

全草清热解毒，消肿；治蛇伤，疟疾。

七里明

B. hongkongensis Van.

贺县、上思、桂林。

见霜黄

B. lacera DC.

上思、宁明、武鸣、凌云、乐业、柳城、桂林。

全草治外伤肿痛。

柔毛艾纳香

B. mollis (Don) Merr.

隆林、凌云、乐业、天峨、大瑶山。

全草祛痰止咳；治头痛，鼻渊，皮肤干燥。

中华艾纳香

B. pubigera (L.) Merr.

(*B. chinensis* DC.)

上思、宁明、武鸣、南宁、苍梧、梧州、藤县、容县、平南、柳城、柳州、罗城、临桂、龙胜、阳朔、靖西、南丹。

全草明目，退子弹；治眼疾，疮疥，难产。

丝毛艾纳香

B. sericans (Kurz) Hk f.

罗城。

全草治肿毒。

波缘艾纳香 六耳铃、吊钟黄

B. sinuata (L.) Merr.

(*B. laciniata* (Roxb.) DC.)

东兰。

全草祛风湿，通经络；治风湿性关节炎，跌打扭伤，蛇伤，湿疹，皮炎，痈疮，疖肿。

拟艾脑

Blumeopsis falcata (D.Don) Merr. et Chun

隆林。

兔儿伞

Cacalia aconitifolia Bunge

(*Senecio aconitifolius* Turcz.,

Syneilesis aconitifolia Maxim.)

昭平、象州。

根舒筋活血，祛风湿；治风湿麻木，腰腿疼痛，跌打损伤，行经腹痛。

蟹甲菊☆

C. subglabra Chang

资源。

●金盏花

Calendula arvensis L.

各城市。

全草发汗利尿，降血压。绿化花卉。

●大金盏花

C. officinalis L.

各城市。

全草发汗利尿，泻下通经。绿化花卉。

倭白菊

Camchaya loloana Dunn ex Kerr

龙州。

天名精

Carpesium abrotanoides L.

南宁、宁明、梧州、贺县、临桂、桂林、龙胜、恭城、柳州。

全草止血利尿，清热解毒，破血生肌；治吐血，衄血，小儿惊风，

咽喉肿痛，虫牙痛，气管炎，便秘，痔疮。种子中药称北鹤

虱，驱虫；治虫积腹痛，可驱除绦虫、蛔虫。水浸液作农药杀

菜青虫、地老虎、守瓜虫等。

烟管草

C. cernuum L.

平南、隆林、罗城。

全草发汗，解毒，散瘀；治疟疾，喉痹，黄水疮，疥疮，脓疱疮，

痔疮等。可提芳香油，作调制香精原料。

金挖耳

C. divaricatum Sav. et Fr.

全州。

全草清热解毒，消炎祛瘀；治感冒，腹痛，肠炎，乳腺炎，淋巴

Carpesium-Chrysanthemum

结炎，蛇伤，犬伤等。

狗耳菜

C. trachelifolium Less.

桂西北。

●红花

Carthamus tinctorius L.

南宁、全州。

花活血通经，祛瘀止痛；治血瘀经闭，胎死腹中，产后恶露不尽，痛经，跌打损伤。红花籽油为优良食用油，可制人造奶油，可代替亚麻仁油制油漆、油布、润滑油，作蜡纸原料。花提碱红素，作糕点着色料和棉布印染原料。

石胡荽 鹅不食草、球子草

Centipeda minima (L.) A.Br. et Aschers.

区内各地。

全草通窍明目，祛风消肿；治鼻塞不通，百日咳，疟疾，蛇伤。作兽药治风痰，风寒，鼻塞，跌打，疔疽，蛇伤等症。

●白花除虫菊

Chrysanthemum cinerariaefolium Vis.

柳州、南宁。

花作农药，制熏烟剂、油剂、乳剂杀虫。作草药治疥癣。

●白菊仔

C. frutescens L.

各地城镇。

绿化花卉。

野菊 野黄菊

C. indicum L.

区内各地。

全草清热解毒，活血消肿，降压，健胃；治高血压(花)，疮疖肿

毒，牙疳，中耳炎，乳腺炎。捣烂制成液剂作农药防治作物病虫害；杀子孓，灭蝇蛆。花、叶提芳香油或制成浸膏制皂用香精。

●菊花

C. morifolium Ram.

各地城镇。

绿化花卉。花散风清热，平肝明目；治感冒风热，目赤肿痛，头昏目花，疮疡肿痛。

●茼蒿

C. spatiosum Bailey

区内各地。

蔬菜。全草安心气，健脾胃，清痰饮，利肠胃。

小蓟 小叶老虎鬃

Cirsium chinense Gardn. et Champ.

宁明、临桂、柳城。

根活血散瘀，解毒生肌。嫩苗可食。

蓟 大蓟、老虎鬃、山萝卜

C. japonicum DC.

区内各地。

全草凉血止血，破血行瘀，利水消肿；治吐血，咯血，衄血，外伤出血，尿血，子宫出血，痈疮肿毒，肝炎黄疸，乳腺炎，阑尾炎，烫火伤。根(含淀粉)和嫩苗可食。作兽药治各种血症。

山地菊

Conyza japonica (Thb.) Less.

隆林。

粘毛假蓬

C. viscidula (Wall.) DC.

宁明。

Coreopsis-Dichrocephala

●剑叶波斯菊 大金鸡菊

Coreopsis lanceolata L.

南宁、桂林等市。

绿化花卉。叶散瘀消肿，清热解毒；治刀伤出血，无名肿毒。

●波斯菊 蛇目菊

C. tinctoria Nutt.

南宁、桂林等市。

绿化花卉。

茼蒿菊

Cotula anthemoides L.

梧州、河池。

全草治孕妇呕吐。

绿茎还阳参

Crepis lignea (Van.) Bab.

隆林。

杯菊

Cyathocline purpurea (Ham.) O.Ktze.

(*C. lyrata* Cass., *Dichrocephala minutifolia* Van.)

凌云、乐业、隆林、河池。

全草杀虫。

●大丽花

Dahlia pinnata Cav.

区内各城市。

根治虫牙痛，腮腺炎，无名肿毒，绿化花卉。

茯苓菜 山胡椒菊、鱼眼草

Dichrocephala auriculata (Thb.) Druce

(*D. latifolia* (Lam.) DC.)

临桂、桂林、龙胜、凌云、乐业、天峨、容县、平南、梧州、上思。
全草温中散寒，活血调经，消肿拔毒；治月经不调，嘴吐清水，
喉炎，疔疮，蛇伤等。作猪饲料。

旱莲草 鱧肠草、墨菜、白花蟛蜞菊

***Eclipta alba* (L.) Hassk.**

临桂、桂林、柳州、南丹、天峨、凌云、乐业、隆林、武鸣、宁
明、南宁、龙州。

全草凉血止血，补肾，收敛；治肺结核咳血、鼻衄、呕血等各种
出血，肝肾虚腰酸痛，头晕目花，腹泻，紫癜等。作兽药治
牛、猪各种血症。

地胆草 毛儿细辛

***Elephantopus scaber* L.**

临桂、桂林、平乐、容县、贵县、平南、玉林、南宁、马山、龙
州、宁明、武鸣、邕宁、梧州、贺县、藤县、巴马、东兰、大
瑶山、大苗山、凌云。

全草清热解毒，利尿消肿；治流感，咽喉炎，结膜炎，肝炎，肾
炎水肿，湿疹，疖肿，蛇伤。作兽药治牛、猪肝胆火旺，各种
大热症，牛瘟，猪瘟，猪丹毒。

白花地胆草

***E. tomentosus* L.**

宁明、邕宁、临桂、马山。

全草清热解毒，祛风止痛；治痛经，喉炎，麻疹等。

小一点红 耳挖草、七十二枝花

***Emilia prenanthoides* DC.**

梧州、大苗山、恭城、临桂、龙胜、全州、容县、平南。

全草抗菌消炎，活血去瘀；治上呼吸道感染，肺炎，扁桃体炎，乳

Emilia-Erigeron

腺炎，痢疾，腹泻，蛇伤。

缨绒花 小七十二枝花

E. sagittata (Vahl) DC.

(*E. flammea* Cass.)

资源、全州、桂平、平南。

一点红 红背叶、羊蹄草

E. sonchifolia (L.) DC.

临桂、桂林、南宁、宁明、柳州、大瑶山、罗城、隆林、梧州。

全草清热解毒，消炎利水，活血消肿；功用同小一点红。作兽药

治湿热腹泻，痢疾，疮疖肿痛，跌打。作猪饲料。

拳头菊☆ 苡芭菊

Epaltes australis Less.

南宁、隆林。

全草止血理气；治内伤，功近石胡荽。

菊芹

Erechtites valerianaefolia DC.

苍梧、容县。

短花茎飞蓬☆

Erigeron breviscapus (Van.) H.-M.

(*E. praecox* Vierh. et H.-M.)

隆林、全州。

全草治小儿头疮。

小飞蓬 加拿大蓬

E. canadensis L.

区内各地。

作猪饲料和绿肥；又可提芳香油，作农药。全草退热，祛风湿；

治骨痛，尿血，小儿头疮。

香丝草 蓑衣草

E. crispus Pourr.

临桂、桂林、恭城、天峨、罗城、东兰、大苗山、大瑶山、凌云、
苍梧、贺县、昭平、富川、百色。

作绿肥，猪饲料，熏蚊。全草止痛；治风湿。

琴叶飞蓬☆

E. panduratus Chang

资源。

丛生泽兰☆

Eupatorium caespitosum Migo

梧州。

兰草 孩儿草

E. chinense L.

(**E. reevesii Wall.**)

区内各地。

根、叶清热解毒，宣痹通络，利咽散结；治扁桃体炎，咽喉炎，
麻疹，肺炎，风湿骨痛，劳伤，血淋。专用根治小儿白喉。作
兽药治牛、猪筋骨肿痛，跌打损伤，疮痍疔疽，蛇伤，痰多，
肺热咳嗽。

单叶泽兰☆

E. chinense L.

var. simplicifolium Mak.

全州。

泽兰

E. japonicum Thb.

区内各地。

全草活血散瘀；治月经不调，水肿，跌打肿痛。

毛泽兰

E. lindleyanum DC.

南宁、龙州、武鸣、宁明、临桂、兴安、全州、资源、梧州、昭平、贺县、平南、贵县、都安。

全草发表祛风，和中化湿；治风寒感冒，疟疾，寄生虫病。

飞机草

E. odoratum L.

百色、那坡、凭祥。

茎、叶提芳香油，用于香料及医药工业。绿化植物。全草杀虫，止血；治蚂蟥咬伤后流血不止。鲜叶揉碎涂肢体，防蚂蟥咬。

水泽兰 鸡骨香、老山茶、佩兰

E. stoechadosmum Hance

区内各地。

茎、叶提芳香油。全草通经散瘀，祛湿；治月经不调，白带白浊，胃痛，腹痛，跌打肿痛，吐血，衄血等。

异叶泽兰☆

E. wallichii DC.

var. heterophyllum (DC.) Diels

资源。

●荔枝菊

Gaillardia aristata Pursh

南宁、桂林等市。

绿化花卉。

大丁草

Gerbera anandria (L.) Schtz.-Bip.

龙胜、临桂、柳城。

全草祛风除湿，止咳平喘，解毒；治风湿麻木，咳喘，疔疮。

●非洲菊

G. jamesonii Bolus

南宁、桂林等市。

绿化花卉。

白眉 一柱香、毛大丁草

G. pilloselloides Cass.

临桂、桂平、上思、梧州、柳州、大苗山、大瑶山、隆林、凌云、
那坡、龙州、横县、东兰。

全草清热止咳，活血行气，解毒；治咳嗽痰多，小儿疳积，跌打损伤，
肺癆咳血，风湿麻木，疔疮，蛇伤。根、叶作农药能防治蚜虫。

香茹

Glossogyne tenuifolia Cass.

玉林。

全草清热利湿；治湿热黄疸，中暑吐泻，牙龈肿痛，痢疾。

贴生鼠麴草 大白艾

Gnaphalium adnatum Wall. ex DC.

(*Anaphalis adnata* DC.,

A. esquirolii (Lévl.) Lévl.)

容县、上思、恭城、灌阳。

全株治痢疾，风湿，小儿惊风。

秋鼠麴草 山艾

G. hypoleucum DC.

南宁、横县、武鸣、隆林、德保、靖西、平乐、贺县、柳州、
南丹、恭城。

可食，可与米粉相拌做糍粑。全草止咳；又治热痢。

狭叶鼠麴草 白花艾、田灰艾

G. indicum L.

梧州、昭平、容县、武鸣、宁明、临桂、恭城、上思、凤山、柳城。

Gnaphalium-Gynura

作猪饲料。全草治热痢，咽肿，小儿食滞。

细叶鼠麴草

G. japonicum Thb.

大苗山、融安。

可食，全草清肝明目，消炎止血；治结膜炎，咽喉炎，尿道炎，扁桃腺炎，白浊，血崩，痢肿等。

鼠麴草

G. multiceps Wall.

隆林、田阳、凌云、乐业、天峨、临桂、龙胜、容县、横县、大苗山、上思、柳城、大瑶山。

可食，取嫩叶和米粉相拌做糍粑。作猪饲料。全草提芳香油。药用宣肺平喘，祛痰止咳，补脾利湿；治风寒咳嗽，急慢性支气管炎，哮喘，风湿性腰腿痛。

黄花球 田黄菜、荔枝草

Grangea maderaspatana (L.) Poir.

隆林、百色、南宁、田阳。

叶镇痉，调经；治耳痛，肺结核。

红背菜

Gynura bicolor DC.

临桂、阳朔、恭城、平南、凌云、靖西、那坡、大苗山、昭平、贺县。

作蔬菜。全草消肿，止痛；治血崩，月经不调。

革命菜 竹筒蒿

G. crepidioides Benth.

区内普遍分布。

野菜。猪饲料。全草行气消肿，健脾利尿；治消化不良，脾虚浮肿。

叉花土三七 大肥牛、白子菜

G. divaricata (L.) DC.

(*G. ovalis* DC., *G. pseudo-china* DC.)

平卧土三七☆

G. procumbens (Lour.) Merr.

汉三七。土三七、菊三七、破血丹

G. segetum (Lour.) Merr.

桂南、平果、昭平、全州、临桂、桂林。

全草活血通经，祛风消肿；治跌打损伤，风湿骨痛，乳痈疮毒，急慢惊风。

●向日葵

Helianthus annuus L.

区内各地。

种子油为半干性油，供食用，制糕点饼食，制肥皂、涂料、油漆用，点灯用。茎、叶作牛的饲料。花可制成黄色染料。茎的髓心用于显微切片技术方面。药用：茎髓治血淋，乳汁少，肺结核。花止痛，催生。叶治疟疾。籽治虚弱头风。根治浮肿。

●菊芋

H. tuberosus L.

全州、兴安、资源、临桂、灵川。

根茎含淀粉和糖分，作粮食或蔬菜，酿酒，作猪饲料。茎皮纤维代麻制绳，织麻袋，制人造纤维板等。药用茎、叶驳骨。

●蜡菊

Helichrysum bracteatum Andr.

各城市。

绿化花卉。

泥胡菜

Hemistepta lyrata Bunge

(*Saussurea carthamoides* (Ham.) Benth.,

S. affinis Spreng.)

Heteroplexis-Ixeris

隆林、桂林。

异裂菊☆

Heteroplexis vernonioides Chang

龙州。

缴花山柳菊

Hieracium umbellatum L.

兴安。

旋复花

Inula britannica L.

全州。

花序下气，消痰，行水；治喘咳，暖气呕吐，胸满肋痛，大腹水肿等。

白牛胆 羊耳菊、柱头草、猪耳风、大力王、白头婆

I. cappa DC.

区内各地。

全草或根除痰定喘，祛风消肿，活血调经；治咳嗽，肾炎水肿，

风湿腰痛，跌打损伤，月经不调等。作兽药治牛、猪感冒发

热，痰多咳嗽，宿草不消，泄泻下痢。作绿肥。

苦菜

Ixeris chinensis (Thb.) Nak.

隆林、临桂。

全草清热解毒，消肿排脓；治疮疖痈肿。

小苦菜

I. dentata (Thb.) Nak.

(*Lactuca dentata* (Thb.) Mak.)

野苦蕒菜

I. denticulata (Houtt.) Stebb.

(*Lactuca denticulata* (Houtt.) Maxim)

龙胜、临桂。

全草清热解毒，消肿；治疮疖痈肿。

细叶苦菜☆

I. gracilis (DC.) Stebb.

(*Lactuca gracilis* (Wall.) DC.)

临桂、兴安。

全草治癆咳，疮疖。

剪刀股

I. japonica (Burm.) Nak.

(*I. debilis* A.Gray)

桂南。

全草治乳腺炎。

高莴苣☆

Lactuca elata Hemsl.

龙州、藤县。

细花莴苣☆

L. graciliflora (Wall.) DC.

隆林、田林、平南、融安、大苗山。

全草治癆咳，疮疖。

山莴苣 野生菜

L. indica L.

临桂、容县、龙州、凌云、乐业、梧州。

全草清肝热，解毒。作猪饲料。

●莴苣 生菜

L. sativa L.

区内各地。

蔬菜。

Lactuca-Laggenera

● 莴苣笋

L. sativa L.

var. *asparagina* Bailey

区内各地。

蔬菜。

● 球叶莴苣

L. sativa L.

var. *capitata* L.

区内各地。

蔬菜。

● 皱叶莴苣 玻璃生菜

L. sativa L.

var. *crispa* L.

区内各地。

蔬菜。

● 长叶莴苣

L. sativa L.

var. *longifolia* Lam.

区内各地。

蔬菜。

瓶头菊

Lagenophora billardieri Cass.

桂南。

六棱菊

Laggenera alata (DC.) Schtz.-Bip.

百色、田林、隆林、龙州、邕宁、南宁、武鸣、巴马、天峨、恭城。

全草消肿拔毒，散瘀止痛；治疮疖肿毒，烫火伤，湿疹，跌打，

蛇伤，风湿痛，肾炎水肿，血枯经闭。叶、花可提芳香油。

狮子草

L. pterodonta (DC.) Benth.

龙州、宁明、南丹。

禾稿草 稻槎菜

Lapsana apogonoides Maxim.

临桂、凌云、乐业、博白。

光栓果菊☆ 土蒲公英

Launaea acaulis (Roxb.) Babc. ex Craib

(*L. glabra* (Wight) Fr.)

隆林、柳州、宁明。

小舌菊

Microglossa albescens (DC.) C.B. Clarke

梨叶小舌菊

M. pyrifolia (Lam.) O.Ktze.

大瑶山、隆林、靖西、南宁、龙州。

全株解毒，生肌，明目；治疮疥。

西南齿冠菊☆

Myriactis gmelinii DC.

桂西北。

粗齿齿冠菊☆ 尼泊尔齿冠菊

M. nepalensis Less.

桂西北。

山苦蕒 甜麦、空筒菜

Paraprenanthes sororia (Miq.) Chang, in sched.

(*Lactuca sororia* Miq.)

大苗山。

Pentanema-Rhynchospermum

芎谷草

Pentanema indicum (L.) Ling

(*Inula indica* L., *Vicoa auriculata* Cass.)

桂南。

粉背芎谷草

P. indicum (L.) Ling

var. *hypoleucum* (H.-M.) Ling

田林。

全草治痞积。

毛连菜

Picris hieracioides L.

隆林、田林。

西南毛连菜☆

P. hieracioides L.

var. *divaricata* (Van.) Chang, ined.

全州。

西南垂序苣☆

Prenanthes henryi Dunn

大瑶山、大苗山、恭城。

根清热解毒；治蛇伤。

小垂序苣☆ 福王草

P. macilenta Van. et Lévl.

大瑶山。

卵叶垂序苣☆ 野麦叶

P. tatarinowii Maxim.

大瑶山。

秋分草

Rhynchospermum verticillatum Reinw.

龙州。

●金光菊 太阳花、假向日葵

Rudbeckia laciniata L.

桂南各地。

绿肥。绿化花卉。叶消肿拔毒。

三角叶风毛菊

Saussurea deltoides (DC.) C.B. Clarke

(*S. radiata* Fr., *S. lamprocarpa* Hemsl.,

S. cirsiium Lévl.)

大瑶山、南丹。

根治腹痛，腰痛。

中间风毛菊

S. intermedia Turcz.

乐业。

根作人工流产用。

风毛菊

S. japonica (Thb.) DC.

临桂、隆林、百色。

●广木香 云木香

S. lappa C.B. Clarke

南宁、桂林。

根健胃消胀，行气止痛；治气滞腹胀，痢疾腹痛，消化不良，呕吐泄泻，胎动不安。根提芳香油作调香原料。用根制成的香连丸放在衣物、毛呢中可防虫蛀。

蛛毛千里光

Senecio araneosus DC.

临桂、容县。

Senecio

藤千里光

S. buimalia Buch.-Ham.

那坡。

田野千里光☆ 狗舌草

S. campestris DC.

大苗山。

全株治疮疥。

拟菊千里光

S. chrysanthemoides DC.

隆林。

聚繖千里光

S. cymatocrepis Diels

凌云、乐业、那坡。

根作人工流产用。

密花千里光

S. densiflorus Wall.

临桂、上思、大瑶山。

峨眉千里光☆ 小花野苦蕒

S. faberi Hemsl.

大苗山。

绵毛千里光☆

S. hoi Dunn

宁明、大瑶山、阳朔。

全草止血生肌，和血调经；治损伤，小儿慢惊风。

金千里光☆

S. hugonis S.Moore

大瑶山。

黔桂千里光☆

S. latouchei J.F.Jeffr.

龙胜、大瑶山、全州。

橐吾千里光

S. ligularia Hk.f.

大瑶山。

根化痰止咳。叶消肿。

白千里光☆

S. nagensium C.B.Clarke

龙胜、阳朔、大苗山、那坡。

全株祛风暖胃，消疮毒；治刀伤，腹痛，腹泻，哮喘。

黄菊莲 蒲儿根

S. oldhamianus Maxim.

临桂、龙胜、全州、宜山、柳州、大瑶山、天等、平南。

全草消肿解毒；治金疮。

千里光 九里明

S. scandens Buch.-Ham.

区内各地。

全草清热解毒，益肝明目，去腐生肌；治黄疸性肝炎，痈肿，湿疹，皮炎，急性结膜炎，咽喉肿痛，迎风流泪，痔疮，疟疾。

作兽药治眼疾，痢疾，皮肤病。茎、叶作农药除蚜虫。

中华千里光☆

S. sinicus (Diels) Chang

那坡。

三舌千里光

S. triligulatus Buch.-Ham.

凌云、乐业。

Serratula-Sphaeranthus

麻花头 广东升麻

Serratula chinensis S.Moore

全州。

根散风解毒，透疹；治咽喉肿痛，麻疹不透，久泻脱肛，子宫脱垂。

豨薟

Siegesbeckia orientalis L.

区内各地。

全草安神降压，祛风除湿；治失眠，高血压，风湿痛，肺癆咳嗽，犬伤，蛇伤，半身不遂。

一枝黄花 蛇头黄、一朵云

Solidago virga-aurea L.

区内各地。

全草凉血解毒，消肿止痛；治咽喉肿痛，毒蛇咬伤，感冒咳嗽，跌打，疮疖，肠炎，小儿疳积。作兽药治牛、猪疮疾，喉症，臌胀，腹泻等症。

苣荬菜 野苦蕒

Sonchus arvensis L.

南丹、柳州、隆林、凌云、乐业、扶绥、富川、钟山、恭城、临桂。全草清热解毒；治阑尾炎初起，乳痈，疮疖肿毒，痢疾，烫火伤。苗充蔬菜。全株作家畜饲料。

●苦蕒菜 苦蕒

S. oleraceus L.

区内各地。

蔬菜。

戴星草

Sphaeranthus africanus L.

全草健胃，利尿，止痛。

金钮扣

Spilanthes acmella (L.) Murr.

(*Verbesina acmella* L.)

龙州。

全草止咳定喘，消肿止痛；治感冒咳嗽，肺结核，百日咳，哮喘，
支气管炎，蛇伤，疮毒，牙痛。

金腰箭 苞壳菊

Synedrella nodiflora (L.) Gaertn.

容县、临桂、宁明。

根治疮疥。

●万寿菊

Tagetes erecta L.

区内各城镇。

绿化花卉。花补血，通经，去瘀，生新。

●藤菊 西番菊

T. patula L.

区内城镇。

绿化花卉。全草清热利湿，止咳；治咳嗽，痢疾。

●蒲公英 黄花地丁

Taraxacum mongolicum H.-M.

各地有少量栽培。

全草清热解毒，消肿散结，利尿催乳；治乳痈，热疖疮毒，肝炎，
阑尾炎，乳少，胃炎，胃溃疡，便秘，尿路感染，蛇虫伤。作
猪饲料。根含橡胶。

毒根斑鸠菊 大木菊、过山龙

Vernonia andersoni C.B. Clarke

大瑶山、龙州、南宁、宁明、横县、扶绥、上思、灵山、平南、

容县、那坡、百色、田林、天峨、凤山、东兰。

根、藤有大毒；舒筋活络，祛风解表；治风湿痛，腰肌劳损，感冒，疟疾，牙痛，结膜炎。

粗叶斑鸠菊

V. aspera (Roxb.) Buch.-Ham.

临桂、宁明、凤山、梧州、德保、那坡、隆林。

根凉血，败毒；可用于人工流产。

广西斑鸠菊☆

V. chingiana H.-M.

临桂、那坡。

根、叶治小儿惊风，烂疮。

斑鸠菊 寄色草、夜香牛

V. cinerea (L.) Less.

天峨、罗城、隆林、德保、大瑶山、柳州、梧州、贺县、藤县、平南、容县、龙州、武鸣、横县、上思、龙胜、临桂。

全草疏风散热，安神镇静，消积化滞；治感冒咳嗽，急性肝炎，失眠，小儿夜尿，痢疾，疔疮肿毒，乳痈，蛇伤，跌打扭伤。

大藤菊

V. esculenta Hemsl.

靖西、隆林、乐业、那坡、德保、百色、天峨、都安。

展叶斑鸠菊☆ 狗仔菜、咸虾花

V. patula (Ait.) Merr.

(*V. chinensis* Less.)

南宁、龙州、宁明、梧州、巴马。

全草（根最好）发表散寒，清热止泻；治热泻，肝阳头痛，风热感冒，疟疾。

柳叶斑鸠菊☆

V. saligna DC.

田林、凌云。

叶治高热。根下胎催产。

蔓斑鸠菊

V. scandens DC.

大瑶山、龙州。

根镇痛，宽筋活络；治喉痛，风湿骨痛。

咸虾花 斑鸠木

V. solanifolia Benth.

大瑶山、三江、罗城、昭平、上思。

全草治腹痛，肠炎，痧气。作兽药治牛风湿脚软，咽喉肿痛。

圆柱斑鸠菊

V. teres Wall.

桂西北。

全草治痢疾，水肿。

大叶斑鸠菊

V. volkameriaefolia (Wall.) DC.

隆林、百色、田林。

双花蜚蜞菊

Wedelia biflora (L.) DC.

武鸣、大瑶山、南宁、桂林。

蜚蜞菊 卤地菊

W. chinensis (Osbeck) Merr.

桂南、大瑶山。

全草破瘀消肿；治跌打，风湿，腹痛。

荨麻叶蜚蜞菊

W. urticaefolia DC.

桂西南。

高原蟛蜞菊

W. wallichii Less.

龙州、桂平。

苍耳

Xanthium sibiricum Patr.

区内各地。

种子油与桐油相仿，可与桐油掺合制油漆，又可做油墨、肥皂、油毡原料；还可做硬化油、润滑油。全株有毒，果最毒；果通鼻窍，祛风止痛；治鼻炎，神经性头痛，高血压，麻风，淋巴结核，寄生虫病。全草作兽药治牛、猪疮疥，湿疹，水肿等。

异叶黄鹌菜

Youngia heterophylla (Hemsl.) Bab. et Stebb.

临桂。

黄鹌菜

Y. japonica (Thb.) DC.

(*Crepis japonica* Benth.)

临桂、恭城、隆林、乐业、凌云、靖西、百色、东兰、博白、三江。

全草消肿，止痛；治感冒。

●鱼尾菊 百日草

Zinnia elegans Jacq.

各城镇。

绿化花卉。药用全草治痢疾，淋症，乳头痛。

239 龙胆科 GENTIANACEAE

穿心草 串钱草

Canscora lucidissima (Lévl. et Van.) H.-M.

龙州、马山、阳朔、临桂、柳州。

全草凉肝胆，活血止痛；治黄疸，肝炎，胸痛，胃痛，跌打内伤，毒蛇咬伤等。

罗星草☆

C. melastomacea H.-M.

合浦、十万大山、博白、平南、陆川、宁明、大瑶山、荔浦。

全草散瘀止痛，接骨；治跌打。

双蝴蝶

Crawfurdia fasciculata Wall.

(*C. japonica* S. et Z.)

上林、昭平一线以北各地。

全草治乳痈，久痢，月经不调。叶生肌。

蝴蝶草 接筋藤

C. pricei (Marq.) Ma

(*Gentiana pricei* Marq.)

分布同上一种。

全草治刀伤，接筋骨。

美丽藻百年草

Exacum bellum Hance

宁明、藤县、南丹、都安、临桂、桂林。

全草治肝炎，喉炎。

藻百年草

E. tetragonum Roxb.

桂西北。

吊兰龙胆☆

Gentiana atkinsonii Burk.

灵川、临桂、兴安、灌阳、大瑶山、容县、贺县。

华南龙胆 地丁、紫花地丁

G. loureiri (D. Don) Griseb.

大苗山、临桂、全州、龙胜、贵县、武鸣。

全草清热利尿，消炎解毒；治痈疮疖肿，无名肿毒，肝炎，痢疾。

线叶龙胆☆

G. manshurica Kitagawa

贵县、桂林、临桂。

红花龙胆

G. rhodantha Fr.

大瑶山。

根清热利湿；治急性肝炎，小儿肺炎。

坚龙胆 胆草

G. rigescens Fr.

凌云、乐业、田林、隆林。

根、根状茎健胃，泻火，清热，明目，定惊。

龙胆草 胆草、观音草

G. scabra Bunge

桂北、桂西一带。

根泻肝胆实火，除下部湿热；治肝火眼红肿痛，肋肋刺痛，阴囊湿痒，黄疸尿赤，小儿惊风。作兽药治牛肺病，便秘，暑热，伤寒，转圈症。全草作农药治棉蚜虫、玉米螟等害虫。

匙叶草☆

Latouchea fokiensis Fr.

大苗山、临桂、灌阳、龙胜、全州，资源、武鸣。

獐牙菜

Swertia bimaculata (S. et Z.) C B Clarke

龙胜、资源、灌阳、全州、凤山、大苗山、钟山、富川。
根治毒蛇咬伤。

美丽獐牙菜☆

S. pulchella Buch.-Ham.

靖西、隆林、邕宁、容县、桂林、临桂、兴安。

239A 睡 菜 科 MENYANTHACEAE

野苕菜☆

Nymphoides hydrophyllum (Lour.) O.Ktze.

(*Menyanthes hydrophyllum* Lour.)

桂西北。

金银莲花

N. indicum (L.) O.Ktze.

(*Limnanthemum indicum* (L.) Griseb.)

东兴、临桂、桂林。

240 报春花科(樱草科) PRIMULACEAE

点地梅 喉咙草

Androsace saxifragifolia Bunge

(*A. umbellata* (Lour.) Merr.)

柳城。

全草清热解毒；治喉痛，喉炎，扁桃腺炎，口腔炎，跌打摔伤，
眼翳。

过路黄

Lysimachia alfredi Hance

全州、兴安、永福、桂林、临桂、龙胜、大苗山、容县。

全草清热利湿，排石利胆；治黄疸肝炎，尿路感染，尿路结石等。

粗珍珠菜☆

L. aspera H.-M.

桂西北。

泽珍珠菜

L. candida Lindl.

临桂、柳州、天峨、隆林、平果、百色。

全草治痈疮，无名肿毒。

毛柄珍珠菜

L. capillipes Hemsl.

隆林、靖西。

全草益气补虚，祛风活血；治虚弱，气管炎，哮喘，月经不调，

感冒咳嗽。外搽雀斑。茎、叶提芳香油。

异叶珍珠菜

L. capillipes Hemsl.

var. diversifolia Chun et F.Chun

桂林、隆林。

球花珍珠菜☆

L. cephalantha Knuth

临桂、容县。

四川金钱草 铜钱草、过路黄、路边黄

L. christinae Hance

兴安、全州、龙胜、临桂、桂林、河池、大瑶山、容县。

全草治胆囊结石，尿路结石，蛇伤。外敷烫火伤及化脓性炎症。

珍珠菜 扯根菜、野鸡公花

L. clethroides Duby

兴安、全州、资源、龙胜、灵川、灌阳、隆林、西林、凌云、

乐业、大苗山。

全草利水消肿，活血调经；治水肿，跌打，月经不调，白带，疳积，刀伤，喘咳。种子油可制肥皂。叶为野菜。果可酿酒。作猪饲料。

密花排草☆ 细样黄瓜草

L. congestiflora Hemsl.

全州、龙胜、桂林、临桂、大苗山、大瑶山、象州、罗城、平果。

全草清热解毒；治黄疸肝炎，赤白痢，咳嗽痰多，咽喉肿痛，腹泻，小儿脐风等。

延叶珍珠菜

L. decurrens Forst.

临桂、河池、大瑶山、田林、武鸣、大明山、扶绥、横县、龙州、桂平、平南、苍梧。

全草消肿止痛，补血调经；治跌打，疗毒。

灵香草 香草、佩兰、排草

L. foenum-graecum Hance

龙胜、临桂、大苗山、大瑶山、象州、隆林、田林、凌云、乐业、那坡。

名贵芳香植物。全草提制的芳香油广用于烟草及香脂等香精。干品放箱中能防虫蛀衣物。全草芳香辟秽；治鼻塞，齿痛，胸闷腹胀。

大叶排草☆

L. fordiana Hemsl.

龙胜、大瑶山、凤山、凌云、乐业、苍梧。

根治跌打损伤，喉痛，蛇伤，痈毒，疟核。

大田基黄 星宿草、假辣蓼、泥鳅草、红曲根

L. fortunei Maxim.

区内各地。

Lysimachia

全草清热解毒，祛痰除湿；治肝炎，支气管哮喘，痢疾，暑热症，
小儿疳积。

裸头排草☆

L. gymnocephala H.-M.

全州、隆林、苍梧。

西南排草☆

L. henryi Hemsl.

西林。

全草调经养血。

奇异珍珠菜☆

L. insignis Hemsl.

桂西北。

根祛风除湿，舒筋活血；治风湿，跌打，肝炎，骨折。

披针叶珍珠菜

L. lancifolia Craib

桂西北、阳朔。

假半支莲

L. lobelioides Wall.

隆林。

全草治乳房肿痛。

长梗珍珠菜☆

L. longipes Hemsl.

凤山。

全草治刀伤。

重楼排草

L. paridiformis Fr.

全州、龙胜、三江、田林、凌云、乐业。

全草宽胸利膈，祛痰止咳；治肺结核，肠胃炎，小儿久咳，胃痛，风湿痛，跌打，血崩，蛇伤。

聚叶珍珠菜☆

L. phyllocephala H.-M.

兴安、龙胜、桂林、大苗山、大瑶山、象州、横县、容县。

赤褐珍珠菜

L. rubiginosa Hemsl.

桂西北。

石山珍珠菜☆

L. saxicola Chun et F.Chun, ined.

南丹、河池。

吊丝排草☆

L. sikokiana Miq.

全州、兴安、龙胜、南丹、河池、罗城、大苗山、大瑶山、隆林、凌云。

狭叶排草

L. trientaloides Hemsl.

桂林、柳州、梧州、河池等地区。

全草祛风除湿，活血，定惊；治骨折，跌打，小儿惊风。

241 蓝 雪 科(白花丹科)

PLUMBAGINACEAE

紫雪花 红花丹

Plumbago indica L.

陆川、北流、贵县。

全草破血，通经，止痛；治风湿。

白雪花 白花丹、火灵丹、猛老虎

P. zeylanica L.

Plantago-Adenophora

灵山、富川、梧州、平乐、临桂、阳朔、十万大山、贵县、南宁、宁明、龙州、靖西、那坡、百色、隆林、大苗山。

根祛风除湿；治风湿骨痛，腰腿痛，心胃气痛，肝脾肿大。叶多外用，散瘀消肿；治跌打扭伤，恶疮，蛇伤，退眼膜。本品根、叶均有毒。孕妇忌服。外敷时间不可过长。

242 车前草科 PLANTAGINACEAE

车前 车前草

Plantago asiatica L.

田林。

用途同大车前。

车前草 钱贯草、车轮菜、牛舌草、饭匙草、灰盆草

P. major L.

区内各地。

全草、种子利尿通淋，祛痰止咳；治水肿，淋浊，尿急尿痛，咳嗽痰多，支气管炎，肺炎，白带，高血压。

大叶车前☆

P. major L.

var. *sinuata* (Lam.) Decne.

凌云。

全草煎水洗疮疖。

243 桔梗科 CAMPANULACEAE

钝叶沙参☆ 银叶花

Adenophora obtusifolia Merr.

大苗山、柳州、横县、桂林。

根清肺泻火，养阴止咳。

杏叶沙参(注)

A. stricta Miq.

全州、资源、兴安、龙胜、灵川、临桂、富川、贵县、马山、隆林。

功用同钝叶沙参。根可食，又可提淀粉或酿酒。

轮叶沙参

A. tetraphylla (Thb.) Fisch.

(*A. verticillata* Fisch.)

全州、资源、兴安、临桂、阳朔、大苗山、大瑶山、武鸣、马山、凌云。

根清肺泻火，养阴止咳；治支气管炎，肺病咳血，干咳，阴虚发热，咽喉肿痛。嫩茎、叶可食。根含淀粉，可酿酒。

肖牧根草

Asyneuma fulgens (Wall) Briq.

(*Campanula fulgens* Wall.)

桂西北。

土党参 土人参、奶参、金钱豹、风铃藤、桂党参

Campanumoea javanica Bl.

(*C. labordei* Lévl.)

区内各地。

根补中益气，润肺生津；治虚弱怠倦，多汗，心悸，肺结核，腹泻，产后少乳。

剑叶金钱豹

C. lancifolia (Roxb.) Merr.

兴安、龙胜、恭城、荔浦、贺县、融安、大瑶山、大苗山、东兰、天峨、宁明、龙州、那坡、靖西、乐业、隆林。

注：据《中药志》第I卷314页载，目前我国南方习用的商品南沙参，是沙参属多种植物的根部。北方的北沙参是繖形科植物。

Codonopsis-Wahlenbergia

根益气补虚，去瘀止痛，润肺止咳；治气虚，跌打，肠绞痛。

奶参 羊乳、奶叶藤、四叶参

Codonopsis lanceolata (S. et Z.) Benth. et Hk f.

资源、龙胜。

根补中益气，润肺祛痰；治病后虚弱，产后乳少，肺病，乳痈，淋巴结核，蛇伤。作兽药，治牛、猪肺病，乳水不足，痈肿疮疖。根含淀粉，可代粮食制糕点、酿酒。

●党参

C. pilosula (Fr.) Nannf.

南宁、大瑶山。

中药。根补中益气，养胃生津；治虚弱，泄泻，怠倦，肺虚咳嗽，血虚心悸。种子油可制肥皂。

桔梗

Platycodon grandiflorus (Jacq.) A.DC.

桂林地区、柳州地区、南丹、昭平、邕宁等地。

根祛痰，利咽，排脓；治感冒咳嗽痰多，咽喉肿痛，痰壅喘促，肺病，疮毒。作兽药，治牛、猪痰多咳嗽，咽喉肿痛，肺热气促，胸膈不利，肺病和外科痈疽。根含淀粉，可代粮食作糕点和酿酒。种子油供工业用。庭园绿化植物。

兰花参 娃儿草、细叶沙参

Wahlenbergia marginata (Thb.) A.DC.

(*Campanumoea marginata* Thb.,

W. gracilis A.DC.)

兴安、龙胜、临桂、桂林、大苗山、横县、扶绥、武鸣、十万大山、田阳、隆林。

根补虚损，止盗汗，又治白带，疳积。

243A 五隔草科 PENTAPHRAGMATACEAE

中华五隔草

Pentaphragma sinense Hemsl. et Wils.

十万大山。

穗序五隔草

P. spicata Merr.

东兴、龙州、大瑶山、河池。

243B 楔瓣花科 SPHENOCLEACEAE

楔瓣花 木空菜、牛奶藤

Sphenoclea zeylanica Gaertn.

合浦、玉林。

全草外治热疮。

244 半边莲科(山梗菜科) LOBELIACEAE

半边莲 急解索

Lobelia chinensis Lour.

(*L. radicans* Thb.)

龙胜、临桂、桂林、大苗山、罗城、贺县、梧州、陆川、北海。

全草凉血解毒，利尿消肿，散瘀止痛；治蛇伤，水肿，哮喘，跌打，疖肿，扁桃体炎，肠炎腹泻，湿疹。作兽药，治牛、猪蛇伤，痈疽，疮疖，无名肿毒，跌打，全身水肿，腹水，小便不通，气逆喘咳。

广西半边莲☆

L. kwangsiensis E. Wimm.

大苗山、资源、阳朔。

Lobelia-Pratia

狭萼半边莲☆

L. melliana E.Wimm. ex H.-M.

隆林、凌云。

大叶半边莲☆ 大叶山梗菜

L. sequinii Lévl. et Van.

隆林。

长萼半边莲

L. sequinii Lévl. et Van.

forma longisepala E.Wimm.

靖西、那坡、百色。

棱茎半边莲☆

L. succulenta Bl.

(*L. zeylanica* L.p.p.,

L. affinis Wall.)

阳朔、大苗山。

大叶棱茎半边莲☆

L. succulenta Bl.

var. *lobbiana* (Hk.f. et Thoms.) E.Wimm.

罗城。

铜锤玉带草 扣子草、马莲草

Pratia nummularia (Lam.) A.Br. et Aschers.

(*P. begoniifolia* Lindl.)

区内各地。

全草消炎解毒，补虚，退翳；治虚弱，咳吐浓痰，目翳，乳痈。

无名肿毒。

华南玉带草

P. wollastonii S.Moore

罗城。

247 花 葱 科(翠梅科) POLEMONIACEAE

*桔梗石竹 福祿花、福祿考

Phlox drummondii Hk.

常栽作庭园绿化植物。

*天蓝绣球

P. paniculata L.

常栽作庭园绿化植物。

248 田 基 麻 科 HYDROPHYLLACEAE

田基麻 假芹菜

Hydrolea zeylanica (L.) Vahl

宁明、龙州。

249 紫 草 科 BORAGINACEAE

狗舌草

Antiotrema dunnianum (Diels) H.-M.

(*Cynoglossum dunnianum* Diels,

C. cavaleriei Lév.)

隆林。

根、叶捣烂敷患处，治跌打红肿。内服清湿热，利水消肿；治红崩，白带，水肿，肝炎。

斑种草

Bothriospermum tenellum (Roem. et Schult.)

Fisch. et Mey.

临桂、阳朔、柳州、百色、凌云、乐业、隆林。

基及树

Carmona microphylla (Lam.) Don

(*C. retusa* Masamune)

破布木 文本

Cordia dichotoma Forst.f.

龙州、梧州、隆林。

韧皮纤维可造纸、制绳。木材供建筑用。果实可食。

分叉破布木

C. furcans I.M.Johnst.

桂西南。

狭叶倒提壶☆

Cynoglossum lanceolatum Forst.

临桂、龙胜、大苗山、隆林。

全草治蛇伤。

琉璃草

C. zeylanicum (Vahl) Thb. ex Lehm.

凌云。

全草清湿热，利水消肿；治红崩、白带、气虚水肿，肝炎，黄疸。

云南厚壳树 毛板栗

Ehretia dicksoni Hance

扶绥、平果、田阳、兴安等地。

木材稍硬，不易破裂，可作建筑、用具、装饰用材。嫩枝、叶可作绿肥。果、叶作农药，可防治棉蚜、毛蜘蛛。种子油可制肥

皂。树皮可提染料。叶具粗毛，可洗擦器皿、用具。

椴叶厚壳树

***E. dicksoni* Hance**

var. *tilioides* I.M. Johnst.

那坡、凌云、乐业、隆林、南丹、都安、大苗山、临桂、龙胜。

长花厚壳树

***E. longiflora* Champ. ex Benth.**

横县、扶绥、龙州、靖西、田阳、百色、凌云、隆林、大苗山、大瑶山、贺县、永福。

厚壳树

***E. thyrsoflora* (S. et Z.) Nakai**

(*E. acuminata* R.Br.

var. *obovata* (Lindl.) I.M. Johnst.)

全州、兴安、临桂、梧州、大瑶山、柳州、横县、南宁、武鸣、龙州、靖西、田林、隆林、贵县、陆川。

木材供建筑、用具、装饰用材。树皮可作染料。绿化树种。

上思厚壳树

***E. tsangii* I M Johnst.**

十万大山、武鸣。

叶治蛇伤。能解食物中毒。

天芥菜 狗尾虫

***Heliotropium indicum* L.**

梧州、横县、南宁。

紫草 红条紫草

***Lithospermum erythrorhizon* S. et Z.**

全州、资源、兴安、龙胜、临桂、乐业、隆林、永福。

根凉血，活血，解毒；治热毒发斑，痈肿，烫火伤，便秘，冻

Rotula-Atropa

伤，刀伤，湿疹。根产红色染料，适用于棉、丝织品染色。

轮冠木

Rotula aquatica Lour.

南宁。

盾果草

Thyrocarpus sampsonii Hance

兴安、桂林、永福。

大叶附地菜☆

Trigonotis macrophylla Van.

var. *verrucosa* I M Johnst.

大苗山、龙胜。

全草治风湿，疝气。

附地菜

T. peduncularis (Trev.) Benth.

龙胜、临桂。

全草祛风止痛；治手足麻木，胸肋骨痛。

250 茄 科 SOLANACEAE

广西地海椒

Archiphysalis kwangsiensis Kuang

贺县。

*颠茄

Atropa belladonna L.

桂林。

干根和叶的制剂，在医药上用作镇静，止痛，局部麻醉，抗痉挛药；制成复方颠茄片、颠茄酊，治轻度肠胃绞痛；制成硫酸阿托品，用于胃、肠、胆、肾绞痛，有机磷中毒，散瞳等。

* 鸳鸯茉莉

Brunfelsia acuminata (Pohl) Benth.

常栽作庭园绿化植物。

* 辣椒 香椒、鸡嘴椒

Capsicum annuum L.

果供蔬菜和调味品用。作药用；发汗，健胃，亦作皮肤引赤剂。

茎治风湿冷痛，冻疮。

* 樱桃椒

C. annuum L.

var. *cerasiforme* Irish

常作庭园绿化植物。

* 指天椒

C. annuum L.

var. *conoides* Irish

果供蔬菜和调味品用。作兽药，治牛、猪胃寒不食，消化不良，

外擦风湿痹痛；又治鸡白痢。

* 灯笼椒

C. annuum L.

var. *grossum* Sendt.

果供蔬菜用。

* 牛角椒

C. annuum L.

var. *longum* Sendt.

果供蔬菜用。

* 红花夜来香 炮仗红、红花洋素馨

Cestrum elegans Schlecht.

常栽作庭园绿化植物。

●夜来香

C. nocturnum L.

常栽作庭园绿化植物。花可提芳香油。

白花曼陀罗 闹羊花

Datura metel L.

栽培或野生。花、果、叶有大毒；麻醉止痛，除风湿，平喘咳；治哮喘，肌肉疼痛，麻木，寒湿，脚气，跌打，蛇伤。作兽药，全株亦可用，治猪喘气病，又治牛、猪跌打，痈疽恶毒，风湿痹痛。全株作农药，水煮液防治稻螟、蚜虫、红蜘蛛、玉米螟、小造桥虫和其他软体害虫。花、果可灭子孓。

曼陀罗

D. stramonium L.

桂林、南宁、上林、龙州、百色等地。

功用近白花曼陀罗。

●莨菪 “天仙子”

Hyoscyamus niger L.

南宁。

种子有大毒；定痉，止痛；治癫狂，抽搐，肌肉麻木疼痛，咳喘，久痢久泻，恶肿毒。种子、茎、叶可提莨菪油供车辆润滑油和照明用。种子油可制肥皂和油漆。

钮扣子 十萼茄

Lycianthes biflora (Lour.) Bitt.

(*Solanum biflorum* Lour.)

区内各地。

根、叶、果治消化不良，疮疥，蛇伤，跌打，虚弱咳嗽。

排草叶钮扣子☆

L. lysimachioides (Wall.) Bitt.

大瑶山、龙胜。

紫花钮扣子☆

L. lysimachioides (Wall.) Bitt.

var. *sinensis* Bitt.

龙胜。

●宁夏枸杞

Lycium barbarum L.

功同枸杞，但质量较好。

●枸杞 枸杞菜、地骨皮

L. chinense Mill.

区内各地。

果滋补肝肾，润肺，益精明目；治虚劳精亏，腰脊酸痛，肝肾不足，头晕眼花，视力减退，虚劳发热，肺热咳喘。根皮泻火，清热凉血，退虚热；治咳嗽吐血，烦热消渴。嫩叶供蔬菜食用，能清热。种子油可制润滑油。

●番茄 西红柿、毛秀才

Lycopersicum esculentum Mill.

区内各地。

蔬菜作物。果供生食或作蔬菜，制果汁、果酱。

●烟草

Nicotiana tabacum L.

农作物，烟草工业原料。作农药，叶、茎水煮或干粉或烟油防治稻螟、地蚕、蚜虫、红蜘蛛、红薯金花虫、浮尘子、黄条跳蚱、三化螟、蔬菜害虫等。烟草制剂不能久放，应尽快使用。烟草含有麻醉物质，称烟碱，也叫尼古丁。叶治骨节疼痛，偏头

Petunia-Solanum

痛，蛇伤。烟筒油垢可治蛇伤，蜈蚣伤。

●彩花茄 碧冬茄

Petunia hybrida Vilm

常栽作庭园绿化植物。

●矮茄

P. violacea Lindl.

常栽作庭园绿化植物。

苦蕒

Physalis angulata L.

临桂、龙州。

全草治膀胱炎。

酸浆 打拍草

P. franchetii Mast.

var. *bunyardii* (Hort.) Mak.

(*P. alkekengi* auct. fl. asiat, non. L.)

野生或栽培庭园绿化植物。缩萼清热，利尿，化痰；治咽喉肿痛，热痰咳嗽，小便不利，湿疮痈肿。孕妇忌用。果可食。

灯笼泡 小酸浆

P. minima L.

临桂、梧州、玉林、南宁、宁明、龙州、隆林。

全草清热解毒，化痰止咳；治感冒发热，咽喉肿痛，急性支气管炎，腮腺炎，睾丸炎，脓疱疮，湿疹，疖肿。作兽药，治牛、猪风热咳嗽，呕逆痰壅，风热腹痛，热眼红肿；外敷治天疱疮。

龙珠

Solanum bigeminatum Nees

兴安、临桂、蒙山、贺县、大苗山、大瑶山、那坡。
果实有毒。

黄刺茄(注)

S. coagulans Forsk.

梧州、大瑶山、武鸣、那坡等地。

果可治虫牙痛。

粤桂茄

S. debilissimum Merr.

宁明、龙州。

苦茄 千年不烂心、白英、野番茄

S. dulcamara L.

(*S. dulcamara* L.

var. *chinense* Dunal,

S. dulcamara L.

var. *pubescens* Bl.,

S. lyratum Thb.)

大瑶山、南宁、宁明、十万大山。

全草清热解毒，祛风止痛；治阴道糜烂，疮疮，癣疥，风湿痛，癌症，黄疸，丹毒，疔疮，月经不调，白带，蛇伤。作兽药，治牛、猪黄疸，水肿，小便淋沥，阴道糜烂，赤白带，痢症，恶疮，癣疥，皮肤搔痒。全株可作农药。

大叶毛刺茄 毛茄

S. ferox L.

大瑶山、武鸣、龙州、靖西、百色、临桂。

全株治跌打，疝气。

紫花茄 五宅茄

S. indicum L.

区内各地。

注：黄刺茄、苦茄、紫花茄、玉珊瑚、刺茄、假烟叶等全株有毒，尤其是未成熟的果最毒，含有茄碱等几种生物碱，中毒时可照生物碱中毒解救方法解救。

Solanum

根、全草散瘀止痛，清肝明目；治咽喉炎，淋巴结炎，跌打，风湿痛，风火赤眼，咳嗽。

五角茄

S. mammosum L.

苍梧、梧州、南宁、柳州、桂林。

全草治瘰癧，心气痛。果治胃痛。常栽作庭园绿化植物。

●卵茄

S. melongena L

var. depressum Bailey

蔬菜。

●茄 矮瓜

S. melongena L.

var. esculentum Nees

蔬菜。根、茎、花清热利湿，祛风止咳；治年久咳嗽，久痢，白带，风湿痛，冻疮，乳痈。生茄子和种子可解覃毒。

●长萼茄

S. melongena L.

var. serpentinum Bailey

蔬菜。

龙葵

S. nigrum L.

区内各地。

全草清热解毒，利水消肿；治小便不利，淋浊，白带，痈疮肿毒，湿疹，咳嗽，喉痛。作农药，防治棉蚜、红蜘蛛。

少花龙葵 左钮菜、扣子草

S. nigrum L.

var. pauciflorum Liou

博白、桂林、乐业。

无毒。叶可供蔬菜食。

海南茄

S. procumbens Lour.

(**S. hainanense** Hance)

合浦。

●玉珊瑚

S. pseudo-capsicum L.

常栽作庭园绿化植物。

根生肌埋口，解毒止痛；治疮疖，劳伤腰痛。

山烟木

S. spirale Roxb.

宁明、那坡、田林、隆林、凤山、都安、南丹、天峨。

根利尿。叶止咳。

刺茄 钉茄

S. surrattense Burm.f.

(**S. aculeatissimum** Jacq.)

区内各地。

根、果、叶抗菌，活血散瘀，麻醉止痛，镇咳平喘；治风湿腰痛，

跌打，慢性支气管炎，哮喘，感冒，慢性骨髓炎，冻疮，淋巴结核，

脚癣，蛇伤。作兽药，治牛、猪气喘咳嗽；外敷治跌打，疮痈。

水茄

S. torvum Sw.

梧州、临桂、贵县、十万大山、宁明、龙州、田东、隆林、都安、东兰、天峨。

根散瘀消肿，止痛；治跌打瘀痛，腰肌劳损，胃痛。

●马铃薯

S. tuberosum L.

Solanum-Argyreia

区内各地。

块茎可作粮食和蔬菜，又可制淀粉和酒精。发芽的块茎含毒质龙葵精，多集于芽旁及皮下，不能食。食时要多削些皮，浸水中数小时，充分煮熟才可食。

假烟叶 野烟叶、土烟叶

S. verbascifolium L.

区内各地。

全草有毒；消肿解毒，行气止痛，生肌收敛；治痈疮肿毒，皮炎湿疹，腹痛，骨折。作兽药，治牛、猪肠胃胀气，猪咳嗽；外敷疮痈，外洗疥癣。

251 旋花科 CONVULVACEAE

白鹤藤 白背绸缎、一匹绸

Argyreia acuta Lour.

梧州、苍梧、昭平、藤县、贺县、贵县、陆川、北流、玉林、平南、灵山。

全藤止咳祛痰，去湿生肌；治咳嗽，疮疖脓肿，乳痈，水火烫伤。

毛白鹤藤☆

A. capitata (Vahl) Choisy

龙州、扶绥、百色、凌云、那坡、隆林。

叶生肌愈合，止痛。

钝叶白鹤藤

A. obtusifolia Lour.

那坡。

叶治跌打损伤，白带，内伤吐血。

白花银背藤 旋花藤、白背藤

A. sequini (Lévl.) Van.

扶绥、大新、龙州、宁明、天峨、河池、南丹、都安、靖西、百色、那坡。

全草驳骨止血，生肌收敛；治内伤。

苞叶藤 拍岭葛

Blinkworthia discostigma H.-M.

百色。

●月光花

Calonyction aculeatum (L.) House

(*Ipomoea bona-nox* L.,

C. speciosum Choisy)

桂林、南宁等市。

绿化藤本。嫁接于红薯上，可提高红薯产量。苗、叶作猪饲料。

全草治蛇伤。

●白月光花☆

C. album (L.) House

桂林、柳州。

篱天剑

Calystegia sepium R.Br.

临桂、桂林。

菟丝子 豆寄生、雾水藤、小粒菟丝子

Cuscuta chinensis Lam.

龙州、南宁、武鸣、百色、河池、天峨、临桂、贺县、贵县。

种子补肾固精，养肝明目；治阳萎，遗精，肾虚腰酸痛，视力减

退。藤活血散瘀；治扭挫伤。

雾水藤 红雾水藤、大粒菟丝子

C. japonica Choisy

大瑶山、苍梧、宁明、大新、龙州。

茎煎出液作粉刷灰浆的糊料。种子补肾益精，止泻杀虫；治阳

萎，遗精，白带，目赤痛。

马蹄金 黄胆草、洒窝草、四川小金钱草、小灯盏

Dichondra repens Forst.

Erycibe-Ipomoea

靖西、罗城、桂北、大瑶山。

全草清热利尿，行气止痛，止血生肌；治肝炎黄疸，胆石症，尿路结石，水肿，乳腺炎，菌痢，跌打，月经不调。

光滑麻辣子☆ 光滑丁公藤

Erycibe laevigata Wall.

大瑶山、十万大山。

瑶山麻辣子☆

E. sinii Chun et How

大瑶山。

银丝草 土丁桂

Evolvulus alsinoides L.

百色、凌云、隆林、龙州、宁明、临桂、柳州。

全草清湿热，消积滞；治急性肠炎，尿路感染，尿血，白带，痢疾。

★蕹菜 空心菜

Ipomoea aquatica Forsk.

(*I. reptans* Poir.)

区内各地。

蔬菜。药用全草解毒，利尿；治食物中毒，痈疮，虫牙痛，白带。

★红薯 番薯

I. batatas (L.) Poir.

区内各地。

薯作粮食或饲料，加工制红薯淀粉、红薯粉丝、酒精、葡萄糖等。薯藤作猪饲料。药用藤叶清热利湿，润肺止咳，去腐排脓；治痧症，乳痈，疔疮，咳嗽，吐血，便血，泻痢，蛇虫伤。

五爪金龙 上竹龙

I. cairica (L.) Sweet

(*Convolvulus cairicus* L.,

***I. palmata* Forsk.)**

容县、贵县、北流、百色、柳州、合浦、梧州、苍梧。

叶治痈疮。果治跌打，腹壅积。全草作猪饲料。作蔽荫绿化植物。

密生牵牛☆

***I. congesta* R.Br.**

隆林、资源。

七爪龙 藤商陆、野牵牛

***I. digitata* L.**

(*I. paniculata* R.Br.)

龙州、扶绥、南宁、博白、陆川。

根、叶泻水解毒，拔脓散结；治水肿腹胀，乳痈，瘰癧等。肉质根可提制淀粉或酿酒。作猪饲料。

华陀花 勒番薯、老虎豆

***I. hardwickii* Hemsl.**

(*I. calycina* Benth.)

贺县、梧州、钟山、龙州、宁明、南宁、隆林、百色、天峨、柳州、平乐。

茎、叶治小儿疳积。种子治跌打，蛇伤。

牵牛 喇叭花

***I. hederacea* Jacq.**

龙州、南宁、宁明、钟山、昭平、大瑶山、桂林、隆林、百色、天峨。

种子有小毒；泻下，利尿；治二便不通，蛔虫腹痛，水肿胀满，痰饮。全草作猪饲料。又可杀猪蛔虫。

总苞牵牛

***I. involucrata* Beauv.**

邕宁、龙州、那坡、百色、巴马。

小心叶薯

***I. obscura* (L.) Ker-Gawl.**

Ipomoea-Lepistemon

隆林、凌云。

种子逐水，利小便。

厚藤 马鞍藤

I. pes-caprae (L.) Sweet

(**I. biloba Forsk.**)

合浦。

毛七爪龙 虎掌牵牛、毛五爪龙

I. pes-tigridis L.

龙州。

根泻下；治咯血。

★**紫花牵牛 毛牵牛**

I. purpurea (L.) Roth

区内城镇。

绿化花卉。种子泻下利尿。

大叶牵牛

I. staphylina Roem. et Schult.

龙州、武鸣、博白。

小牵牛

Jacquemontia paniculata (Burm f.) Hall.f.

龙州。

延叶鳞蕊藤☆

Lepistemon decurrens H.-M.

百色、南宁、上思。

分裂鳞蕊藤☆

L. lobatus Pilger

龙州。

戟叶鱼黄草

***Merremia hastata* (Desr.) Hall.f.**

玉林。

全草外用治骨节疼痛。

鱼黄草 茛菪藤

***M. hederacea* (Burm.f.) Hall.f.**

(*Lepistemon glaber* H.-M., fide Y.Tsiang, in herb.)

百色与云南交界处、上林、平乐。

全草清热解毒，利咽明目；治感冒，结合膜炎，扁桃体炎，咽喉炎；外用治疮疥。

毛鱼黄草

***M. hirta* (L.) Merr.**

南宁、梧州、那坡。

繖花鱼黄草

***M. umbellata* (L.) Hall f.**

龙州、宁明、邕宁、上思、百色、那坡、大瑶山、都安。

葡萄叶鱼黄草☆

***M. vitifolia* (Burm.f.) Hall.f.**

田阳。

盒果藤

***Operculina turpethum* (L.) Manso**

(*Ipomoea turpethum* R.Br.)

龙州、宁明、邕宁、百色、巴马。

根缓下；治热病，水肿。叶松筋。

小翼萼藤☆

***Porana racemosa* Roxb.**

那坡、百色、隆林、凤山、龙胜。

飞蛾藤

P. sinensis Hemsl.

(*Porana delavayi* Gagn. et Curch.)

融安、宁明、凌云、乐业、南丹、阳朔、平乐。

大翼萼藤

P. spectabilis Kurz

(*P. megalantha* Merr.)

隆林、靖西、东兰、天峨、龙州、邕宁、武鸣。

葛萝

Quamoclit pennata (Lam.) Bojer

(*Q. vulgaris* Choisy)

区内各地。

缠绕草质藤本，供绿化用。

252 玄参科 SCROPHULARIACEAE

蓝花毛麝香

Adenosma caeruleum R.Br.

平南、藤县、巴马。

全株行气，消肿，止痛。

毛麝香

A. glutinosum (L.) Druce

(*A. grandiflorum* Benth.)

贵县、贺县、昭平、梧州、大瑶山、临桂。

全草祛风活络，散瘀止痛；治小儿麻痹症初期，风湿骨痛，跌打损伤，毒蛇咬伤，疮疡湿疹。作兽药参照使用。

球花毛麝香 沙虫药

A. indianum (Lour.) Merr.

(*A. capitatum* Benth.)

南宁、宁明、贵县、梧州、贺县、德保、百色、乐业、上思、全州、柳州。

全草疏风解表，散瘀止痛；治感冒，咳嗽，发热，头痛，消化不良，腹胀腹泻，皮炎，沙虫脚。

● 金鱼草 龙头花

Antirrhinum majus L.

区内城镇。

本种花期长，花色鲜艳多彩，是公园、花园常栽花卉，也可作花束等用。

多花假马齿苋☆

Bacopa floribunda Wettst.

贺县。

广西腹水草☆

Botryopleuron grandifolium Chun et How, ined.

龙胜。

来江藤☆

Brandisia hancei Hk.f.

南丹、凌云、乐业。

广西来江藤☆

B. kwangsiensis H.L.Li

大瑶山、那坡。

广东来江藤☆

B. swinglei Merr.

大瑶山、隆林、那坡。

黑草 鬼羽箭

Buchnera cruciata Buch.-Ham.

河池、巴马、柳州、靖西、隆林、藤县、合浦、马山。

全草清热解暑；治流感，腹痛，疟疾，肺癆，荨麻疹，暑热口渴，
癫痫等。作兽药治牛、猪风湿，跌打，猪丹毒；外敷治疮痈，
无名肿毒，血箭。

四方麻 假金鸡尾

Calorhabdos cauloptera Hance

临桂、全州、平乐、漓江沿岸、昭平、大苗山。

全草清热解毒，消肿止痛；治腮腺炎，咽喉炎，结合膜炎，淋巴
结核，痢疾，黄疸，尿血，湿疹，烫火伤，疔疮，蛇伤。

白花阿生草 赛尔茜

Celsia coromandeliana Vahl

天峨、南宁。

全草解热；治痢疾，皮肤病。

华白花阿生草☆

C. coromandeliana Vahl

var. *chinensis* Murb.

南宁。

胡麻草

Centranthera cochinchinensis (Lour.) Merr.

(*C. hispida* R.Br.)

靖西、罗城、桂林。

泥花草

Illysanthes antipoda (L.) Merr.

(*Ruellia antipoda* L.,

Bonnaya veronicifolia (Retz.) Spreng.)

隆林、百色、龙州、柳州、大苗山、龙胜、梧州、贵县。

全株消肿去毒；治蛇伤，热疮，羊毛痧。作兽药治猪喘气病，湿热腹泻。

旱田草

I. ciliata (Colsm.) O.Ktze.

(*Gratiola ciliata* Colsm.,

Bonnaya reptans Spreng.)

苍梧、武鸣、龙州、上思、平南、大苗山、大瑶山、天峨、东兰、田林、那坡、凌云、隆林、恭城。

全草清热解毒，消肿破瘀；治赤痢，蛇伤，跌打，疮疥，产后腹痛。

齿叶泥花草

I. serrata (Roxb.) Urban

(*Bonnaya brachiata* Link et Otto)

南宁、邕宁、百色、大瑶山。

全草清肺热；治疮毒，蛇伤，功近旱田草。

细叶泥花草☆

I. tenuifolia Urban

柳州、桂林、大瑶山。

紫苏草

Limnophila aromatica (Lour.) Merr.

桂南。

全草清热解毒，消肿止痒；治蛇伤，疮毒，癣疥，感冒等。

中华石龙尾☆ 肖紫草

L. chinensis (Osbeck) Merr.

南宁、宁明、武鸣、贺县、贵县、上思、柳州。

全草消肿拔毒；治水肿，痞积，全身痒痛。

大叶水辣椒

L. connata (Buch.-Ham) H.-M.

(*Cybbanthera connata* Buch.-Ham.,

L. hypericifolia Benth.)

异叶石龙尾☆

L. heterophylla Benth.

桂林、阳朔。

水八角 大叶石龙尾

L. rugosa (Roth) Merr.

临桂、武鸣、龙州、大新、苍梧、岑溪、容县。

全草提芳香油。药用续筋驳骨，健胃止痛；治水肿，疝气，跌打骨折，蛇伤，疮疮。

石龙尾 假水八角

L. sessiliflora (Vahl) Bl.

龙州、桂林、临桂。

钟萼草☆

Lindenbergia philippinensis (Cham.) Benth.

(*L. melvillei* S.Moore)

河池、百色、梧州。

狭叶母草☆

Lindernia angustifolia (Benth.) Wettst.

临桂。

长蒴母草

L. cordifolia (Colsm) Merr.

(*L. pedunculata* Wettst.

Vandellia pedunculata Benth.)

大瑶山、柳州、南丹、罗城、凤山、隆林、苍梧、桂平、合浦。
全草清热解毒；治乳痈，腮腺炎，蛇头疮，蛇伤，气喘。

母草

L. crustacea (L.) F. Muell.

(*Vandellia crustacea* Benth.)

梧州、贺县、苍梧、昭平、玉林、龙州、南宁、上思、融安、大
瑶山、永福、罗城、东兰。

全草清热利湿；治痢疾，肠炎，腹泻，蛇伤，肝炎，水肿。

铜钱叶母草

L. nummularifolia (G. Don) Wettst.

大苗山。

具盖母草

L. pyxidaria All.

柳州、柳城。

荨麻叶母草☆ 野凉粉草

L. urticifolia Hance

贺县、苍梧。

粘母草☆

L. viscosa (Willd.) Merr.

东兴、十万大山、大瑶山。

全草治毒疮，乳痈。

通泉草

Mazus japonicus (Thb.) O. Ktze.

(*M. rugosus* Lour.)

临桂、龙胜、大苗山、柳城、南宁、上思、河池、凤山、百色、
隆林、靖西、凌云、乐业、昭平。

全草清热解毒；治脓疱疮，无名肿毒。作猪饲料。

Melampyrum-pedicularis

山萝花

Melampyrum esquirolii (Lévl. et Van.) H.-M.

全州。

泡桐 白桐

Paulownia fortunei (Seem.) Hemsl.

区内各地。

木材轻软，不易传热，适于做保险箱衬板。亦可作箱、柜、乐器等用材。枝、叶作绿肥。花、叶作猪饲料，可使猪肥大。作环境绿化树。根药用祛风，止痛，消肿毒。

长叶泡桐

P. longifolia H.-M.

龙胜、大苗山。

广西泡桐☆

P. rehderiana H.-M.

龙胜、兴安、大瑶山。

毛泡桐 马蹄郎

P. tomentosa (Thb.) Steud.

大苗山、龙胜、阳朔、荔浦、兴安、靖西。

用途参阅泡桐。

粘毛泡桐☆

P. viscosa H.-M.

桂西北、临桂。

西南马先蒿☆

Pedicularis henryi Maxim.

兴安、全州、龙胜。

松蒿

Phtheirospermum japonicum (Thb.) Kanitz

(*P. chinensis* Bunge)

容县、昭平。

苦玄参

Picria fel-terrae Lour.

龙州、东兰。

全草治腹痛，疳积，喉痛，心气痛，瘰癧，蛇伤。

黑翅茎草

Pterygiella nigrescens Oliv.

河池。

★地黄

Rehmannia glutinosa (Gaertn.) Libosch.

桂林、南宁。

生地养阴清热，凉血止血；熟地滋阴补血；治高热，吐血，衄血，口舌生疮，小便短赤，贫血，月经不调，腰痛，遗精，头晕耳鸣。

★怀庆地黄

R. glutinosa (Gaertn.) Libosch.

forma *hueichingensis* (Chao et Schih) Hsiao

藤县、富川、平南、桂平、北流、容县、南宁。

功用参阅地黄。

★炮仗竹 马骝花、吉祥草

Russelia equisetiformis Schleht. et Cham.

平南、柳城、桂林。

全草治跌打，骨折。绿化花卉。

野甘草 土甘草

Scoparia dulcis L.

Scrophularia-Striga

苍梧、梧州、贵县。

全草清热利湿，生津止渴；治感冒发热，腹炎腹泻，水肿，小便不利，湿疹热痱。代茶饮用。

*北玄参 玄参

Scrophularia buergeriana Miq.

桂林。

用途参阅浙玄参。

*玄参 浙玄参、元参

S. ningpoensis Hemsl.

桂东、桂东南。

根滋阴降火，润燥生津，消肿解毒；治热病伤阴，口渴便秘，咽喉肿痛，发斑，痈肿，瘰癧。

阴行草 茵陈草、鸡肉菜

Siphonostegia chinensis Benth.

武鸣、邕宁、龙州、资源、兴安、永福、临桂、贺县。

全草清热解毒，利湿消肿，活血散瘀，顺气化痰；治黄疸，肠炎腹泻，水肿，尿血，烫火伤，漆疮，产后血瘀腹痛，闭经等。

短冠草 英雄草

Sopubia trifida Buch.-Ham.

藤县、南丹、上思、大瑶山、永福、龙胜、临桂、隆林。

全草驱肠寄生虫。

独脚金

Striga asiatica (L.) O.Ktze.

(*S. lutea* Lour)

罗城、大瑶山、临桂、资源、桂林、百色、隆林、平南、贵县、昭平、武鸣、邕宁、马山。

全草健脾消食，清热利尿；治小儿疳积，食积腹泻，黄疸。

大独脚金☆

S. masuria (Buch.-Ham.) Benth.

武鸣、扶绥、全州、临桂、河池。

同色蓝猪耳 灯笼草

Torenia concolor Lindl.

龙州、大新、大苗山、凌云、乐业、东兰、巴马、天峨、恭城、临桂、兴安、龙胜、平乐、昭平。

全草清热利湿，散瘀，止咳；治黄疸，血淋，风热咳嗽，蛇伤，疗毒，腹泻，跌打损伤。

黄花蓝猪耳☆

T. flava Buch.-Ham. ex Wall.

博白、上思、宁明。

全草治阴囊肿大。

光叶蓝猪耳☆

T. glabra Osb.

(*T. benthamiana* Hance)

罗城、大苗山、大瑶山、全州、邕宁、百色。

全草清热解毒，止血止痛；治跌打刀伤，蛇伤。

毛叶蓝猪耳☆

T. hirsuta Lam.

苍梧、藤县、平南。

全草治疗疮。

总梗蓝猪耳☆

T. peduncularis Benth.

龙州、大瑶山、临桂、龙胜、兴安、永福。

蝴蝶蓝猪耳☆ 蝴蝶花

T. vagans Roxb.

Veronica-Gleadowia

大瑶山。

水苦葵

Veronica anagallis L.

凌云、田阳、乐业、东兰、临桂。

苗、叶作蔬菜。全草和血止痛，通经止血；治闭经，跌打红肿
吐血。

蚊母草

V. peregrina L.

桂林、临桂。

婆婆纳

V. polita Fries

柳城、柳州、大瑶山。

253 列 当 科 OROBANCHACEAE

野菰

Aeginetia indica L.

(*A. japonica* S. et Z.)

宁明、马山、大明山、上思、大瑶山、大苗山、藤县、贺县、昭

平、平南、桂林、资源、兴安、临桂、灵川、灌阳、西林。

全草解热止咳；治喉痛，骨髓炎。

广东蔹寄生☆

Gleadowia kwangtungensis Hu

隆林、龙州。

石蜡烛

G. lepoensis Hu

临桂。

全草治横痃。

254 狸藻科 LENTIBULARIACEAE

蓝花狸藻(注)

Utricularia affinis Wight

黄花狸藻

U. aurea Lour.

(*U. flexuosa* Vahl)

藤县、南宁等地。

二裂狸藻☆

U. bifida L.

灵山、大瑶山、富川、昭平、临桂、龙胜等地。

小狸藻

U. exoleta R.Br.

梧州、临桂。

圆叶狸藻

U. orbiculata Vahl

大瑶山。

总序狸藻☆

U. racemosa Wall.

大瑶山、柳州。

256 苦苣苔科 GESNERIACEAE

上树蜈蚣

Aeschynanthus buxifolius Hemsl.

大瑶山、资源。

全草治蛇虫伤。

注：本属植物是食虫植物。

芒毛茛苔

A. chinensis Gardn. et Champ.

大瑶山、扶绥、宁明、靖西。

全草补血，祛风，去湿。

广西旋蒴苣苔☆

Boea anceps Chun

龙州。

网脉旋蒴苣苔

B. dictyoneura Hance

武鸣、南丹。

全草益气补血，止咳；治腹痛，劳伤，产后流血不止。

旋蒴苣苔

B. hydrometrica (Bunge) R.Br.

南丹、东兰、田林、隆林。

红旋蒴苣苔

B. rufescens Fr.

上林、南丹、凤山、东兰、凌云、百色、隆林。

全草补血，益精。

台湾旋蒴苣苔☆ 土烟叶

B. swinhoii Hance

大苗山、南丹、河池、凤山、天峨、百色、龙州。

叶治内伤。

异药苣苔

Brachiostemon macrocalyx H.-M.

龙州、靖西、那坡。

大嘴肥肚苣苔

Briggsia macrosiphon (Hance) Chun

(*Chirita macrosiphon* Hance)

全草清热，消肿。

广西肥肚苣苔

B. stewardii Chun

三江、龙胜。

鹿角苣苔

Ceratoscyphus caeruleus Chun

十万大山。

中华被萼苣苔

Chlamydoboea sinensis (Oliv) Stapf

(*Phylloboea sinensis* Oliv.)

凌云。

深隐长蒴苣苔☆

Didymocarpus anachoretus (Hance) Lévl.

(*Chirita anachoretus* Hance)

大明山、大瑶山、南丹、凌云、昭平、临桂、恭城。

南长蒴苣苔

D. dimidiatus (R Br.) Chun

(*Chirita dimidiatus* R.Br.)

凌云。

两广长蒴苣苔

D. dryas (Dunn) Chun

隆林。

牛耳朵

D. eburneus (Hance) Lévl.

(*Chirita eburnea* Hance,

C. faurei Fr.)

Didymocarpus

兴安、临桂、桂林、富川、柳州等地。

全草清肺止咳，补虚止血；治肺结核，咳喘，吐血，红崩白带。

蚂蟥七 红蚂蟥七、石螃蟹、捷萼长蒴苣苔

D. fimbrisepalus H.-M.

(*Chirita fimbrisepalus* H.-M.)

全州、龙胜、临桂、大苗山、大瑶山、蒙山。

根茎健脾消食，清热除湿，凉血止痛；治小儿疳积，胃痛，肝炎，痢疾，跌打。

多花长蒴苣苔☆

D. floribundus Chun

容县、大瑶山、武鸣。

苗山长蒴苣苔☆

D. floribundus Chun

var. *retrotrichus* Chun

大苗山。

钩状长蒴苣苔☆

D. hamosus Wall.

凌云、百色。

单叶钩长蒴苣苔☆

D. hamosus Wall.

var. *unifolius* (C.B.Cl.) H.-M.

桂西北。

肥牛草 耳草长蒴苣苔

D. hedyotideus Chun

龙州、宁明、武鸣。

根茎治劳伤咳嗽；外用消肿，治跌打，马口疔。

靖西长蒴苣苔☆

D. holocalyx Chun

靖西。

广西长蒴苣苔☆

D. kwangsiensis Chun, ined.

大苗山。

破血丹 浅裂长蒴苣苔

D. pinnatifidus H.-M.

大明山、凌云、罗城、大苗山、大瑶山、资源、临桂、兴安、龙胜、全州。
全草消肿毒。

小石上莲☆

D. pinnatifidus H.-M.

var. *grossedentatus* Chun

大瑶山。

华长蒴苣苔

D. sinensis (Lindl.) Lévl.

苍梧。

全草治无名肿毒。

上思长蒴苣苔

D. sinohenryi Chun

十万大山、大瑶山。

狭花长蒴苣苔☆

D. stenanthos C.B.Clarke

凌云。

瑶山长蒴苣苔☆

D. verecundus Chun

大瑶山。

独脚莲花

Epithema carnosum (D.Don) Benth.

百色。

大降龙草☆

Hemiboea follicularis C.B.Clarke

苍梧、龙胜、大苗山。

叶治化脓炎症。

纤细半蒴苣苔☆

H. gracilis Chun, ined.

龙胜、临桂。

降龙草

H. subcapitata C.B.Clarke

龙胜、大苗山。

互生苣苔

Isanthera discolor Maxim.

藤县、贺县。

斜蒴苣苔

Loxostigma chinensis Chun, ined.

那坡、靖西。

滇桂斜蒴苣苔☆

L. griffithii (Hk.f. et Th) C.B.Clarke

凌云。

胡麻斜蒴苣苔☆

L. sesamoides H.-M.

大瑶山。

两广吊石苣苔☆

Lysionotus chingii Chun

龙州、凌云。

丝柄吊石苣苔☆

L. filipes Chun, ined.

龙胜。

海南吊石苣苔☆

L. hainanensis Merr. et Chun

龙州、靖西、那坡、乐业、东兰。

少花吊石苣苔☆ 石吊兰

L. pauciflorus Maxim.

(*L. wilsonii* Kranzl.)

区内各地。

全草益肾强筋，散瘀止痛；治骨折，跌打，风湿骨痛，胃痛，血崩，小儿疳积。常盆栽供室内布置。

马铃苦苣苔

Oreocharis argyreia Chun

昭平、蒙山、大瑶山、大明山、德保、靖西。

耳状苣苔

O. auricula (Moore) C.B.Clarke

全州、资源、龙胜、大苗山、罗城。

石上莲

O. benthami C.B.Clarke

贺县、大瑶山、大苗山、兴安。

全草治跌打，刀伤，烂脚。

网脉石上莲☆

O. benthami C.B.Clarke

var. *reticulata* Dunn

(*Didymocarpus oreocharis* Hance)

Petrocodon-Slackia

兴安、临桂、大瑶山、蒙山、横县、靖西。
全草止血。

石钟花

Petrocodon dealbatus Hance

(*P. longistylus* Kranzl.)

罗城、临桂。

滇桂悬岩苣苔☆

Petrocosmea wardii W.W.Sm.

南丹。

细蒴苣苔

Raphiocarpus sinicus Chun

十万大山、龙州、大瑶山。

歪冠苣苔 一串珍珠

Rhynchoglossum obliquum Bl.

凌云。

根软坚散结；治甲状腺肿大。

阔叶线柱苣苔☆

Rhynchotechum latifolium Hk.f. et Thomas.

苍梧、大瑶山、大苗山、龙州、都安、凤山、田林。

全草清肝，解毒；又治疮疥。

短柄横蒴苣苔☆

Slackia brevipes Chun, ined.

大瑶山。

瑶山横蒴苣苔☆

S. pingkueii Chun, ined.

大瑶山。

羽裂横蒴苣苔☆

S. pinnatifida Chun, ined.

大苗山。

横蒴苣苔

S. sinensis Chun

十万大山、大瑶山、大明山、田林、凌云。

两广横蒴苣苔☆

S. tonkinensis Pellegrin

十万大山、凌云。

257 紫 葳 科 BIGNONIACEAE

*凌霄 白狗肠、红花倒水莲、紫葳、上树蜈蚣

Campsis grandiflora (Thb.) Loisel.

(*C. chinensis* (Lam.) Voss.,

Tecoma grandiflora Loisel.)

苍梧、贺县、全州、临桂、桂林、兴安、龙胜、大苗山、南丹。

花凉血，祛瘀，通经；治经闭，痛经，产后瘀阻，症瘕，崩漏。根、

叶、藤清热利湿，散瘀消肿；治肠胃炎，白带，风湿痹痛，痈疖，乳

腺炎。常栽植作庭园绿化植物，适于布置花廊、花架、攀墙。

*厚萼凌霄☆ 美国凌霄

C. radicans (L.) Leem.

桂林。

常栽植作庭园绿化植物。

灰楸

Catalpa fargesii Bureau

南丹、东兴。

果利尿。根皮治皮肤病。木材供家具、器具、乐器、琴底等用，

Catalpa-Oroxylon

亦供建筑用。嫩叶、花供蔬食。叶亦作猪饲料。梓皮、梓叶浸液作农药，可治稻螟飞虱。庭园绿化树种，道路树种。

●梓树

C. ovata G. Don

(*C. kaempferia* S. et Z.)

各城市间有少量栽培。

根皮清热解毒，和胃降逆；治胃热呕吐，小儿热疮，皮肤痒疹。

果利尿；治肾炎浮肿，肝硬化腹水。其他用途参阅灰楸。

●白花梓树

C. speciosa Ward.

桂林、临桂、南丹。

●蓝花楹

Jacaranda acutifolia Humb. et Bonpl.

各地公园有栽。

庭园绿化树种。木材供家具、用具用材。

●猫尾木

Markhamia cauda-felina (Hance) Craib

宁明、那坡、桂林。

庭园绿化树种。木材供家具、板料用。

火花树 緬木

Mayodendron igneum Kurz

隆林、田阳、龙州。

木蝴蝶 千张纸

Oroxylon indicum (L.) Vent.

合浦、邕宁、武鸣、龙州、田林、百色、隆林、凌云、宜山、桂林（栽培）。

种子润肺止咳，止痛；治支气管炎，肺结核咳嗽，咽喉肿痛，扁

桃体炎，心胃气痛，百日咳。树皮清热凉血；治肝炎，膀胱炎，痈疮，湿疹。木材供火柴杆等用。

●炮仗花

Pyrostegia ignea Presl

(*P. venusta* Baill.)

常栽植供庭园绿化用。

美叶菜豆树

Radermachera frondosa Chun et How

桂南。

叶供绿肥用。

海南菜豆树

R. hainanensis Merr.

龙州、靖西。

菜豆树

R. sinica (Hance) Hemsl.

(*Stereospermum sinicum* Hance)

阳朔、临桂、桂林、恭城、柳州、上林、宁明、龙州、大新、都安、东兰。

根、叶凉血散瘀，消肿止痛；治高热，头痛，扭挫伤，骨折，蛇伤，痈肿。果治胃痛。花可打汤，又治痢疾。木材供家具、美工用材。绿化树种。

羽叶楸 咸沙木

Stereospermum chelonoides (Oliv.) DC.

那坡。

木材为良好硬材。根、叶、花解热。

毛羽叶楸

S. chelonoides (Oliv.) DC.

var. *puberula* Dop

隆林、田林、百色、凌云。

木材为硬材。

*硬骨凌霄

Tecomaria capensis Spach

桂林。

绿化花木。

258 芝 麻 科 PEDALIACEAE

*芝麻 脂麻、胡麻

Sesamum orientale L.

(*S. indicum* DC.)

油料作物。油供食用，亦可制成人造奶油，亦可作香脂等原料。

种子供制点心、糖果。种子补肝益肾，养血润燥；治肝肾亏虚，头昏，眼花，耳鸣，肠燥便秘，病后脱发。韧皮纤维可制人造棉、绳索、麻袋。榨油后的油麸可作猪的精饲料，亦是优良肥料。

259 爵 床 科 ACANTHACEAE

老鼠簕

Acanthus ilicifolius L.

桂南海岸。

全草清热凉血，消肿止痛；治淋巴结核，肝炎，胃痛，哮喘，肝脾肿大。

●鸭嘴花 大驳骨

Adhatoda vasica Nees

桂林、临桂。

全草散瘀接骨，祛风止痛；治骨折，扭伤，风湿骨痛，肾炎，妇女血崩。作兽药治牛、猪风痰咳嗽，跌打损伤，各种血症。作绿篱植物。

偏肿鸭嘴花 大驳骨、大还魂、大骨节草、黑叶爵床

A. ventricosa (Wall.) Nees

(*Justicia ventricosa* Wall.,

Gendarussa ventricosa Nees)

桂东南、梧州、邕宁、宁明、龙州、隆林、田林、百色、东兰、巴马、大瑶山。

功同鸭嘴花。

●榄核莲 穿心莲、一见喜

Andrographis paniculata (Burm.f.) Nees

桂林、南宁、钦州、梧州、玉林等地区。

全草清热解毒，消肿止痛，抗菌消炎；治肠炎，痢疾，喉炎，肺炎，扁桃体炎，结膜炎，疮疡肿毒，蛇伤。

假牛膝☆ 小阿茜达

Asystasiella neesiana (Wall.) Lindau

(*Asystasia chinensis* S.Moore)

桂西北、大苗山、兴安、贺县。

根茎止血；治无名肿毒。

●马蓝 蓝靛、板蓝根、南板蓝根

Baphicacanthus cusia (Nees) Bremek.

(*Strobilanthes flaccidifolius* Nees,

S. cusia O.Ktze.,

Barleria-Clinacanthus

Goldfussia cusia Nees)

大瑶山、龙胜、桂林、田林、凌云、隆林。

根清热解毒，凉血消肿；治热病发斑，咽喉肿痛，肠炎，菌痢，
肝炎，丹毒，吐血，衄血。作为蓝色染料的原料。

假杜鹃

Barleria cristata L.

梧州、靖西、百色、田阳、凌云、田林、隆林、乐业、桂林、天
峨、东兰。

全草治蛇伤，关节痛。绿化花木。

***花叶假杜鹃**

B. lupulina Lindl.

南宁。

全株通经活络，解毒消肿；治毒蛇咬伤，犬咬伤，跌打，痈肿，
外伤出血，水煎服。外用鲜叶捣烂敷。

***麒麟吐珠**

Beloperone gutata Brandege

南宁、桂林等市。

绿化花木。

光广东爵床☆

Chingiacanthus glaber H.-M.

大苗山。

广东爵床☆

C. patulus H.-M.

大瑶山、蒙山、昭平、苍梧、永福、阳朔、容县、靖西。

柔刺草 青箭、小接骨、鸡骨草

Clinacanthus nutans (Burm.f.) Lindau

博白、陆川、北流、宁明、扶绥、邕宁、大苗山。

全草活血调经，散瘀消肿；治跌打骨折，贫血，黄疸，风湿。

钟刺草

Codonacanthus pauciflorus Nees

昭平、贺县、苍梧、藤县、容县、阳朔。

穗序钟刺草☆

C. spicatus H.-M.

大瑶山、大苗山。

狗肝菜

Dieliptera chinensis Nees

临桂、桂林、柳城、靖西、贵县、玉林、昭平、贺县、钟山。

全草清热利尿，凉血消肿；治感冒，肺热咳嗽，结合膜炎，黄疸

肝炎，疖肿，风湿痛。作兽药治牛、猪肝胆火旺，痲痧大热，

流感，疮疽，骨节肿痛。苗、叶可作蔬菜。

*可爱花

Eranthemum nervosum R.Br.

桂林。

绿化花木。叶治跌打。

多花可爱花☆

E. polyanthum C B. Clarke

龙州、横县。

异毛金竹草

Goldfussia dimorphotricha (Hance) Bremek.

(*Strobilanthes dimorphotrichus* Hance)

阳朔、三江。

野格拉菲

Gutzlaffia aprica Hance

武鸣。

半柱花

Hemigraphis procumbens (Lour.) Merr.

容县。

全草消肿止痛，止血生肌；治跌打，痢疾。

水蓑衣 墨菜

Hygrophila salicifolia (Vahl) Nees

桂林、兴安、贺县、苍梧、昭平、梧州、百色、陆川。

全草健胃消食，散瘀消肿；治骨折，劳伤，跌打，消化不良，乳腺炎，咽喉炎，无名肿毒，蛇伤。作兽药治牛、猪反胃吐草，乳疮，咽喉肿痛。

★岩水蓑衣☆ 南天仙子

H. saxatilis Ridl.

南宁（栽培）。

种子镇痉止痛；治癫狂，抽搐，喘咳，胃痛等。

刀枪药 红丝线

Hypoestes purpurea (L.) Soland.

柳城、柳州、凌云、乐业、阳朔。

全草散瘀止血，止咳；治肺结核咳血，支气管炎，跌打刀伤。

驳骨丹 小接骨、小驳骨、接骨草

Justicia gendarussa Burm.f.

桂林、忻城、邕宁、南宁、武鸣、上林、龙州、来宾、那坡、田东、田阳、百色、隆林、苍梧。

全草舒筋活络，消肿止痛；治骨折，扭伤，创伤，风湿痛，无名肿毒，蛇伤。

细穗爵床

J. leptostachys Hemsl.

马山、忻城。

全草散瘀止血，清热；治骨折，跌打，小儿惊风。

爵床 鼠尾红

J. procumbens L.

区内各地。

全草清热解毒，散瘀消滞；治感冒，咽喉肿痛，肝炎，小儿疳积，痈疮，疖肿，乳痈，跌打等。

鳞花草

Lepidagathis incurva Don

(*L. hyalina* Nees)

大瑶山、南宁、隆林。

红背草

Perilepta dyerianus (Mast.) Bremek.

(*Strobilanthes dyerianus* Mast.)

桂林。

红蓝

Peristrophe bivalvis (L.) Merr.

(*P. tinctoria* Nees)

岑溪、三江、兴安。

全草止血去腐；治跌打。叶和嫩茎为橙黄色、橙红色染料原料。

毛脉焰爵床☆

Phlogacanthus pubinervis T.Anders.

凌云、乐业、靖西。

蛋黄焰爵床 黄尿草

P. vitellinus (Roxb.) T.Anders.

龙州。

茎、叶治黄尿。

小驳骨 钩粉草

Pseuderanthemum palatiferum (Wall.) Radlk.

Rhinacanthus-Staurogyne

龙州。

根止血。

白鹤灵芝 癣草

Rhinacanthus nasuta (L.) Kurz

(*R. communis* Nees)

钦州、南宁、梧州等地；多为栽培。

枝、叶润肺降火；治肺结核。鲜叶涂治体癣，湿疹，响尾蛇咬伤。

喜栎小苞爵床☆ 芦莉草

Ruellia drymophila (Diels) H.-M.

隆林、大瑶山、天峨。

小苞爵床

R. repens L.

玉林地区和凤山、武鸣、邕宁、临桂等县。

叶治刀伤，牙痛，腹痛。

明萼草

Rungia chinensis Benth.

靖西。

孩儿草

R. pectinata (L.) Nees

(*R. parviflora* Nees)

百色、柳州。

全草消积导滞，清热解毒；治小儿疳积，食欲不振，肝炎，急性结合膜炎，感冒，喉痛，颈淋巴结核，痢疾，蛇伤，疖肿。

叉柱花

Staurogyne chapaensis R Ben.

平南、蒙山。

异叶紫云菜☆

Strobilanthes dalzielii (W.W.Sm.) R.Ben.

var. *inaequalis* R.Ben.

隆林、田林、那坡、大明山、贺县。

叉开紫云菜 清沙草

S. divaricatus T.Anders.

大苗山、天峨。

全草治疮疥。

汗斑草

S. maclurei Merr.

兴安、荔浦、大瑶山。

全草煎水加密陀僧和铜绿治汗斑有特效（大瑶山）。

大花老鸦嘴

Thunbergia grandiflora (Rottl. et Willd.) Roxb.

龙州、宁明、临桂、桂林、阳朔、柳州、梧州。

根破血通经，补气益血；治跌打。

261 苦 檻 蓝 科 MYOPORACEAE

苦檻蓝

Myoporum bontiodes (S. et Z.) A.Gray

钦州地区海边。

根治肺病。

263 马 鞭 草 科 VERBENACEAE

树紫珠 南洋紫珠

Callicarpa arborea Roxb.

宁明、龙州、田东、那坡、田林、凤山。

Callicarpa

叶凉血止血；治血崩，外伤，衄血等。

珍珠枫 毛老鸦糊

C. bodinieri Lévl.

平乐、永福、临桂、兴安、全州、天峨、东兰。

根、叶收敛止血，通经活血；治外伤出血，咯血，衄血，月经不调，虚劳白带，风寒头痛，产后血虚痛。根煎水洗眼治眼翳。

老鸦糊

C. bodinieri Lévl.

var. *giraldii* (Rehd.) Rehd.

桂林、南丹。

全株解毒，止血；治血崩，疮毒，鹤膝风。

华中老鸦糊☆

C. bodinieri Lévl.

var. *lyi* (Lévl.) Rehd.

龙胜、永福、桂林。

川桂老鸦糊☆

C. bodinieri Lévl.

var. *rosthornii* (Diels) Rehd.

龙州。

叶治疮疥，跌打。花可提芳香油。

短柄紫珠

C. brevipes (Benth.) Hance

梧州、容县、隆林、龙胜、大苗山。

多齿短柄紫珠

C. brevipes (Benth.) Hance

var. *dentosa* H.T.Chang

资源、全州。

华紫珠

C. cathayana H.T.Chang

梧州、龙州、凌云、乐业。

根、叶祛风利湿，散瘀止血；治外伤出血，吐血，咯血，跌打，
风湿，热病。

白棠子树 水薄荷、小泡树、小叶蜘蛛

C. dichotoma (Lour.) K.Koch

区内各地。

叶解毒，止血；治内出血，外出血，痈疽肿毒，蛇伤。作兽药治
牛、猪肝胆郁火，目赤胀痛，无名肿毒，小猪白痢。

红线紫珠

C. erythrosticta Merr. et Chun

田林、凌云、乐业、苍梧、阳朔。

全缘叶紫珠

C. integerrima Champ.

大瑶山、十万大山、苍梧。

根、叶祛风；治瘰癧。

广东紫珠

C. kwangtungensis Chun, ined.

苍梧、贺县、龙胜、资源、兴安、灌阳、阳朔、融安、大苗山、
大瑶山、上林、龙州、凌云。

尖萼紫珠

C. lobo-apiculata Metc.

区内各地。

叶治癣疥。

Callicarpa

白毛长叶紫珠

C. longifolia Lam.

var. *floccosa* J.C.Schau.

凌云、乐业、靖西、龙州、天峨、都安、阳朔、恭城。

披针叶紫珠

C. longifolia Lam.

var. *lanceolaria* C.B.Clarke

苍梧、马山、大苗山。

长柄紫珠

C. longipes Dunn

龙胜、兴安、永福、昭平、梧州、苍梧、东兰、罗城、三江、融安、百色、凌云、乐业、武鸣、贵县、容县。

尖尾枫 枫叶、粘手风

C. longissima (Hemsl.) Merr.

靖西、凌云、乐业、南宁、贺县、苍梧、平乐、桂林、三江、柳城。

全株止血镇痛，散瘀消肿，祛风湿；治外出血，内出血，产后风痛，四肢瘫痪，风湿痹痛，跌打损伤，风寒咳嗽，寒积腹痛。

秃尖尾枫

C. longissima Merr.

forma *subglabra* Pei

大瑶山、三江、苍梧、蒙山、平南、桂平、十万大山、龙州、德保、凌云、乐业。

叶治刀伤，腹胀。作兽药治牛软脚病，风湿症，缩阳症。

大叶紫珠 郎陆

C. macrophylla Vahl

区内各地。

根、叶散瘀消肿，止血；治外出血，内出血，风湿跌打，小儿脱肛。枝、叶茂盛肥厚，可作绿肥。

膜叶紫珠

C. membranacea H.T.Chang

永福、龙胜、资源、全州。

裸花紫珠

C. nudiflora Hk. et Arn.

扶绥、邕宁、南宁、宁明、陆川。

功近大叶紫珠。作兽药治牛风湿脚软，跌打损伤，筋络疼痛，风寒咳嗽。

杜虹花

C. pedunculata R.Br.

上思、博白、容县、贺县。

叶止血镇痛，散瘀消肿；治咳血，吐血、鼻出血。创伤出血，跌打损伤。

粤赣紫珠☆

C. peii H.T.Chang

全州、临桂、永福、阳朔、恭城、蒙山、贺县、平南、大瑶山、凌云、乐业。

红紫珠

C. rubella Lindl.

区内各地。

全草驱蛔虫，治疗疮。叶接骨；治骨折，跌打。作兽药治牛跌伤。

狭叶红紫珠

C. rubella Lindl.

forma angustata Pei

隆林、德保、那坡、靖西、龙州、南宁、上林、十万大山、藤县、南丹、桂林。

叶止痒，消瘀，去腐生肌。根治肺癆，风湿，五淋白浊，小儿惊风。

钝齿红紫珠 沙药草

C. rubella Lindl.

forma crenata Pei

贺县、梧州、大苗山、大瑶山、十万大山、龙州、凌云、乐业、都安、兴安。

根或全株清热止血，消肿止痛；治月经不调，痔疮出血，咳血，红白痢，肝炎，跌打。

秃红紫珠

C. rubella Lindl.

var. subglabra (Pei) H.T.Chang

大瑶山、昭平、容县、平南。

兰香草 走马天风、宝塔草、莼

Caryopteris incana (Thb.) Miq.

(*C. mastacanthus* Schau.)

大新、龙州、南宁、邕宁、武鸣、上林、贵县、上思、柳州、桂林、钟山、贺县。

全草祛风利湿，化气行滞；治风湿瘫痪，产后腹痛，月经不调，跌打，蛇伤，气滞胃痛。

圆锥花荵☆

C. paniculata C.B.Clarke.

靖西、那坡。

臭牡丹

Clerodendron bungei Steud.

(*C. foetidum* Bunge,

Caryopteris grata (Wall.) Benth.)

龙胜、大瑶山、隆林。

全草健脾燥湿，理气消积；治虚弱，疝气，头痛，头晕，阳萎，白带，风湿，吐血，疔疮。

大青 路边青、猪屎青、鸭公青

C. cyrtophyllum Turcz.

区内各地。

根、叶清热解毒，凉血利尿；治腮腺炎，喉炎，扁桃体炎，牙周炎，菌痢，丹毒，蛇伤。作绿肥，肥效颇高。

齿叶赧桐

C. divaricatum Jack

(*C. serratum* (L.) Spreng.)

天峨、河池、东兰、都安、靖西、那坡、隆林、西林、凌云、百色、田林、平果、龙州、上林。

全株驳骨，杀虫，健胃，清心火；治疟疾，痢疾，头痛，眼炎，跌打。

两广赧桐

C. elachistanthum Merr. ex H.L Li

十万大山。

红灯笼 苦灯笼、灯笼草

C. fortunatum Lindl.

区内各地，南部较多。

根清热解毒，止咳，祛风；治感冒，咽痛，咳嗽，肺病，胃痛，腹痛，疖肿，跌打，风湿。作兽药治牛瘟，猪瘟，流感，热咳，跌打等。

臭茉莉 臭矢茉莉、老虎草、小将军、蜻蜓叶

C. fragrans Vent.

柳州、大瑶山、大苗山、融安、恭城、临桂、桂林、兴安、龙州、宁明、靖西、隆林。

根、叶祛风活血，强筋壮骨；治风湿痹痛，高血压，水肿，白带，湿疹。花蒸鸡蛋吃，治头昏。

海南臭茉莉

C. hainanensis H.-M.

Clerodendron

龙州、上思。

滇桂臭茉莉☆

C. henryi Pei

百色、乐业。

假茉莉 许树

C. inerme (L.) Gaertn.

苍梧、北流、容县、平南、贵县、靖西。

根清热解毒，散瘀除湿，舒筋活络；治风湿骨痛，胃痛，疟疾，
肝炎，跌打扭伤，癰疮等。木材可作火柴杆用材。

赧桐 贞桐花、状元红

C. kaempferi (Jacq.) Sieb.

(*C. squammatum* Vahl)

区内各地。

全草祛风利湿，消肿散瘀；治风湿骨痛，跌打肿痛，咳血，疖肿。

广东臭牡丹

C. kwangtungense H.-M.

大瑶山、象州。

根治脚软，风湿。

白灯笼☆ 木常山

C. mandarinorum Diels

龙州、隆林、凌云、乐业、百色、那坡、天峨、南丹、大苗山、
大瑶山、临桂、龙胜。

枝、叶治半边风。

大叶白灯笼☆

C. mandarinorum Diels

var. *macrophyllum* Chun

龙州、田林、隆林、龙胜、大苗山。

长花龙吐珠 垂茉莉、黑叶龙吐珠

C. nutans Wall.

桂林、龙州、靖西。

●龙吐珠

C. thomsonae Balf.

桂林、南宁等市。苍梧、贵县、靖西。

绿化花木。

海州常山

C. trichotomum Turcz.

大瑶山、隆林。

根、叶舒筋活血，祛风止痛；治风湿痛，高血压，皮炎，腹泻。

枝叶作农药能杀红蜘蛛、棉蚜虫和地下害虫。

狮子球 人瘦木

C. viscosum Vent.

区内各地。

全草退热止痛，治毒疮，风湿。

●假连翘

Duranta repens L.

桂林、临桂。

绿化花木。根、叶止痛，止渴。

亚洲石梓☆

Gmelina asiatica L.

龙州。

根止痛，止渴。

石梓 铁商木、蛇头花

G. chinensis Benth.

南宁、田阳、凌云、乐业、大苗山。

毛石梓☆

G. villosa Roxb.

南宁、宁明、田阳、大苗山。

★冬红花

Holmskioldia sanguinea Retz.

桂林。

绿化花木。

马缨丹 五色梅、臭草、如意草

Lantana camara L.

区内各地。

根、叶、花清热解毒，祛风止痒；治感冒，腮腺炎，肺结核咳血，

湿疹，风湿，跌打，淋巴结核。根、花作兽药治牛、猪肺结核，

湿热肿胀，皮炎，疮疥等。

过江藤 苦舌草

Lippia nodiflora (L.) Michx.

平果、隆林、西林、天峨、上林、邕宁、贵县。

全草清热解毒；治痢疾，牙疳，喉炎，疔毒，痈疽，跌打刀伤，

心气痛。

大叶豆腐木

Premna cavaleriei Lévl.

南丹、东兰、凌云、乐业、隆林、田林、龙州、容县、临桂。

近邻豆腐木☆

P. confinis Pei et S.L.Chen

龙州、大新、那坡、隆林、凤山。

叶外用治关节肿。

细柄豆腐木☆

P. filipes Chun, ined.

全州。

黄毛豆腐木☆

P. fulva Craib

(*P. crassa* H. -M.)

龙州、天峨。

小豆腐木☆

P. herbacea Roxb.

宁明。

根治泄泻。

臭豆腐木☆

P. integrifolia L.

河池。

全株治风湿。

女贞豆腐木☆

P. ligustroides Hemsl.

罗城。

全株清热祛风，除湿；外用解毒。

长毛豆腐木☆

P. longipila Pei

隆林。

叶接筋。

豆腐木 臭辣树、鸡屎泡、雀儿子树

P. microphylla Turcz.

龙州、隆林、河池、大苗山、融安、龙胜、兴安、全州、临桂、
桂林、永福、贺县、苍梧。

根、叶清热解毒，收敛止血；治痢疾，头痛，无名肿毒，外出血，
疟疾，跌打，蛇伤。作兽药治牛胀胆。

中南豆腐木☆

P. peii Chun ex H T. Chang

Premna-Tsoongia

上思、大瑶山、苍梧。

微毛豆腐木☆

***P. puberula* Pamp.**

那坡、凌云、乐业、隆林。

茎、叶治眼膜，疮疥。

信宜豆腐木☆

***P. sunyiensis* Pei**

宁明、上林、大明山。

全株治热症。作兽药治牛关节肿大疼痛，虫积消瘦，痰涎壅盛，寒湿泄泻。

四棱草

***Schnabelia oligophylla* H.-M.**

贵县、贺县、柳城。

全株活血通经；治闭经。

假败酱 玉龙鞭

***Stachytarpheta jamaicensis* (L.) Vahl**

扶绥、柳州。

全草清热解毒，消肿止痛；治跌打肿痛，疮疡疖肿，结膜炎，疟疾，蛇伤。作兽药治牛、猪痈疡肿毒，痰多喘咳，湿热下痢。

柚木

***Tectona grandis* L.f.**

北流、南宁、凭祥等地有引种。

为世界著名材用树种之一。木材耐久不腐，坚硬，但又易于加工；

作栋梁、桥梁、船只、房屋、家具、枕木、楼板等用材。花和种子利尿。

假紫珠☆

***Tsoongia axillariflora* Merr.**

大瑶山。

马鞭草

Verbena officinalis L.

区内各地。

全草凉血散瘀，清热解毒，利尿消肿；治高热，经闭，产后瘀阻，痢疾，水肿，痈疖，疥癣，湿疹，肝炎，疝气，血淋。作兽药治牛、猪产后瘀血不行，胎衣不下，血痢，跌打肿痛，痈疮疗毒，皮肤疥癣，腹水及全身水肿。

●彩花马鞭草

V. phlogiflora Champ.

桂林。

绿化花卉。

灰布荆

Vitex canescens Kurz

桂西南。

光叶灰布荆

V. canescens Kurz

forma subglabra Pei

靖西、南丹。

广西布荆☆

V. kwangsiensis Pei

龙州。

贵州布荆

V. kweichowensis Pei

宁明、龙州、靖西、凌云、乐业、巴马、龙胜。

黄荆

V. negundo L.

区内各地。

叶解表发汗，化湿浊；根祛风除湿，利关节；种子行气止咳；治感冒，痢疾，疳积，胃肠炎，哮喘，胃痛，便秘，淋病，风湿脚气等。作兽药治牛臃胀，水泻，软脚，喉风，泻血，难产，霍乱，伤寒，慢性炭疽，猪丹毒。茎皮纤维造纸和制人造棉。枝条编制篮子、箩筐、蓆箕等用具。种子油可制肥皂。花和叶可提芳香油。果实可代茶叶用。是良好的绿肥。蜜源植物。木材耐久，不受白蚁之害，可作家具、细工用材。夏天可用枝叶薰蚊。

山牡荆

V. quinata (Lour.) F.N.Will.

(V. heterophylla Roxb)

龙州、藤县、平南、凌云、乐业、河池、罗城、大瑶山、永福、临桂。

根治咳定喘，镇静退热；治气管炎，哮喘，气促，疳积，风湿，跌打。木材为建筑桥梁适宜用材，干燥时不反翘，白蚁侵害少。

单叶蔓荆 白布荆

V. rotundifolia L.

(V. trifolia L. var. ovata Makino,

V. trifolia L. var. unifoliolata Schau)

临桂、宁明、灵山。

功用同蔓荆。

小叶布荆

V. sampsoni Hance

梧州、贵县。

蔓荆

V. trifolia L.

容县、龙州、龙胜。

果实疏散风热。叶消肿止痛；治刀伤。作兽药，治牛、猪风热感冒，鼻流清涕，目昏赤肿，破伤风及拘挛痹痛等症。

大叶布荆

V. vestita Wall.

凌云、乐业、百色。

263A 透骨草科 PHRYMACEAE

透骨草

Phryma leptostachya L.

桂西北。

全草清热解毒，祛风活血；治风湿痹痛，筋骨拘挛，疥疮，难产。

264 唇形科 LABIATAE

尖头花

Acrocephalus indicus (Burm f.) O Ktze.

(*A. capitatus* Benth.)

西林、梧州。

* 藿香

Agastache rugosa (Fisch. et Mey.) O.Ktze.

灵川。

全草清暑化湿，和胃止呕；治暑湿发热，头痛呕恶，胸闷腹泻，妊娠呕吐，风湿骨痛，皮肤湿疹。茎、叶可提取芳香油，是调配香精的原料，也是名贵香料之一。种子油可制肥皂和油漆等。叶可代茶用。

筋骨草 青鱼胆

Ajuga decumbens Thb.

隆林、柳州、桂林等地。

全草清热解毒，凉血降压；治发热，高血压，目赤肿痛，痈疮

Ajuga-Brunella

毒，支气管炎，肺炎，扁扁桃体炎，跌打肿痛，骨折，烫火伤。
欧筋骨草

A. genevensis L.

功用近筋骨草。

大筋骨草

A. pallescens (Maxim.) Price et Metc.

(*A. decumbens* Thb.

var. *pallescens* (Maxim.) H.-M.)

百色。

*肉质异唇花

Anisochilus carnosus (L.) Wall.

南宁。原产印度。

根茎治水肿。

防风草 移草

Anisomeles indica O.Ktze.

(*A. ovata* R.Br.)

区内各地。

全草祛风发表，行气消滞；治风湿骨痛、风寒感冒，呕吐腹泻，
皮肤湿疹，虫蛇咬伤。作兽药，治小猪白痢，猪感冒发热，痰
喘咳嗽，腹泻，牛腹胀症。嫩茎、叶可作绿肥。

夏枯草

Brunella vulgaris L.

区内各地。

花序清肝明目，散结解毒，降血压；治肝火上升，高血压，头
痛，目赤，眼花，耳鸣，瘰癧，痈疮肿毒。作兽药，治猪瘟，
猪丹毒，牛痢疾。全草代茶，有清凉利尿作用。干花炒过代
茶，可治咳嗽。本属亦名 *Prunella*。

风轮菜 夜偏头草、野鱼腥草

Calamintha chinensis Benth.

全州、兴安、灌阳、临桂、桂林、龙胜、大苗山、凤山、德保、
那坡、隆林、扶绥、横县、贵县等地。

全草清热解毒，活血消肿；治肝炎，胆囊炎，痢疾，腮腺炎，肠炎，血尿，结膜炎，乳腺炎，刀伤，蛇伤，犬咬伤，痔疮，小儿疳积。

瘦风轮菜 塔花、宝塔菜

C. gracilis Benth.

(**C. confinis Hance,**

Satureia gracilis (Benth.) Nakai)

全州、临桂、大苗山、贺县、梧州、武鸣、凌云、隆林等地。

全草治痢疾，乳痈，血崩。猪饲料。

多头花塔草

C. polycephala Van.

兴安。

●肾茶

Clerodendanthus spiralis (Lour.) C.Y.Wu

(**Orthosiphon spirale (Lour.) Merr.**)

南宁。

全草清热利湿，排石；治肾炎，膀胱炎，尿路结石，风湿关节炎。

●彩叶紫苏

Coleus blumei Benth.

常栽作庭园绿化植物。

叶治蛇伤。

肉叶鞘蕊花

C. carnosifolius (Hemsl.) Dunn

(**Plectranthus carnosifolius Hemsl.**)

Coleus-Dysophylla

平南、贵县。

全草治疮疥。

南鞘蕊花

C. esquirolii Dunn

(*Calamintha esquirolii* Lévl)

靖西。

小彩叶紫苏 小洋紫苏

C. pumilus Blanco

桂南。

常栽植作庭园绿化植物。

毛水珍珠菜

Dysophylla auricularia (L) Bl.

(*Mentha auricularia* L)

陆川、藤县、贺县、南宁、武鸣、大明山、那坡、凌云、宜山等地。

全株祛风热；治老人小孩盗汗，烂皮疮，沙虫。

水箭草

D. benthamiana Hance

(*D. verticillata* (Roxb.) Benth)

临桂、柳州、宜山、上思。

全株散血毒；治皮肤红肿。

中间水箭草

D. benthamiana Hance

var. *intermedia* C Y. Wu et Hsuan

十万大山。

斑叶水珍珠菜

D. sampsonii Hance

桂林、阳朔、富川。

红荆芥

Elsholtzia argyi Lévl.

(*E. cristata* Willd.)

陆川、容县、兴安、恭城、大瑶山、那坡。

白香薷 滇香薷

E. blanda Benth.

靖西、那坡、百色、东兰。

叶、花清热，解毒，消炎，利尿；治急慢性肾盂肾炎，肾炎，感冒，小儿疳积，腋臭。茎叶含芳香油。

吉龙草

E. communis (Coll. et Hemsl.) Diels

(*Dysophylla communis* Coll. et Hemsl.)

宜山、靖西、那坡。

全草发汗解表，清热解毒；治感冒，疔疮，鼻渊。

鸡骨柴

E. fruticosa (D. Don) Rehd.

(*E. polystachya* Benth.)

桂西。

茎、叶含芳香油。

香薷(注)

E. patrini (Lep.) Garcke

(*Mentha patrini* Lep.)

昭平。

注：据《中药志》第三卷153页(1960年版)记载，市场上以海州香薷
E. haichowensis Sun作为香薷正品。

Elsholtzia-Galeobdolon

全草发汗解暑，利湿行水；治伤暑头痛，发热恶寒，全身水肿。

茎、叶含芳香油。种子炒熟后，可掺和玉米粉食用；又可榨油供食用，或供照明、制皂等用。油饼为良好饲料。

细皱香薷

E. rugulosa Hemsl.

龙州。

叶含芳香油。全草治烂疮。蜜源植物。

假水苏☆

E. stachyodes (Link.) C.Y.Wu

(*E. incisa* Benth.)

临桂、灵川。

茎、叶含芳香油。

扫把菜

E. yunnanensis C.Y.Wu

凌云。

茎、叶含芳香油。

假野芝麻

Galeobdolon chinense (Benth.) C.Y.Wu

(*Lamium chinense* Benth.)

柳州、临桂、桂林。

块根假野芝麻

G. tuberiferum (Mak.) C.Y.Wu

桂林。

阳朔假野芝麻

G. yangsoense Sun

阳朔。

活血丹(注) 连钱草、透骨消

Glechoma longituba (Nakai) Kupr.

(*G. hederacea* auct., non L.,

G. hederacea L. var. *longituba* Nakai)

区内各地。

全草活血通经，祛风去湿；治跌打，骨折，尿路结石，风湿，疳积，黄疸，小儿惊风，痛经、吐血。

中华锥花 棒红花

Gomphostemma chinensis Oliv.

苍梧、藤县、昭平、大瑶山、南丹、田林、凌云、恭城。

全株补气血；治气血衰弱。

长毛锥花 大棒红花

G. crinitum Wall.

百色。

宽叶锥花

G. latifolium C.Y.Wu

东兴、十万大山。

细齿锥花

G. leptodon Dunn

龙州。

全株治烫火伤。

注：苏联 Kuprianova 建立 *Glechoma brevituba* Kupr. 与 *Glechoma longituba* (Nakai) Kupr. 二个种，其主要区别是前者花冠长约1.3—1.5厘米；后者花冠长1.8—2.5厘米，花冠管狭长，伸出萼管以外。但我们实际观察后，发现同一活血丹新鲜植株上二种情况同时并存，甚至在同一节间腋生的花中，一朵花冠长，另一朵花冠短，所以，我们认为Kupr. 建立的这二个种极可能是同一种植物。

光泽锥花 瓜子菜

G. lucidum Wall.

容县、苍梧、大苗山、隆林。

假长毛锥花

G. pseudo-crinitum C.Y.Wu

凌云。

曲折罗香草

Hanceola flexuosa C.Y.Wu et H.W.Li

兴安、大瑶山。

假走马风

Hyptis decurrens (Blanco) Epling

南宁(栽培)。

山香 毛老虎

H. suaveolens (L.) Poir.

陆川、玉林、北流、贵县、桂平、平南、桂林、百色。

全草祛风解表，散瘀止痛；治跌打，刀伤，感冒，头痛，胃肠胀气，皮肤湿疹。

动蕊花

Kinostemon ornatum (Hemsl.) Kudo

(*Teucrium ornatum* Hemsl.,

Orthosiphon delavayi Lévl.)

罗城。

益母草

Leonurus heterophyllus Sweet

(*L. sibiricus* auct., non L.)

区内各地。

全草祛瘀生新，活血调经；治月经不调，产后瘀阻，头晕腹痛。

种子(中药茺蔚)活血调经，凉肝明目；治目赤肿痛，高血压。

全株作兽药，治牛、猪产后瘀积，胎衣不下，恶露不清，崩漏不止，是产科要药，又治跌打积瘀；茺蔚子治肝热目痛和水肿。种子油可作润滑油等用。茎、叶可作农药。

白花益母草

L. heterophyllus Sweet

forma leucanthus C.Y.Wu et H.W.Li

(L. sibiricus L.

var. albiflorus Migo)

兴安、阳朔、陆川。

毛绣球防风

Leucas mollissima Wall.

梧州、藤县、龙州、东兰。

全株治疗疮。

顶序绣球防风☆

L. zeylanica (L.) R.Br.

(Phlomis zeylanica L.)

大瑶山、龙州。

全草祛风解表，化痰止咳；治感冒，咳嗽，风火牙痛，肠胃不适，百日咳。

银条菜 欧地瓜儿苗

Lycopus europaeus L.

全州。

全草接骨，调经。

地笋 泽兰、地瓜儿苗

L. lucidus Turcz.

var. hirtus Regel

兴安、龙胜、临桂。

全草行血，利尿，疏肝解郁；治月经不调，瘀血腹痛，身面浮肿。

Meehania-Microtoena

跌打，肾炎水肿，产后小便淋沥。根可食，亦可提取淀粉。

茎、叶可作猪饲料。

疏麻菜

Meehania fargesii (Lévl.) C.Y.Wu

var. *pedunculata* (Hemsl.) C.Y.Wu

资源、大苗山、罗城。

薄荷

Mentha arvensis L.

栽培或野生，见于临桂、桂林、柳州、龙州、靖西等地。

全草疏解风热，清利头目；治风热感冒，咽喉肿痛，麻疹初起，

眼红肿痛，口疮，牙痛，皮肤湿疹。作兽药，治家畜风热流感，咽喉肿痛，斑痧热症，牛脑胀症。茎、叶含薄荷油，用于提取薄荷脑，以及供糖果、饮料、牙膏、香精、清凉油等用。

干茎、叶亦常供清凉食品、饮料等用。

野薄荷

Mentha haplocalyx Briq.

兴安、桂林、钟山、大瑶山、贵县、北流、陆川、南宁。

功用同薄荷，但质量较次。

凉粉草

Mesona chinensis Benth.

贺县、苍梧、岑溪、容县、博白、陆川等地。

全草清热解暑，凉血利尿；治感冒，关节炎，高血压，肾炎，跌打。茎、叶可制凉粉，即枝、叶的水煮液和米浆煮熟，冷却后即成，是华南夏季的一种清凉食品。

毛冠唇花

Microtoena mollis Lévl.

(*M. insuavis* Prain ex Dunn)

隆林。

近穗状冠唇花

M. subspicata C.Y.Wu

隆林。

全缘萼

Nosema cochinchinensis (Lour.) Merr.

(*Goniosporum holocheilum* Hance,

Mesona prunelloides Hemsl.,

Nosema prunelloides (Hemsl.) C.B. Clarke,

N. holocheilum (Hance) Kudo)

北海、合浦、博白。

花清肝火，散郁结；治痈肿疮毒，目赤肿痛，瘰癧。

鸭香草 罗勒、五香草

Ocimum basilicum L.

平乐、临桂、大瑶山、桂平、武鸣等地。

全草、种子祛风消肿，散瘀止痛，疏风解表；治胃肠胀气，头痛，

胸痛，肠炎腹泻，风湿，跌打，皮炎。种子治眼疾。茎、叶、

花穗可提取芳香油，是调香原料，用于皂用、牙膏、食用等香精。苗、叶亦作烹饪调味香料。

●丁香罗勒

O. gratissimum L.

功用近罗勒。茎、叶、花穗含芳香油，可提取丁香酚，用于食用，皂用、牙膏等香精。

回香草

O. sanctum L.

贺县、大瑶山。

功用近罗勒。茎、叶作食用香料。

牛至 土茵陈

Origanum vulgare L.

Orthodon

临桂、柳州、贵县、博白等地。

全草清热利湿，理气和胃；治湿热黄疸，水肿，热泻，痞积，呕吐。全株可提芳香油，供调配香精和酒曲配料。嫩芽、叶供烹调香料用。

小叶芥苧

Orthodon cavaleriei (Lévl.) Kudo

(*Mosla cavaleriei* Lévl.)

平南。

全株散寒发表，止血；治感冒，刀伤出血。

细叶芥苧 土香薷、华荆芥、痧药儿、蚊子草

O. chinensis (Maxim.) Kudo

(*Mosla chinensis* Maxim.)

区内各地。

全草祛风发表，清暑利湿，行气消肿；治感冒头昏，黄疸，小儿惊风。茎、叶含芳香油，又可熏蚊。

芥苧 热痒草

O. diantherus (Buch.-Ham.) H.-M.

(*Mosla dianthera* (Buch.-Ham.) Maxim.)

临桂、昭平、岑溪、桂平等地。

全草散寒发表，祛风止痒；治感冒发热，皮肤湿疹，搔痒，热痒。

作兽药，治牛、猪感冒发热，外洗湿疹、搔痒。

长苞芥苧 土荆芥

O. longibracteatus C.Y.Wu et Hsuan

兴安。

粗糙芥苧 石芥苧、沙虫药

O. scaber (Thb.) H.-M.

(*Ocimum scabrum* Thb., non L.f.)

Orthodon punctatum (Thb.) Kudo,

O. punctulatus Ohwi,

O. lanceolatus (Benth.) Kudo,

Mosla lanceolata Maxim.)

全州、临桂、梧州、南宁、龙州、德保、那坡。

全草祛风，退热，下气。又含芳香油，可供调制香精用。

两广直管花 当芽

Orthosiphon marmoritis (Hance) Dunn

(*Plectranthus marmoritis* Hance)

全州。

全草治蛇伤。

海南深红直管花

O. rubicundus Benth.

var. *hainanensis* C.Y.Wu et Hsuan

宁明。

短齿白毛假糙苏

Paraphlomis albida H.-M.

var. *brevidens* H.-M.

(*P. albiflora* auct., non (Hemsl.) H.-M.,

P. albida auct., non H.-M.)

容县。

短叶假糙苏

P. brevifolia C.Y.Wu

罗城。

罗甸纤细假糙苏

P. gracilis Kudo

var. *lutienensis* (Sun) C.Y.Wu

Paraphlomis

(*P. lутienensis* Sun,

P. albiflora auct., non (Hemsl.) H.-M.

凌云。

长叶假糙苏 罗城假糙苏

P. lanceolata H.-M.

罗城。

无柄长叶假糙苏

P. lanceolata H.-M.

var. *sessilifolia* H.-M.

龙胜、大苗山、大瑶山、罗城。

少刺毛假糙苏

P. paucisetosa C.Y.Wu

凌云。

假糙苏

P. rugosa (Benth.) Prain

(*Phlomis rugosa* Benth.,

Lamium longipetiolata Hay.)

百色、都安、南丹、贺县、容县。

狭叶假糙苏

P. rugosa (Benth.) Prain

var. *angustifolia* C.Y.Wu

苍梧、藤县、大瑶山、凌云。

小叶假糙苏

P. rugosa (Benth.) Prain

var. *coronata* (Van.) C.Y.Wu

(*Lamium* ? *coronatum* Van.,

Phlomis rugosa auct., non Benth.,

Lamium gesneroides Hay.,

Paraphlomis albiflora auct., non Hemsl.,

P. rugosa auct. plurium, quoad specim. subtrop.,
non (Benth.) Prain)

全州、兴安、恭城、临桂、昭平、容县、大瑶山、融安、大苗山、
那坡、田林、凌云、隆林、凤山、宁明。

全草润肺止咳，补血调经；治癆咳，月经不调。

刺萼假糙苏

P. seticalyx C.Y.Wu

兴安、龙胜、大苗山、大瑶山、十万大山。

梗、叶、种子理气，宽胸，解郁，安胎。

白苏

Perilla frutescens (L.) Britt.

(*Ocimum frutescens* L.,

Perilla ocymoides L.)

区内各地。

功用近紫苏，可代用，参阅紫苏。

●紫苏

P. frutescens (L.) Britt.

var. *crispa* (Thb.) Decne.

(*P. nankinensis* (Lour.) Decne.)

区内各地。

叶发汗散寒，行气解毒；治风寒感冒，鱼蟹中毒吐泻。枝(苏梗)
顺气安胎；治胎动不安。种子(苏子)降气平喘，消痰止咳；
治咳喘痰多。种子油为干性油，可涂金属、木材、雨伞、油纸、
器皿等，又有防腐作用，可作酱油等的防腐剂。又可食用，亦

可供制肥皂、油墨等。油饼为良好的牲畜饲料。茎、叶可提芳香油，用于调合香精和作糖果食品香料。所含紫苏醛可制成紫苏糖，有甜味，甜度大于砂糖。叶可食用，和肉共煮，可增加香味。茎、叶、果作兽药，治牛咳嗽，水泻，斑麻症，风寒食积，猪丹毒，肚痛等症。

皱薄荷 南薄荷、腺花香茶菜

Plectranthus adenanthus Diels

桂林、苍梧、玉林、容县。

根健脾利湿，理气和胃；治吐泻，食积饱胀，痢疾。

香茶菜 蛇总管

P. amethystoides Benth.

(*P. sinensis* Miq.)

兴安、龙胜、平乐、蒙山、昭平、容县、北流、柳州、大苗山、隆林、德保。

茎、叶散瘀消肿，清热解毒；治跌打肿痛，毒蛇咬伤。

脉叶香茶菜 蓝花柴胡、大叶蛇总管

P. nervosus Hemsl.

(*P. moslifolius* Lévl.)

全州、岑溪。

茎、叶清热解毒，防湿消肿；治肝炎，蛇伤，脓疮，湿疹。

四方草

P. stracheyi Benth.

(*P. veronicifolius* Hance)

龙胜、十万大山。

线纹香茶菜 溪黄草

P. striatus Benth.

龙胜、临桂、罗城、柳州、苍梧、贺县。

全草清热利湿，凉血散瘀；治肝炎，胆囊炎，跌打瘀肿。

细叶香茶菜 伤寒头、三姐妹

P. ternifolius D. Don

(*Elsholtzia lychnitis* Lévl.)

区内各地。

全草发散风寒，消肿止痛；治流感，蛇伤，刀伤，牙痛。

• 广藿香

Pogostemon cablin (Blanco) Benth.

栽培作香料和药物。

全草发表，和中，行气，化湿，解暑；治伤寒头痛，胸腹满闷，
呕吐泄泻。茎、叶可提取广藿香油，是优良的定香剂，又可调
合香精。

光刺蕊草

P. glaber Benth.

东兴、容县、苍梧、阳朔、大瑶山、融安、河池。

长叶钩子

Rostrinucula sinensis (Hemsl.) C. Y. Wu

(*Leucosceptrum sinensis* Hemsl.,

L. bodinieri Lévl.,

Elsholtzia cavaleriei Lévl. et Vent.)

兴安。

鼠尾草

Salvia japonica Thb.

(*S. fortunei* Benth.,

S. chinensis Benth.)

龙胜、融安、柳州、凌云、隆林、苍梧、武鸣、十万大山。

根治风湿、神经痛，产后流血过多。

丹参

S. miltiorrhiza Bunge

桂林。

根活血祛瘀，调经止痛；治月经不调，行经腹痛，痈肿疮毒，心跳不眠，症瘕，风湿痹痛。

雪见草 麻婆菜

S. plebeia R.Br.

临桂、桂林、柳州、南宁、那坡、平果、隆林。

全草祛瘀消肿，凉血解毒；治咽喉肿痛，无名肿毒，肾炎水肿，膀胱结石，血崩，下肢溃疡，蛇伤。种子油可制肥皂、油漆。全草作农药，可防治棉蚜、螟虫、守瓜、菜青虫等。

假鼠尾草

S. prionitis Hance

龙胜、兴安、大苗山、乐业、隆林、武鸣。

●一串红 象牙红、西洋红

S. splendens Sello

常栽培供庭园绿化用。

荆芥

Schizonepeta tenuifolia Briq.

全州、兴安、龙胜。

全草解表，祛风，理血，炒黑止血；治风寒感冒，麻疹初起，扁桃体炎，鼻血，产后血晕，便血。

半枝莲 狭叶韩信草

Scutellaria barbata D.Don

(*S. rivularis* Wall.)

全州、龙胜、临桂、桂林、灵川、大瑶山、藤县、南宁等地。

全草清热解毒，凉血消肿；治癌症，肝炎，蛇伤，无名肿毒，经

闭，阑尾炎。

退色黄芩

S. discolor Colebr.

隆林。

全草治疮疥。

两广耳挖草

S. grossecrenata Merr. et Chun

龙胜。

耳挖草 韩信草、大力草

S. indica L.

临桂、桂林、龙胜、大苗山、柳州、东兰、凌云、南宁、武鸣、
贵县、桂平、梧州等地。

全草舒筋活络，散瘀止痛，利湿；治跌打，四肢麻木，饱胀，黄疸，
头晕，咳嗽。根或全草作兽药；治牛、猪风湿，跌打，劳伤干
咳，蛇伤，喉部化脓等症。

海南耳挖草

S. javanica Jungh

苍梧。

光柄筒冠花

Siphocranion nudipes (Hemsl.) Kudo

(*Plectranthus nudipes* Hemsl.,

Hancea nudipes (Hemsl.) Dunn)

龙胜。

地蚕 白冬虫草、土冬虫草

Stachys geobombycis C.Y.Wu

(*S. aspera* auct., non Michx.,

Stachys-Teucrium

S. kouyanensis auct., non (Van) Dunn,

S. arrecta auct., non Bailey)

临桂、柳州、桂平、苍梧、玉林、宁明。

白花地蚕

S. geobombycis C.Y.Wu

var. *alba* C.Y.Wu et H.W.Li

全州。

根清热补虚；治肺病久咳。

细柄水苏☆ 香草

S. oblongifolia Benth.

var. *leptopoda* (Hay) C.Y.Wu

(*S. leptopoda* Hay.,

S. oblongifolia Benth.

forma *leptopoda* (Hay) Kudo)

阳朔、柳州、扶绥、宁明。

二齿香科

Teucrium bidentatum Hemsl.

(*T. bidentatum* Hemsl.

var. *purpureum* Diels,

Kinostemon bidentatum (Hemsl.) Kudo,

Plectranthus hanceiformis Lévl.)

南丹。

锦毛穗花香科☆

T. japonicum Willd.

forma *lanatum* Sun

兴安。

庐山香科

T. pernyi Fr.

(*T. ningpoense* Hemsl.,

Kinostemon ningpoense (Hemsl.) Kudo,

K. pernyi (Fr.) Kudo

var. *ningpoense* (Hemsl.) kudo)

临桂、桂林。

长毛香科

T. pilosum (Pamp.) C.Y.Wu et Chow

(*T. japonicum* Willd.

var. *pilosum* Pamp.)

南丹。

铁轴草 山薄荷、四列石蚕

T. quadrifarium Buch.-Ham.

(*T. fulvo-aureum* Lévl.,

T. kouytchouense Lévl.)

资源、龙胜、灵川、临桂、昭平、贺县、大苗山、大瑶山、南丹、

东兰、邕宁。

全草清热解毒，止痛；治感冒头痛，跌打。

血见愁 山藿香

T. viscidum Bl.

(*T. stoloniferum* Roxb.,

T. philippinensis Merr.)

龙胜、临桂、桂林、大瑶山、罗城、凌云、田林、大明山、龙州、

十万大山。

全草散瘀消肿，止血止痛；治跌打，吐血，鼻血，蛇伤，疮肿。

Teucrium

根作兽药；治牛、猪跌打，外伤出血，衄血，尿血，便血，可
内服外敷；外敷治蛇伤，疮痈恶毒。


大唇血见愁

T. viscidum Bl.

var. macrostephanum C.Y.Wu et Chow

田林。





中 名 索 引

黑体字是正名，宋体字是列名。

一 笔

一匹绸 670
一见喜 699
一片红 222
一朵云 ... 121, 642
一块瓦 58
一串红 736
一串珍珠 694
一刺两口 467
一枚黄花 642
一柱香 631
一点红 628
一品红 222
一粒金丹 82
一碗泡 78
一摸消 587

二 笔

〔一〕

二列叶铃 148
二色菠萝蜜 ... 369
二色琼楠 16
二花耳草 587
二齿香科 738
二歧蓼 90
二籽扁蒴藤 ... 411

二裂狸藻 687
二裂解宝叶 ... 187
丁香罗勒 729
丁香蓼 113
丁葵草 334
十大功劳 47
十万大山润楠 31
十万锦香草 ... 178
十字花科 68
十萼花 405
十萼茄 664
七十二枝花 ... 627
七爪龙 673
七叶树科 457
七叶莲 489
七加皮 489
七里明 621
七姐妹 261
七姐妹 201
七姐妹藤 49
七指莲 139
七娘藤 563
七裂悬钩子 ... 269

〔二〕
八月瓜 49
八叶牛皮消 ... 565
八百力 219
八角 8
八角枫 479
八角枫科 479
八角科 6
八角莲 46
八角莲 46, 47
八角樟 19
八角鞘花寄生 414
八宝树 110
八脉粗叶木 ... 582
人心果 513
人心药 241
人苋 212
人参归 492
人面子 470
人哥(壮音) ... 182
人瘦木 713
入地金牛 446
入地蛇 497
入地麝香 8
九丁树 376
九牛力 428
九节 593
九节风 63
九节茶 63
九龙胆 56
九龙盘 94, 95
九龙藤 281

九重葛 117
九里明 641
九里香 442
九层风 330
九层皮 ... 14, 199
九莲灯 428
九眼独活 483
儿茶 275

〔7〕

了刁竹 570
了哥王 116
了哥树 522
刀豆 295
刀枪药 702
刀枪木 593

三 笔

〔一〕

三十六荡 574
三七 489
三小叶山豆根 311
三叉苦 439
三叉虎 439
三叉树 115
三叉榕 379
三月泡 268
三爪风 482
三叶五加 482
三叶木通 48
三叶木蓝 313

三叶吊杆泡 ... 264
三叶豆 294
三叶鸡血藤 ... 330
三叶金盆 132
三叶扁藤 431
三叶绞股蓝 ... 131
三叶胶树 226
三叶鬼针草 ... 620
三叶海棠 249
三叶婆婆针 ... 620
三叶蝴蝶花豆 297
三叶蝶豆 297
三白草 61
三白草科 61
三尖叶猪屎豆 298
三舌千里光 ... 641
三年桐 213
三色秋海棠 ... 137
三色堇 75
三花山绿豆 ... 308
三花水锦树 ... 601
三花冬青 403
三花紫金牛 ... 520
三角车 72
三角叶风毛菊 639
三角叶酢浆草 105
三角花 117
三角麦 90
三角枫 337
三角果海桐 ... 123
三角榄 448
三角藤 584

三角瓣花 592
三层楼 487
三股筋香 25
三宝木 238
三姐妹 735
三点金草 308
三峡槭 464
三脉山白菊 ... 618
三脉苎麻 384
三脉冷水花 ... 391
三脉荚蒾 609
三脉球兰 568
三钱三 505
三萼木 598
三裂叶葛藤 ... 326
三裂槭 463
三棱枝杭子梢 295
三筒管 56
下田菊 612
下果藤 420
土丁桂 672
土人參 87
土人參 655
土三七 633
土大黃 96
土乌药 125
土牛膝 98
土甘草 311
土甘草 ... 393, 400
683
土冬虫草 737
土当归 483

土花粉	136	大力草	737	大叶毛赫德木	153
土连翘	580	大力王 ...	319, 634	大叶双眼龙 ...	219
土沉香 ...	114, 223	大山橙	555	大叶玉叶金花	585
土忍冬	603	大飞扬	221	大叶石龙尾 ...	680
土青木香	56	大马蓼	92	大叶石椒	435
土金银花	603	大五月五	132	大叶布荆	719
土细辛	58	大木莲	4	大叶冬青	398
土细辛	61	大木菊	643	大叶白灯笼 ...	712
土茶	183	大风子科	124	大叶白辛树 ...	527
土茜草	596	大风艾	620	大叶白颜树 ...	366
土荆芥	97	大毛果枰	150	大叶半边莲 ...	658
土荆芥	730	大乌莓莓	428	大叶朴树	366
土茵陈	729	大古毛	160	大叶合欢	278
土香薷	730	大艾	620	大叶竹节树 ...	182
土茺香	219	大叶千斤拔 ...	319	大叶红叶藤 ...	474
土党参	655	大叶山矾	534	大叶豆腐木 ...	714
土烟叶 ...	670, 688	大叶山蚂蝗 ...	305	大叶拟赤杨 ...	525
土黄连	48	大叶山扁豆 ...	286	大叶杨桐	141
土常山	532	大叶山梗菜 ...	658	大叶苎麻	383
土密树	217	大叶山绿豆 ...	305	大叶苎麻	382
土蒲公英	637	大叶山楝	449	大叶附地菜 ...	662
土圉儿	293	大叶女贞	545	大叶青冈栎 ...	362
土檀香	418	大叶车前	654	大叶刺篱木 ...	124
万丈龙	56	大叶马兜铃 ...	57	大叶金牛	76
万宁山矾	535	大叶五室枰 ...	151	大叶金锦香 ...	177
万吉滑	478	大叶云实	284	大叶鱼藤	304
万年木	162	大叶木莲	4	大叶泡	263
万年青	340	大叶水团花 ...	574	大叶茶	398
万寿果 ...	139, 420	大叶水指甲 ...	107	大叶栲	349
万寿菊	643	大叶水辣椒 ...	680	大叶胡枝子 ...	314
大丁草	630	大叶毛刺茄 ...	667	大叶香信木 ...	193
大八角	7	大叶毛船柄茶	153	大叶钩藤	599

大叶桉	166	大叶藤	55	大花忍冬	604
大叶栲	349	大四块瓦	62	大花金丝梅 ...	184
大叶蚊母树 ...	336	大田基黄	651	大花金银花 ...	604
大叶拿身草 ...	306	大白艾	631	大花贵州素馨	545
大叶臭椒	446	大白皮胶藤 ...	557	大花黄花梔 ...	208
大叶绣花针 ...	578	大白菜	70	大花第伦桃 ...	120
大叶堇	75	大半边莲	137	大花清明花 ...	552
大叶黄杨	340	大兰树	5	大花紫薇	108
大叶黄杨	407	大头茶	154	大花腰鼓藤 ...	558
大叶黄命树 ...	152	大头菜	69	大芽南蛇藤 ...	403
大叶槿木	337	大加皮	489	大还魂	699
大叶排草	651	大芒木	196	大沙叶	215
大叶蛇总管 ...	734	大托叶云实 ...	284	大沙叶	592
大叶蛇葡萄 ...	428	大西番莲	129	大驳骨	699
大叶野樱	256	大耳榕	372	大陆长柄卫矛	408
大叶猫眼草 ...	81	大回魂	55	大陆狗牙花 ...	554
大叶牵牛	674	大血藤	50	大青	711
大叶鹿角藤 ...	553	大血藤科	50	大青藤	35
大叶斑鸠菊 ...	645	大羊桃	161	大枣	424
大叶棱茎半边莲		大米花树	161	大苞血桐	227
.....	658	大米碎花	149	大苞赤瓟	135
大叶紫金牛 ...	518	大红心	224	大苞栝楼	135
大叶紫珠	708	大红花	206	大刺皂荚	289
大叶紫薇	108	大红鳞蒲桃 ...	171	大转心莲	129
大叶楠	5	大豆	311	大果山香圆 ...	469
大叶鼠刺	241	大丽花	626	大果山楂	247
大叶锥栗	352	大花五桠果 ...	120	大果广宁油茶	145
大叶榕	375	大花石竹	84	大果马蹄荷 ...	339
大叶酸模	96	大花石笔木 ...	157	大果五加	487
大叶馒头果 ...	224	大花老鸦嘴 ...	705	大果木五加 ...	487
大叶算盘子 ...	224	大花米花树 ...	162	大果木姜	27
大叶龄桂鱼藤	304	大花安息香 ...	529	大果冬青	398

- 大果台湾冬青 402
 大果朴树 366
 大果花楸 271
 大果柯 358
 大果厚皮香 ... 156
 大果重阳木 ... 216
 大果腊瓣花 ... 335
 大果微花藤 ... 411
 大罗伞 ... 517, 521
 大罗伞树 520
 大明山桐 364
 大明常山 242
 大齿野桐 229
 大肥牛 632
 大金不换 76
 大金鸡菊 626
 大金盏花 623
 大降龙草 692
 大茶木 146
 大茶药 540
 大毒木 369
 大骨节草 699
 大独脚金 685
 大香藤 ... 13, 301
 大活血 50
 大烂花 28
 大通 491
 大桉 165
 大样酸藤子 ... 522
 大钻 8
 大钻骨风 8
 大唇血见愁 ... 740
 大酒饼子 13
 大绣线菊 273
 大黄藤根 410
 大雀梅藤 424
 大蛇药 488
 大蛇根草 590
 大猪屎青 298
 大麻 392
 大麻科 392
 大粒咖啡 577
 大巢豆 333
 大萼山矾 532
 大萼木姜 25
 大萼桑寄生 ... 415
 大棒红花 725
 大戟 222
 大戟科 212
 大筋骨草 720
 大蓟 625
 大楝树 451
 大新木姜 32
 大滑藤 195
 大蓼 90, 93
 大酸味草 105
 大酸藤 49
 大蛭脚 93
 大嘴肥肚苣苔 688
 大穗兔尾草 ... 332
 大穗鹅耳枥 ... 345
 大翼萼藤 676
 大藤菊 644
 大瓣扁担杆 ... 188
 大鳞柯 355
 [1]
 上竹龙 672
 上身眉 532
 上林杜鹃 506
 上思长蒴苣苔 691
 上思瓜馥木 ... 13
 上思安息香 ... 530
 上思苦登茶 ... 153
 上思厚壳树 ... 661
 上思娃儿藤 ... 574
 上思鸭脚木 ... 490
 上思绣球 244
 上思梭罗树 ... 200
 上思悬钩子 ... 267
 上思野海棠 ... 174
 上思粗叶木 ... 582
 上思稠 360
 上思蒲桃 168
 上思槭 463
 上树蜈蚣 687
 上树蜈蚣 695
 上莲下柳 221, 222
 小一点红 627
 小二仙草 114
 小七十二枝花 628
 小刀豆 296
 小山柳 498
 小山楂 247
 小飞扬 222
 小飞蓬 628

- 小马连鞍 572
 小五加 488
 小五瓣寄生 ... 416
 小木莲 4
 小木通 38
 小化香树 476
 小毛茛 44
 小毛茛 88
 小心叶薯 673
 小石上莲 691
 小正木 406
 小叶九节 593
 小叶九里香 ... 442
 小叶三点金草 307
 小叶山槎子 ... 470
 小叶山柿 511
 小叶山柳 498
 小叶女贞 546
 小叶五月茶 ... 215
 小叶云实 284
 小叶水团花 ... 575
 小叶石楠 253
 小叶艾 618
 小叶布荆 718
 小叶半枫荷 ... 338
 小叶朴 365
 小叶老虎须 ... 625
 小叶网脉山龙眼
 119
 小叶肉穗草 ... 179
 小叶红豆 322
 小叶杜茎山 ... 523
 小叶余甘子 ... 234
 小叶冷水花 ... 390
 小叶鸡屎树 ... 583
 小叶青冈栎 ... 361
 小叶青藤仔 ... 544
 小叶虎皮楠 ... 239
 小叶钩樟 24
 小叶油茶 144
 小叶莽芋 730
 小叶铁屎米 ... 576
 小叶铁线莲 ... 39
 小叶鬼画符 ... 217
 小叶桑 381
 小叶绣花针 ... 578
 小叶黄杨 340
 小叶黄花捻 ... 209
 小叶野扇花 ... 341
 小叶野海棠 ... 174
 小叶犁头草 ... 73
 小叶假糙苏 ... 732
 小叶猴欢喜 ... 194
 小叶寄生 415
 小叶黑面叶 ... 217
 小叶槲 368
 小叶槲木 483
 小叶瑞香 115
 小叶榕 377
 小叶榕 376
 小叶蜘蛛 707
 小白皮胶藤 ... 557
 小白菜 68
 小冬桃 191
 小冬桃 370
 小地黄连 452
 小竹叶菜 587
 小舌菊 637
 小血藤 9,334
 小灯盏 ... 495,671
 小红豆 330
 小花人字果 ... 42
 小花八角 7
 小花木五加 ... 487
 小花木兰 3
 小花艾 617
 小花四粉块藤 571
 小花远志 77
 小花青藤 35
 小花青藤 571
 小花草木犀 ... 316
 小花扁担杆 ... 188
 小花野苦葵 ... 640
 小花悬钩子 ... 267
 小花清风藤 ... 467
 小花粗叶木 ... 582
 小花蓼 92
 小花酸藤子 ... 522
 小花藤 556
 小芸木 441
 小赤麻 384
 小豆腐木 715
 小杜鹃 505
 小远志 76
 小阿茜达 699
 小驳骨 703

小驳骨	702	小牵牛	674	小棉	205
小苦菜	634	小茴茴蒜	43	小萼素馨	544
小苹婆	200	小茴香	494	小紫金牛	516
小苜蓿	315	小狮子头	515	小棠梨	271
小苞爵床	704	小香草	443	小蓟	625
小刺瓜	564	小香藤	12	小蓉木	170
小刺蒴麻	190	小将军	711	小滇丁香	583
小刺樱花	258	小洋紫苏	722	小新木姜	34
小果石笔木 ...	157	小扁藤	431	小酸浆	666
小果冬青	399	小娃儿藤	574	小蓼	92
小果白辛树 ...	527	小桂皮	18	小槐花	305
小果白桐	230	小钻	8	小蜡树	546
小果华槭	463	小钻骨风	8	小辣蓼	91
小果拟赤杨 ...	526	小铁仔	524	小蕊槭	461
小果油茶	144	小铁树	408	小翼萼藤	675
小果香椿	452	小盘木	232	小藜	97
小果铁冬青 ...	401	小彩叶紫苏 ...	722	小藜	46
小果倒地铃 ...	454	小狸藻	687	小藜科	46
小果海木	451	小栎树	456	小鳞荚蒾	608
小果海棠	185	小通花	419	山八角	7
小果野葡萄 ...	432	小通草	335	山八角	7
小果微花藤 ...	412	小通藤	334	山刁竹	570
小果榕	378	小黄皮	438	山大颜	593
小果蔷薇	261	小黄花树	479	山小桔	441
小金不换	76	小桉木	478	山小藜	508
小金合欢	276	小梅花草	43	山马劣树	475
小垂序苣	638	小接骨 ...	700, 702	山五月茶	215
小狗骨柴	598	小野艾	616	山木通	38
小泡树	707	小蛇根草	590	山风	620
小星鸭脚木 ...	490	小蛇菰	419	山毛豆	330
小柑	441	小甜糖木	215	山乌龟	55
小栏木	146	小麻	187	山乌桕	235

山艾	631	山谷蓼	92	山柳科	498
山甘树	224	山鸡皮果	438	山指甲	546
山甘草	292	山鸡血藤	316	山胡椒	22
山石榴	595	山鸡椒	26	山胡椒菊	626
山龙眼	119	山青木	465	山香	726
山龙眼科	117	山矾	532	山香圆	468
山叶蒲桃	170	山矾	536	山扁豆	286
山冬瓜	133	山矾科	531	山姜	24
山丝瓜藤	136	(灰木科)		山莓	265
山耳草	589	山苦瓜	136	山桔子	185
山芝麻	197	山苦荚	637	山桔仔	441
山地豆	307	山枝	579	山桐子	125
山地菊	625	山枇杷	248	山桐子	413
山地蕊	175	山枇杷	120, 374	山桂皮	18
山尖茶	203		513	山桂花	124
山合欢	278	山枇杷榕	374	山桂花	532
山竹子	185	山坡豆	310	山核桃	474
山竹子科	185	山蚂蝗	305	山胶木	514
山豆叶	591	山金桔	440	山铁线莲	41
山豆根	51	山金银花	603	山烟木	669
山豆根叶九里香	441	山钓樟	23	山烟筒子	269
山芙蓉	203	山油茶	157	山莴苣	635
山花木	260	山油桂	434	山桩	124
山芥兰	413	山油麻	367	山黄皮	438
山芹菜	497	山油樟	35	山黄豆	310
山苍子	26	山茶	143	山黄菊	615
山杠木	252	山茱萸	477	山黄麻	367
山杠木	253	山茱萸科	477	山萝卜	625
山杜英	193	山荔枝	457, 478	山萝花	682
山杜茎山	523	山柑	413	山银花	603
山牡荊	718	山柑科	413	山麻杆	213
		山柳	498	山麻树	196

山麻黄 443
 山葵 60
 山萩 614
 山葡萄 428
 山葛藤 325
 山栲 449
 山棉皮 116
 山黑豆 327
 山慈菇 56
 山捻 167
 山榄叶柿 512
 山 榄 科 513
 (赤铁科)
 山楂果 247
 山鼠尾 77
 山蓼 91
 山榕 374
 山模果 191
 山槁树 26
 山蜡梅 275
 山漆树 473
 山蕉 14
 山橘 440
 山橙 556
 山欏叶泡花树 464
 山薄荷 739
 山藿香 739

〔ノ〕

千日红 101
 千斤藤 41
 千年不烂心 667

千年桐 214
 千年矮 340
 千里光 641
 千里香 442
 千层皮 201
 千张纸 696
 千金子 221
 千金藤 54
 千屈菜科 107
 千根草 222
 千瓣白石榴 111
 千瓣白碧桃 257
 千瓣红石榴 111
 个药木 163
 川木瓜 246
 川木通 41
 川乌 36
 川西卫矛 408
 川西吴茱萸 439
 川西胡颓子 425
 川西络石 560
 川芎 495
 川香 495
 川莓 269
 川桂 20
 川桂老鸦糊 706
 川桂柔毛绣球 245
 川鄂栲 349
 川续断 612
 川椒 444
 川楝 451
 川滇钗花 209

川黔千金榆 345
 川黔悬钩子 268
 川黔鸭脚木 489
 川黔鹅耳枥 345
 及己 63

〔、〕

广木香 639
 广玉兰 2
 广东山胡椒 23
 广东山绿豆 306
 广东木瓜红 527
 广东木莲 4
 广东木蓝 312
 广东升麻 642
 广东乌饭树 509
 广东冬青 397
 广东西番莲 129
 广东地构叶 237
 广东来江藤 677
 广东杜鹃 504
 广东杜鹃 502
 广东拟黄树 602
 广东含笑 6
 广东转心莲 129
 广东金钱草 308
 广东钓樟 23
 广东念珠藤 551
 广东夜来香 572
 广东厚皮香 156
 广东柠檬 436
 广东胡枝子 314

广东臭牡丹 ... 712	广西山胡椒 ... 23	广西异形木 ... 172
广东窄裂槭 ... 459	广西五月茶 ... 215	广西血桐 ... 227
广东刺柃 ... 126	广西天料木 ... 127	广西米花树 ... 162
广东排钱草 ... 306	广西木五加 ... 486	广西花点草 ... 388
广东野枇杷 ... 248	广西木莲 ... 4	广西花椒 ... 445
广东野桐 ... 230	广西水锦树 ... 600	广西来江藤 ... 677
广东象牙红 ... 310	广西车轮梅 ... 261	广西冷水花 ... 390
广东船柄茶 ... 153	广西毛冬青 ... 400	广西鸡矢藤 ... 591
广东假耳草 ... 575	广西毛萼红果树	广西轮环藤 ... 52
广东假吊钟 ... 499 274	广西虎皮楠 ... 238
广东寄生 ... 415	广西云实 ... 284	广西肥肚苣苔 ... 689
广东粗叶木 ... 582	广西巴豆 ... 219	广西钓樟 ... 23
广东琼楠 ... 16	广西长梗藤 ... 566	广西狗牙花 ... 554
广东紫珠 ... 707	广西长蒴苣苔 ... 691	广西泡桐 ... 682
广东蒲桃 ... 170	广西风车子 ... 180	广西茜苒 ... 443
广东椴 ... 190	广西牛皮消 ... 564	广西香楠 ... 594
广东榕木 ... 482	广西乌饭树 ... 509	广西香花藤 ... 550
广东赫德木 ... 153	广西石柯 354, 358	广西核实 ... 220
广东蔷薇 ... 262	广西石斑木 ... 250	广西鸭脚木 ... 490
广东爵床 ... 700	广西布荆 ... 717	广西倒吊笔 ... 562
广东蕉寄生 ... 686	广西玉叶金花 ... 585	广西铁仔 ... 524
广叶参树 ... 491	广西凸脉冬青 ... 396	广西绣球 ... 243
广宁油茶 ... 145	广西瓜馥木 ... 12	广西绣线菊 ... 273
广西七叶树 ... 458	广西冬青 ... 400	广西粉绿藤 ... 53
广西八角枫 ... 480	广西白背桐 ... 228	广西桑寄生 ... 414
广西大风子 ... 125	广西半边莲 ... 657	广西黄皮 ... 438
广西山杠木 ... 252	广西芒木 ... 196	广西梭罗树 ... 199
广西山竹子 ... 185	广西地海椒 ... 662	广西崖豆藤 ... 318
广西山茉莉 ... 526	广西百灵藤 ... 567	广西蛇根草 ... 590
广西山柳 ... 499	广西杜英 ... 192	广西悬钩子 ... 266
广西山矾 ... 535	广西杜鹃 ... 504	广西清风藤 ... 468
广西山香圆 ... 468	广西朴树 ... 366	广西密花冬青 ... 395

广西密花树 ... 525		马蓝 699
广西粗叶木 ... 582	〔一〕	马褂木 1
广西旋蒴苣苔 688	马下消 316	马槟榔 66
广西桐 362	马见喜 371	马鞍子 120
广西琼榄 411	马甲子 421	马鞍叶羊蹄甲 282
广西斑鸠菊 ... 644	马兰后 413	马鞍藤 674
广西紫荆 288	马奶奶 158	马缨丹 714
广西紫树 481	马边绣球 243	马蹄金 671
广西紫麻 388	马连鞍 571	马蹄郎 682
广西鹅山木 ... 182	马肝石 92	马蹄香 611
广西掌叶树 ... 485	马利筋 562	马蹄荷 339
广西楠 34	马尾树 476	马蹄根 558
广西槐树 330	马尾树科 476	马蹄菱 487
广西醉魂藤 ... 567	马林光 153	马蹄槭 460
广西蒿 616	马齿苋 87	马蹄樟 339
广西腹水草 ... 677	马齿苋科 87	马攀子 431
广西鼠刺 241	马松子 198	马鞭草 717
广西新木姜 ... 33	马莲草 658	马鞭草科 705
广西槭 461	马钱子 541	飞天蚧 194
广西橙 436	马钱科 538	飞天蜈蚣 612
广西蔷薇 262	马铃苦苣苔 ... 693	飞天蜈蚣 88
广州紫菀 619	马铃薯 669	飞龙掌血 444
广州槲果藤 ... 65	马料树 345	飞机草 630
广防已 57	马桑 120	飞扬草 221
广豆根 329	马桑科 120	飞燕草 41
广花娃儿藤 ... 573	马廐儿 133	飞蛾槭 462
广柑 437	马银花 506	飞蛾藤 676
广桔 437	马兜铃 56	习见蓼 94
广翅卫矛 408	马兜铃科 56	卫矛 405
广福杜鹃 504	马鹿角 89	卫矛叶蒲桃 ... 169
广藿香 735	马骝花 683	卫矛科 403
	马棘 312	女贞 545

女贞豆腐木 … 715	天葵 …… 44	云南润楠 …… 32
女葵 …… 38	天葵海棠 …… 138	云南稠 …… 363
叉花土三七 … 632	天蓝苜蓿 …… 315	云南朝天罐 … 177
叉指叶栝楼 … 136	天蓝绣球 …… 659	云南葛藤 …… 325
叉柱花 …… 704	天蓬菜 …… 86	云南紫金牛 … 521
弓果藤 …… 572	天蓼 …… 93	云南蔷薇 …… 263
弓背树 …… 207	云山伯乐树 … 458	云南酸藤子 … 521
子凌木 …… 168	云山南华木 … 458	云南樟 …… 19
子凌蒲桃 …… 168	云山稠 …… 362	云南樱花 …… 258
	云木香 …… 639	云南糖胶树 … 551
	云实 …… 285	云贵山茉莉 … 526
	云南九节 …… 593	云香 …… 436
	云南大沙叶 … 215	云藕豆 …… 324
	云南山柳 …… 499	太平安息香 … 530
	云南山指甲 … 11	太平杜鹃 …… 502
	云南木瓜红 … 528	太阳花 …… 639
	云南水青冈 … 352	太阳麻 …… 299
	云南玉叶金花 585	不出林 …… 518
	云南白桐 …… 232	五寸刀 …… 468
	云南地黄连 … 452	五寸铁树 …… 468
	云南杜英 …… 193	五月艾 …… 616
	云南鸡矢藤 … 591	五月艾 …… 618
	云南狗牙花 … 555	五月茶 …… 214
	云南厚壳树 … 660	五爪三七 …… 79
	云南钩藤 …… 600	五爪金龙 …… 672
	云南绣球 …… 245	五匹风 …… 254
	云南黄花捻 … 209	五叶爬山虎 … 430
	云南黄杞 …… 475	五加 …… 481
	云南黄素馨 … 544	五加皮 …… 605
	云南萝芙木 … 559	五加科 …… 481
	云南假鹰爪 … 11	五加通 … 488, 491
	云南粗叶木 … 581	五列木 …… 158

四 笔

〔一〕

天女花 …… 3	天目朴树 …… 365	天目杜鹃 …… 503	天目紫茎 …… 155	天仙子 …… 664	天仙藤 …… 56	天名精 …… 623	天花公 …… 136	天芥菜 …… 661	天竺葵 …… 104	天胡荽 …… 495	天星吊红 …… 78	天星藤 …… 566	天香炉 …… 177	天香藤 …… 277	天峨槭 …… 463	天料木 …… 127	天料木科 …… 126	天堂瓜馥木 … 13
----------	-------------	-------------	-------------	------------	-----------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------------	------------

五列木科	158	无柄山柑	66	木防己	50
五色梅	714	无柄长叶假糙苏	732	木豆	294
五宅茄	667	无柄果钩藤 ...	600	木李	247
五角茄	668	无柄扁担杆 ...	188	木花生	226
五味子木	214	无柄槌果藤 ...	66	木花生	514
五味子科	8	无香藤	566	木苎麻	382
五指牛奶	378	无根藤	17	木芙蓉	206
五指毛桃	378	无患子	457	木质蛇根草 ...	590
五指榕	378	无患子叶崖豆藤	318	木油树	214
五香草	729	无患子科	453	木空菜	657
五桠果科 ...	120	无腺红淡	147	木荚红豆	323
(第伦桃科)		元江栲	351	木香子	21
五倍子树	472	元宝草	185	木姜子	26
五倍叶	37	车轮梅	260	木姜子桐	362
五彩石竹	84	车轮菜	654	木姜子叶水锦树	600
五彩桃	257	车线藤	53	木姜叶冬青 ...	396
五虎通城	57	车前	654	木荷	154
五脚紫金牛 ...	520	车前草	654	木莲	3
五数薄瓣节节菜	109	车前草	654	木笔	2
五膈草科	657	车前草科	654	木海棠	104
五蕊寄生	416	车桑子	454	木通科	48
五瓣寄生	416	车辕木	169	木菌子	419
互生苣荬	692	木兰	2	木菠萝	369
无毛白花苋 ...	99	木兰科	1	木患子	457
无毛南蛇藤 ...	405	木瓜	139	木患树	457
无叶枫寄生 ...	417	木瓜	246, 247	木常山	712
无头藤	17	木瓜科(万寿果科、番木瓜科)	139	木麻黄	364
无花果	372	木丝瓜	203	木麻黄科	364
无忧花	290	木竹子	185	木棉	202
无刺含羞草 ...	280			木棉科	202
无齿樱桃	255			木棍树	412

木犀	548	中华槭	463	水亚木	244
木犀叶假卫矛	409	中华螺序草 ...	597	水百足	328
木犀科	542	中肋耳草	587	水团花	574
木榄	182	中间水箭草 ...	722	水竹消	564
木蓝	313	中间风毛菊 ...	639	水竹蒲桃	169
木蓼	93	中国狗牙花 ...	554	水冰片	84
木槿	207	中国绣球	242	水红木	606
木蝴蝶	696	中国槐	329	水芹	496
木熟果	185	中果油茶	144	水芽豆	310
木薯	232	中南豆腐木 ...	715	水苍树	26
木鳖	134	中南槭	462	水菟菜	99
木瓣瓜馥木 ...	13	中蛇根草	590	水苎麻	383
牙皂	289	中越杜茎山 ...	523	水杨柳	565
牙香树	114	中越密脉木 ...	586	水杨梅	248
王不留行	377	中越蒲桃	170	水杨梅	575
王瓜	136	水八角	680	水扬葵	292
巨果冬青	394	水马齿	114	水皂角	292
瓦山栲	348	水马齿科	114	水茄	669
〔1〕		水车藤	120	水苦葵	686
中平树	227	水牛奶	162	水青冈	352
中华千里光 ...	641	水龙	112	水枇杷	162
中华五隔草 ...	657	水东哥	162	水拖柴	344
中华水锦树 ...	602	水东哥科	161	水泡木	224
中华石龙尾 ...	679	水石梓	515	水泡乌饭树 ...	508
中华艾纳香 ...	622	水田芥	71	水泡茶	143
中华被萼芭苔	689	水瓜	133	水泽兰	630
中华绣线菊 ...	272	水瓜子	110	水面一盏灯 ...	45
中华野珠兰 ...	273	水冬瓜	575	水柳	226
中华野海棠 ...	174	水冬瓜	525	水指甲	107
中华密榴木 ...	14	水白芷	483	水结草	565
中华锥花	725	水丝梨	338	水栗	353
		水丝麻	387	水蚬木	216

水珠草	111	少花吊钟	500	毛五爪龙	674
水桐树	480	少花莢蒾	608	毛木防已	50
水翁	163	少刺毛假糙苏	732	毛木蓝	312
水凉子	334	少刺蔷薇	263	毛水珍珠菜	722
水黄皮	325	少果海桐	122	毛凤仙	107
水猪菜	107	少脉木姜	28	毛六驳	15
水麻	384	少脉假卫矛	410	毛龙须	67
水麻叶	384	少脉腺柄山矾	531	毛石笔木	158
水葵	203	少蕊扁担杆	188	毛石梓	714
水棉木	336, 377	见风干	22	毛叶木姜	26
	594	见风消	22	毛叶乌菰莓	429
水晶兰	511	见血飞	444	毛叶栲树	455
水晶兰科	511	见血封喉	369	毛叶杜英	192
水筒木	374	见雪飞	290	毛叶阿芳	10
水椎木	226	见霜黄	621	毛叶轮环藤	51
水蓝青	84	日日新	552	毛叶咀签	420
水湿蓼	94	日本瓜	129	毛叶铁线莲	40
水蓑衣	702	日本樱花	258	毛叶海木	451
水锦树	602	止血木	229	毛叶黄牛木	183
水锥栲	349	止泻木	555	毛叶蛇葡萄	427
水蓼	91			毛叶蓝猪耳	685
水榕	371			毛叶锥栗	348
水榕	163			毛叶新材	153
水榕木	163			毛冬瓜	159
水槟榔	66			毛冬青	400
水蜡树	542			毛白杨	342
水箭草	722			毛白鹤藤	670
水薄荷	707			毛瓜馥木	12
少年红	588			毛老虎	505, 726
少花水芹	496			毛老鸦糊	706
少花龙葵	668			毛虫草	518
少花吊石苣苔	693			毛竹叶椒	446

- 毛安息香 529
 毛防已 53
 毛羽叶楸 698
 毛红棟子 453
 毛花马蔺儿 ... 133
 毛杨桃 160
 毛杨梅 343
 毛杜仲藤 557
 毛杜英 192
 毛秀才 665
 毛秀柱花 336
 毛序花楸 271
 毛鸡矢藤 591
 毛鸡骨草 291
 毛鸡眼藤 583
 毛茄 667
 毛板栗 660
 毛枝绣线菊 ... 273
 毛披树 400
 毛刺蒴麻 191
 毛青檀 367
 毛青藤 36
 毛青藤仔 544
 毛果巴豆 219
 毛果田麻 196
 毛果鸡爪莲 ... 421
 毛果鱼藤 303
 毛果柯 357
 毛果枌 152
 毛果枳椇 421
 毛果扁担杆 ... 188
 毛果算盘子 ... 224
 毛齿叶铁线莲 ... 40
 毛岩冷 151
 毛狗牙花 554
 毛金银花 603
 毛金腺萼苣 ... 606
 毛鱼黄草 675
 毛鱼藤 303
 毛宝巾 117
 毛泽兰 630
 毛泡桐 682
 毛牵牛 674
 毛苣 43
 毛苣科 36
 毛草龙 112
 毛荔枝 457
 毛荚苣 607
 毛药藤 559
 毛相思子 291
 毛柄珍珠菜 ... 650
 毛柱金银花 ... 603
 毛柱铁线莲 ... 40
 毛鸦胆子 447
 毛背花楸 270
 毛冠唇花 728
 毛冠藤 562
 毛脉乌口树 ... 598
 毛脉刺葡萄 ... 433
 毛脉野枣 425
 毛脉崖爬藤 ... 432
 毛脉焰爵床 ... 703
 毛脉鼠刺 240
 毛脉酸枣 470
 毛脉嘉赐树 ... 127
 毛毡草 621
 毛钩藤 599
 毛扁蒴藤 411
 毛桃 4, 159
 毛桃木莲 4
 毛桂 18
 毛桐 228
 毛栲 350
 毛连菜 638
 毛倒吊笔 562
 毛高山蓼 93
 毛窄叶冷 152
 毛绣球防风 ... 727
 毛黄肉楠 15
 毛堇菜 73
 毛葱 176
 毛梗子 386
 毛梗红翅槭 ... 461
 毛梭罗树 200
 毛排钱草 304
 毛球兰 568
 毛蛇王藤 129
 毛野蔷薇 262
 毛银柴 215
 毛麻子藤 558
 毛麻棟 450
 毛宿苞豆 328
 毛葵 60
 毛萼红果树 ... 273
 毛萼李榄 547
 毛萼蔷薇 262

- 毛葡萄 433
- 毛鼠刺 240
- 毛蓼 88
- 毛蔓豆 294
- 毛嘉赐树 127
- 毛槿 207
- 毛蕊鸡血藤 ... 317
- 毛瓣崖豆藤 ... 317
- 毛麝香 676
- 丹参 736
- 丹草 588
- 丹桂 548
- 长毛山矾 533
- 长毛豆腐木 ... 715
- 长毛柃 151
- 长毛香科 739
- 长毛锥花 725
- 长化香树 476
- 长玉叶金花 ... 584
- 长节耳草 589
- 长叶水麻 384
- 长叶牛膝 99
- 长叶火柴枝树 609
- 长叶玉兰 2
- 长叶龙船花 ... 580
- 长叶苎麻 383
- 长叶茅膏菜 ... 82
- 长叶泡桐 682
- 长叶茜草 596
- 长叶柞木 126
- 长叶钩子 735
- 长叶栲 351
- 长叶莴苣 636
- 长叶排钱树 ... 306
- 长叶悬钩子 ... 265
- 长叶假糙苏 ... 732
- 长叶酸藤子 ... 521
- 长尖叶木五加 485
- 长安金桔 440
- 长麦果树 421
- 长花龙吐珠 ... 713
- 长花厚壳树 ... 661
- 长花柏拉木 ... 173
- 长花柄掌叶树 484
- 长花野锦香 ... 173
- 长花银花 604
- 长角山芝麻 ... 197
- 长序大果冬青 399
- 长序南五味子 8
- 长序南蛇藤 ... 405
- 长尾远志 77
- 长尾窄裂槭 ... 459
- 长尾窄叶柃 ... 152
- 长尾粗叶木 ... 582
- 长茎赤车 389
- 长苞莽苧 730
- 长刺锥栗 348
- 长刺酸模 96
- 长果花楸 272
- 长果柃 149
- 长果柯 356
- 长果猪血木 ... 156
- 长果琼楠 16
- 长果满天香 ... 121
- 长波叶山绿豆 308
- 长波状叶山蚂蝗
..... 308
- 长荚山绿豆 ... 309
- 长柄山毛榉 ... 352
- 长柄山龙眼 ... 118
- 长柄山桂花 ... 124
- 长柄本勒木 ... 124
- 长柄瓜馥木 ... 12
- 长柄杜英 193
- 长柄赤车 389
- 长柄冷水花 ... 390
- 长柄柯 356
- 长柄梭罗树 ... 199
- 长柄野扁豆 ... 310
- 长柄紫珠 708
- 长柄藤榕 375
- 长柱山丹 578
- 长柱虎皮楠 ... 238
- 长春花 552
- 长钩刺蒺藜 ... 190
- 长突耳草 588
- 长圆叶卫矛 ... 408
- 长圆叶鼠刺 ... 240
- 长圆叶新木姜 33
- 长圆叶酸藤子 521
- 长脐红豆 321
- 长倒卵叶山龙眼
..... 118
- 长梗冬青 400
- 长梗连蕊茶 ... 156
- 长梗蚌壳椒 ... 445

长梗金粟兰 ... 62	牛奶藤 ... 159, 160	风车藤 211
长梗细辛 58	563, 657	风毛菊 639
长梗珍珠菜 ... 652	牛纠树 440	风叶藤 429
长梗铜钱树 ... 421	牛至 729	风吹楠 36
长梗润楠 30	牛耳朵 689	风轮菜 721
长萼玉叶金花 585	牛耳枫 238	风铃藤 655
长萼半边莲 ... 658	牛耳楠 5	风箱树 577
长萼鸡眼草 ... 313	牛老药藤 598	风藤 8
长萼茄 668	牛肋巴 301	月见罗藟草 ... 296
长萼堇菜 74	牛舌草 654	月见草 113
长萼猪屎豆 ... 298	牛角瓜 562	月月红 261
长蒴母草 680	牛角树 525	月光花 671
长蒴蚬木 187	牛角椒 663	月季花 261
长蒴黄麻 187	牛角藤 572	月桔 442
长管素馨 543	牛榔铃 275	月桂 548
长穗青冈栎 ... 362	牛栓藤 474	月桂山矾 535
长穗猫尾草 ... 332	牛栓藤科 473	月桂肉实树 ... 515
长瓣马蹄荷 ... 338	牛眼果 125	乌口果 191
化香树 476	牛眼珠 541	乌口树 598
牛大力 318	牛筋木 271	乌冈栎 363
牛牙果 124	牛筋藤 380	乌叶栲木 155
牛见愁 474	牛蒡 615	乌头 36
牛心果 10	牛嗓管树 161	乌材 511
牛心树 4	牛膝 98	乌饭小藁 508
牛甘藤 291	牛蹄豆 280	乌饭树 508
牛矢果 549	牛繁缕 86	乌饭树科 508
牛白藤 587	牛藤 ... 49	乌泡 265
牛皮冻 591	凤山槌果藤 ... 65	乌药 25
牛皮消 564	凤仙花 106	乌柏 236
牛皮菜 97	凤仙花科 106	乌榄 448
牛奶菜 569	凤眼果 201	乌菰莓 428
	凤凰木 288	乌蝇翼 314

乌藤	15	火草	614	巴西橡胶树 ...	226
午时花	198	火树	288	巴豆	219
分叉破布木 ...	660	火炭木 ...	163, 499	巴豆藤	297
分枝感应草 ...	104	火炭木寄生 ...	416	巴戟天	583
分裂鳞蕊藤 ...	674	火炭母	89	引汁藤	557
手瓜	135	火绒艾	614	双飞蝴蝶	574
手榴	437	火索藤	281	双花假卫矛 ...	409
反枝苋	100	火柴子树	607	双花蟛蜞菊 ...	645
爪哇木棉	202	火梅	343	双果冬青	394
爪哇古柯	211	火球花	101	双室木五加 ...	485
勾儿茶	420	火麻	392	双蝴蝶	647

〔、〕

心叶石笔木 ...	157	火焰花	290
心叶青藤	35	火筒树	430
心叶茶	142	火蓝	313
心叶蚬木	186	火锥	350
心叶黄花榆 ...	208	六月雪	597
心叶船柄茶 ...	153	六方藤	429
心叶寄生	415	六耳铃	622
心叶槲木	483	六角莲	47
心叶赫德木 ...	153	六果悬钩子 ...	266
心型杜鹃	502	六棱菊	636
心翼果	411	文木	660
火力楠	5	方叶五月茶 ...	214
火力楠	5	方枝木犀榄 ...	547
火布茶	189	方茎耳草	589
火把果	259		
火花树	696		

〔一〕

火灵丹	653	巴东清风藤 ...	466
火果	216	巴西苜蓿	330
火殃藜	220	巴西棉	205

五 笔

〔一〕

正木	407
玉叶金花	585
玉龙鞭	716
玉兰	2
玉果	36
玉珊瑚	669
玉铃花	530
玉盘叶柯	358
玉蝶梅	567
可爱花	701
石山杠	239
石山吴茱萸 ...	439
石山珍珠菜 ...	653
石山桂花	548
石山蒿	618

- 石山漆 471
 石上莲 693
 石上莲 137
 石上海棠 137
 石风车子 180
 石龙芮 43
 石龙尾 680
 石仙桃 565
 石灰树 271
 石吊兰 693
 石竹 84
 石竹科 83
 石羊草 385
 石松草 163
 石岩枫 231
 石虎 440
 石果山茶 144
 石油菜 389
 石芥苧 730
 石莽草 89
 石南藤 60
 石柯 354, 357
 石栎 357
 石胡荽 624
 石钟花 694
 石栗 213
 石狮子 516
 石笔木 156
 石笔木 253
 石海椒 102
 石菟茜 390
 石梓 713
 石斑木 260
 石椋草 391
 石棠木 260
 石楠 254
 石楠乌口树 597
 石榴 110
 石榕 379
 石蜡烛 686
 石蝉草 59
 石辣蓼 83
 石壁杜鹃 502
 石壁柴 502
 石螃蟹 690
 石蟾蜍 55, 136
 平头海桐花 123
 平地木 518
 平地跑马 612
 平伐山柳 499
 平伐山茶 145
 平阳厚壳桂 20
 平顶紫金牛 517
 平卧土三七 633
 平南冬青 400
 平脉铃 148
 平脉桐 362
 平脉槲栎 363
 平滑钩藤 599
 平滑楼梯草 385
 古陈杜鹃 504
 古柯 211
 古柯科 211
 古钩藤 563
 龙山果 193
 龙头花 677
 龙吐珠 713
 龙州风车藤 211
 龙芽花 310
 龙芽草 246
 龙胜乌饭树 510
 龙胜冬青 402
 龙胜钓樟 23
 龙胜柿 512
 龙胜槭 462
 龙胆草 648
 龙胆科 646
 龙须藤 281
 龙珠 666
 龙珠果 129
 龙脑香科 162
 龙眼 455
 龙刚叶 237
 龙船花 580
 龙葵 668
 左钮菜 668
 布渣叶 189
 东女贞 545
 东方水锦树 601
 东方古柯 211
 东方蓼 93
 东风桔 434
 东风菜 619
 东南水丝梨 338
 东南栲 350
 东南野桐 230

- 艾 616
艾 618
艾叶 617
艾纳香 620
艾麻草 387
节瓜 130
节节花 76, 99
节节菜 109
节花五加 482
节梗大蓼 488
打不死 56
打拍草 666
打炮子 ... 220, 419
打铁树 525
打铁树 519
打破碗花花 ... 37
- [I]
- 叶下珠 234
叶子花 117
叶里含珠 212
叶轮木 232
叶珠木 233
四大金刚 63
四川小金钱草 671
四川冬青 402
四川朴 366
四川杨桐 140
四川轮环藤 ... 52
四川金钱草 ... 650
四川黄花棣 ... 209
四川蛇菰 418
- 四川棘果卫矛 405
四川溲疏 241
四川樱桃 255
四子莲 62
四子海桐花 ... 123
四方草 734
四方台 128
四方麻 678
四方藤 429
四叶参 656
四叶拉拉藤 ... 579
四叶萝芙木 ... 558
四列石蚕 739
四块瓦 62
四角铃 152
四角假卫矛 ... 410
四角蒲桃 171
四季豆 324
四季青 606
四季青 535
四季桔 437
四季海棠 139
四药门花 339
四料木 291
四籽野豌豆 ... 333
四棱豆 325
四棱草 716
四棱草 596
四棱猪屎豆 ... 300
四蕊三角瓣花 592
四瓣米仔兰 ... 449
- 田七 489
田边菊 619
田州三七 489
田灰艾 631
田芥菜仔 621
田菁 328
田基豆 328
田基黄 184
田基麻 659
田基麻科 659
田黄菜 632
田野千里光 ... 640
田繁缕 83
北玄参 684
北江十大功劳 48
北江杜鹃 505
北江堇花 116
北美丁花 175
北堇菜 73
北紫堇 619
北裂膈牡丹 ... 175
号角树 370
凸叶榕 376
凸尖楼梯草 ... 386
凸脉冬青 396
史拉登茶 155
- [J]
- 禾串树 217
禾雀脯 80
禾稿草 637
生根冷水花 ... 391

生菜	635	白皮胶藤	557	白花悬钩子 ...	267
白千层	167	白冬虫草	737	白花菜	67
白千里光	641	白头树	448	白花菜科	65
白子菜	632	白头婆	634	白花曼陀罗 ...	664
白马胎	75	白兰	4	白花笼	529
白马骨	597	白芍	43	白花银背藤 ...	670
白木乌桕	235	白扣子	529	白花梓树	696
白木香	114	白吊粟	228	白花蒿	617
白车	170	白灯笼	712	白花矮朵朵 ...	452
白车轴草	331	白芷	492	白花藕	482
白日新	552	白花木	530	白花酸藤子 ...	522
白月光花	671	白花丹	653	白花蟛蜞菊 ...	627
白长春花	552	白花艾	631	白苏	733
白毛长叶紫珠	708	白花仔	99	白克木	339
白牛胆	634	白花灰叶豆 ...	330	白杜仲藤	557
白玉兰	2	白花老枪谷 ...	100	白杜鹃	506
白石榴	111	白花地蚕	738	白身树	125
白石榴花	111	白花地胆草 ...	627	白饭树	223
白术	620	白花羊蹄甲 ...	281	白辛树	527
白布荆	718	白花苋	99	白英	667
白龙船花	580	白花阿生草 ...	678	白枝羊蹄甲 ...	282
白叶子	228	白花含笑	6	白刺花	330
白叶瓜馥木 ...	11	白花刺	261	白果香楠	594
白叶安息香 ...	530	白花油麻藤 ...	320	白乳木	235
白叶厚壳桂 ...	21	白花鱼藤	302	白狗肠	695
白叶莓	266	白花败酱	611	白线薯	53
白叶野茉莉 ...	530	白花益母草 ...	727	白绒石楠	253
白叶鸭脚木 ...	490	白花除虫菊 ...	624	白面苎麻	382
白叶藤	563	白花前胡	496	白栎	360
白瓜	130	白花犁头草 ...	73	白背子草	79
白皮	126	白花蛇舌草 ...	587	白背木	203
白皮绣球	243			白背五叶艾 ...	618

白背杨	341	白喉崩	557	冬青	545
白背厚壳桂 ...	21	白楠	34	冬青科	393
白背桐	228	白榄	448	冬桃	191
白背蚊艾	618	白楸	231	冬桃	192
白背黄花桉 ...	209	白鼓钉	58	包叶木	420
白背绸缎	670	白瑞香	115	包果柯	354
白背算盘子 ...	225	白碧桃	257	包菜	70
白背藤	670	白筍	482	鸟祿草	454
白骨木	597	白菰	428	鸟不企	483
白香薷	723	白蝉	579	包不宿	47
白扁豆	309	白蜡树	542	鸟仔刺	259
白眉	631	白蜡树	542	乐业假鼠李 ...	421
白珠木	500	白颜树	366	乐昌冬青	403
白莲藕	61	白鹤灵芝	704	仙人掌	140
白桐	228, 682	白鹤藤	670	仙人掌科	139
白桐树	218	白椴	349	仙黄麻	198
白桂木	369	白薇	564	仙鹤草	246
白梅花	256	白檀	536	仪花	289
白胶木	21	白藓皮	296	印度石莲花 ...	80
白烟筒	269	白蔗	248	印度豆	330
白粉小蘗	46	瓜子木	168	印度草木犀 ...	316
白粉藤	429	瓜子金	565	印度萝芙木 ...	558
白雪花	653	瓜子金	76	印度棉	205
白菊仔	624	瓜子菜	87, 726	印度锥栗	350
白菜	68	瓜子黄杨	340	印度蕹菜	72
白野槁树	27	瓜木	480	印度橡胶树 ...	373
白梨么	220	瓜蒌	136	丛生泽兰	629
白银寄生	414	瓜馥木	12	丛花厚壳桂 ...	21
白麻	383	冬瓜	129	丛刺栲	350
白萼素馨	542	冬红花	714	丛轴荚蒾	609
白塔木	531	冬青	394		
白棠子树	707				

〔、〕

玄参 684
 玄参 684
 玄参科 676
 头花蓼 89
 兰花参 656
 兰草 629
 兰香草 710
 半边刀 386
 半边枫 335
 半边莲 657
 半边莲科 657
 (山梗菜科)
 半边碟 81
 半枝莲 ... 87, 736
 半枫荷 338
 半枫荷 ... 198, 487
 半枫樟 34
 半齿柃 152
 半夜开门 585
 半柱花 702
 半匍匐毛茛 ... 44
 半截叶 128
 半覆瓦十大功劳
 48
 半灌木千斤拔 319
 宁夏枸杞 665
 永福绣球 243
 汉三七 633
 刘寄奴 617

〔7〕

母生 127
 母鸡带仔 428
 母草 681
 皮青木 322
 皮刺卫矛 405
 皮藤 381
 尼泊尔老鹳草 103
 尼泊尔肉穗草 178
 尼泊尔齿冠菊 637
 尼泊尔胡椒 ... 60
 尼泊尔蓼 92
 台湾水锦树 ... 601
 台湾冬青 402
 台湾相思 275
 台湾海棠 250
 台湾旋蒴苣苔 688
 台湾清风藤... 467
 台湾榕 379
 发冷藤 56
 边荚鱼藤 304
 边缘罗裙子 ... 9
 凹叶女贞 546
 凹叶冬青 401
 凹叶瓜馥木 ... 12
 凹叶厚朴 1
 凹尖圆叶乌桕 236
 凹脉柃 149
 凹萼木鳖 134
 加拉桫 165
 加毒 369

加拿大白杨 ... 341

加拿大蓬 628

对叶榕 375

对面花 595

奶母草 221

奶叶藤 656

奶汁草 221

奶汁藤 553

奶参 656

奶参 655

奶果猕猴桃 ... 159

幼枝卫矛 407

丝毛艾纳香 ... 622

丝毛榄仁 181

丝瓜 132

丝栗 351

丝栗 349

丝铁线莲 39

丝柄吊石苣苔 693

丝棉木 339

丝棉树 339

六 笔

〔一〕

西瓜 130

西芎 495

西红柿 665

西江悬钩子 ... 265

西伯利亚老鹳草

..... 104

西伯利亚远志 77

西南八角枫 ... 479	百鸟不落 488	芝麻科 698
西南三角瓣花 592	百两金 517	托叶土密树 ... 217
西南马先蒿 ... 682	百合杜鹃 505	扫把艾 616
西南风车子 ... 180	百色水锦树 ... 602	扫把枝 163
西南毛连菜 ... 638	百色威灵仙 ... 39	扫把菜 724
西南石斑木 ... 250	百色萝芙木 ... 559	扫帚菜 98
西南灰莉 540	百色猴欢喜 ... 194	扫锅草 112
西南米楮 347	百咳草 319	扛板归 93
西南远志 78	百脉根 315	扣子草 ... 658, 668
西南杠柳 570	百能葳 620	扣子藤 54
西南青荚叶 ... 479	百解藤 51	扣匹 15
西南齿冠菊 ... 637	百蕊草 418	朴树 366
西南垂序苣 ... 638	耳叶马兜铃 ... 57	地丁 648
西南金粟兰 ... 62	耳叶牛皮消 ... 564	地丁草 74
西南香楠 594	耳叶榕 373	地下明珠 82
西南扁担杆 ... 188	耳状苣苔 693	地五泡藤 266
西南栲 347	耳状紫堇 619	地瓜 323
西南宿苞豆 ... 328	耳草 586	地瓜榕 379
西南海桐 122	耳草长蒴苣苔 690	地耳草 184
西南排草 652	耳挖草 737	地豆 293
西南野木瓜 ... 49	耳挖草 627	地肤 98
西南野海棠 ... 174	耳响草 204	地灵苋 101
西南粗叶木 ... 582	耳聋草 81	地枇杷 ... 175, 379
西南槐树 329	亚革质冷水花 391	地苦胆 56
西洋红 736	亚洲石梓 713	地骨皮 665
西洋菜 71	亚洲棉 205	地胆草 627
西梓 344	亚麻 102	地笋 727
西番莲 128	亚麻科 102	地蚕 737
西番菊 643	芒木 196	地桃花 210
西藏山茉莉 ... 527	芒毛苣苔 688	地苍 175
百日草 646	芍药 43	地黄 683
百六齿 182	芝麻 698	地黄木 532

地黄连	452	老鼠筋	698	灰盆草	654
地棉皮	116	老蟹眼	148	灰绒白兰花 ...	5
地棉麻	116	老蟹眼木	152	灰莉	540
地榆	270	老鹤草	103	灰楸	695
地锦	430	吉贝	202	夹竹桃	556
地糍粑	132	吉龙草	723	夹竹桃叶崖花子	
老山茶	630	吉祥草	683	121
老枪谷	99	过山风	9	夹竹桃科	550
老虎毛虫药 ...	519	过山风	28	列当科	686
老虎豆 ...	319, 673	过山龙	643	有色卫矛	409
老虎肝	371	过山枫	404	毕当茄	167
老虎刺	290	过山蛇	78	动蕊花	726
老虎须	41	过江龙	279		
老虎须藤	40	过江藤	714	[1]	
老虎草	711	过塘蛇	112	光山香圆	468
老虎斑	335	过塘蛇	110	光广东爵床 ...	700
老虎脰	93, 387	过塘藕	61	光牛奶菜	569
	519, 625	过路黄	649	光叶山小桔 ...	441
老虎榛	450	过路黄	650	光叶山芝麻 ...	197
老鸦嘴藤	557	过路蛇	76	光叶山矾	535
老鸦胆	447	达仑木	598	光叶山黄麻 ...	367
老鸦铃	529	灰九节	593	光叶云南槿 ...	207
老鸦糊	706	灰山泡	270	光叶水团花 ...	575
老荆藤	303	灰木	536	光叶水青冈 ...	352
老猕猴桃	159	灰木叶八角 ...	7	光叶艾	618
老鼠矢	537	灰木杨桐	142	光叶玉兰	2
老鼠耳	419	灰毛豆	330	光叶石楠	252
老鼠怕	442	灰毛浆果楝 ...	450	光叶白兰花 ...	5
老鼠刺	239	灰布荆	717	光叶灰布荆 ...	717
老鼠拉冬瓜 ...	133	灰叶	331	光叶耳草	588
老鼠屎	44	灰叶冬青	403	光叶合欢	278
老鼠眼	327			光叶决明	286

光叶红豆	321	光榕	374	岂山山矾	534
光叶柯	355	光蜡树	542	网叶山胡椒 ...	22
光叶显脉木姜子	33	尖子木	177	网脉山龙眼 ...	119
光叶桦	344	尖山橙	555	网脉石上莲 ...	693
光叶海桐	121	尖叶山茶	143	网脉忍冬	605
光叶猕猴桃 ...	161	尖叶木	600	网脉钓樟	22
光叶紫玉盘 ...	14	尖叶木蓝	313	网脉柳	342
光叶榧木	482	尖叶乌药	23	网脉核实	220
光叶蓝猪耳 ...	685	尖叶六驳	15	网脉假卫矛 ...	410
光皮木瓜	247	尖叶白粉藤 ...	429	网脉银花	605
光皮桦	344	尖叶杜茎山 ...	523	网脉旋蒴苣苔	688
光华柳叶菜 ...	111	尖叶杜鹃	506	网脉琼楠	17
光秃腊瓣花 ...	335	尖叶鸡矢树 ...	581	网脉紫薇	108
光枝多叶勾儿茶		尖叶念珠藤 ...	551	网络鸡血藤 ...	318
.....	420	尖叶柃	147	网膜木	580
光枝湘黔柃 ...	149	尖叶唐松草 ...	44	同色蓝猪耳 ...	685
光刺蕊草	735	尖叶黄肉楠 ...	15	团花	576
光果台湾莢蒾	609	尖叶粗叶木 ...	581	团花冬青	396
光泽锥花	726	尖叶紫金牛 ...	519	团花鸭脚木 ...	490
光柄筒冠花 ...	737	尖叶楼梯草 ...	385	肉叶茜草	595
光冠银花	604	尖头花	719	肉叶鞘蕊花 ...	721
光盾翅藤	211	尖尾枫	708	肉豆蔻	36
光桐	213	尖尾栲	348	肉豆蔻科	36
光栓果菊	637	尖苞掌叶树 ...	485	肉果	36
光野桐	230	尖果栲树	455	肉盾异唇花 ...	720
光粗叶木	581	尖脉木姜子 ...	25	肉实树	515
光清香藤	543	尖萼毛柃	147	肉实科 ...	515
光萼猪屎豆 ...	300	尖萼紫珠	707	(水石梓科)	
光滑丁公藤 ...	672	尖槐藤	570	肉桂	18
光滑麻辣子 ...	672	尖嘴林檎	249	肉桂山萩	614
光缘大蔓	488	当归藤	522	肉桂香青	614
光蓼	90	当芽	731	刚毛三叶五加	482

刚毛米花树 ... 162	华中老鹤草 ... 103	华南冬青 401
刚毛莢蒾 609	华中櫻花 258	华南朴 365
刚毛扁担杆 ... 188	华中薔薇 262	华南吴茱萸 ... 439
曲江远志 76	华风车子 180	华南皂荚 288
曲折罗香草 ... 726	华凤仙 106	华南柯 355
曲枝槌果藤 ... 66	华毛茛 43	华南栲 348
回香草 729	华长蒴苣苔 ... 691	华南素馨 543
吊兰龙胆 647	华古柯 212	华南桐 360
吊丝排草 653	华东润楠 29	华南落新妇 ... 80
吊灯花 206	华北卫矛 407	华南紫树 481
吊杆泡 265	华四粉块藤 ... 571	华南橄欖 448
吊罗果 521	华瓜木 479	华钩藤 600
吊钟花 500	华冬青 401	华荆芥 730
吊钟黄 622	华白花阿生草 678	华核桃 475
早谷泡 266	华白粉藤 430	华桢楠 29
早谷莓 266	华西花楸 272	华素馨 545
衣吉利 299	华西金丝桃 ... 184	华胶藤 556
贞桐花 712	华西猴欢喜 ... 194	华润楠 29
虫蜡树 546	华杜仲藤 556	华桑寄生 414
	华丽杜鹃 503	华萝藦 569
	华赤脰散 94	华野百合 298
	华陀花 673	华清风藤 467
	华青莢叶 478	华密花豆 330
	华空木 273	华紫珠 707
华山小桔 441	华南山矾 534	华幌伞枫 488
华山矾 532	华南山胡椒 ... 24	华薔薇 261
华山葵 61	华南云实 284	全叶小柑 441
华千金子藤 ... 571	华南木姜 27	全叶芥 69
华千金藤 55	华南毛茛 148	全叶核实现 ... 220
华卫矛 406	华南升麻 80	全州八角枫 ... 479
华马钱 541	华南龙胆 648	全缘火棘 259
华木犀 549	华南玉带草 ... 659	全缘石楠 252
华木槿 207		
华中山柳 498		
华中老鸦糊 ... 706		

[/]

全缘叶紫珠 ... 707	多花指蒴草 ... 65	竹节三七 489
全缘羊蹄甲 ... 283	多花娃儿藤 ... 573	竹节树 182
全缘栾树 456	多花野牡丹 ... 176	竹节秋海棠 ... 138
全缘萼 729	多花假马齿苋 677	竹节海棠 138
合欢 277	多花蓬萊葛 ... 540	竹节蓼 88
合萌 292	多花蓼 92	竹叶木姜 28
合掌木 339	多体蕊黄檀 ... 302	竹叶青冈栎 ... 359
伞把树 477	多苞片悬钩子 267	竹叶柴胡 492
伞形科 491	多刺田菁 328	竹叶桐木 154
伞房紫金牛 ... 516	多枝桉 167	竹叶荷树 154
似小叶铁线莲 41	多枝兔儿风 ... 614	竹叶稠 359
似茄罗伞 520	多枝唐松草 ... 44	竹叶椒 446
似铁屎木 576	多环稠 363	竹叶榕 379
伏牛花 577	多齿短柄紫珠 706	竹叶楮 359
伊桐 125	多果榄仁 181	竹枝草 86
仿栗 194	多荚草 85	竹桔子 185
伤寒头 735	多脉山柳 499	竹筒蒿 632
多毛马齿苋 ... 87	多脉柃 151	血水草 63
多毛茜草树 ... 594	多脉榿木 450	血见愁 739
多叶勾儿茶 ... 419	多脉润楠 30	血见愁 316
多头花塔草 ... 721	多香木 241	血风藤 ... 317, 424
多头花楼梯草 386	多籽南五味子 9	血头果 8
多头蒿 617	多翅果 570	血色杜鹃 503
多花山竹子 ... 185	多裂叶芥 69	血苋 102
多花山矾 537	多裂瓜蒌 136	血桐 227
多花卫矛 408	多裂牯楼 136	血党 519
多花勾儿茶 ... 419	多裂黄檀 302	血胶树 513
多花长蒴苣苔 690	多蕊蛇菰 419	血藤 50, 320
多花可爱花 ... 701	多穗金粟兰 ... 62	向日葵 633
多花瓜馥木 ... 12	多穗稠 356	自扣草 43
多花泡花树 ... 465	多瓣蒲桃 171	白坑藤 543
多花茜木 592	竹节人参 489	朱红 343

朱红橘	435	羊角树	337	米花树	162
朱砂桔	435	羊角柴	502	米杠	291
朱砂根	517	羊角菜	69	米杠尚(壮音)	291
朱槿	206	羊角杜鹃	502	米饭花	510
朱橘	435	羊角藤	584	米良(壮音)	196
丢了棒	218	羊乳	656	米纸	198
乔木茵芋	443	羊屎木	534	米妙	161
杂木寄生	415	羊屎木	191	米层	453
杂种车轴草	331	羊屎果	118	米尾加	124
猫溜橙	66	羊桃	158	米杯(壮音)	477
年藤	566	羊麻	208	米拉藤	419
〔、〕		羊躑躅	505	米亨加	124
安石榴	110	羊蹄	96	米波	196
安石榴科	110	羊蹄	95	米浓液	381
安息香	529	羊蹄甲	283	米查	220
安息香科	525	羊蹄草	128, 628	米查能(壮音)	163
安徽杜鹃	502	羊蹄藤	281	米挣(壮音)	163
交让木	238	米丁怕(壮音)	162	米烂麻(壮音)	196
交让木	238	米子草	99	米哥	353
齐头绒	61	米子蓼	94	米宾宁(壮音)	216
齐头蒿	616	米中	360	米域	358
齐墩果	547	米勿友(壮音)	142	米念芭	103
羊刀尖	174	米丹弄(壮音)	196	米得洗	14
羊乌泡	267	米仙(壮音)	199	米炯	196
羊奶奶	158, 159	米瓜(壮音)	18	米家	220
	426	米仔兰	448	米碎叶	164
羊舌树	534	米过穴	294	米碎花	148
羊角豆	203	米达栋	110	米椿树	454
羊角扭	560	米亚律(壮音)	512	米稔怀	125
羊角拗	560	米老排	337	米新	198
		米多鸡	126	米槁(壮音)	18
		米弄	4	米楮	348

- 米噌草 305
- 江芒决明 287
- 江西肿瓣芹 ... 497
- 江西董菜 74
- 江苏安息香 ... 528
- 江南花楸 271
- 江南虎皮楠 ... 238
- 江南桤木 344
- 江南野海棠 ... 174
- 汗斑草 705
- 冲天子 317
- 冰片艾 620
- 壮叶乌饭树 ... 510
- 决明 287
- 灯台木 550
- 灯台树 477
- 灯盏花 106
- 灯盏菜 493
- 灯笼泡 666
- 灯笼草 ... 685, 711
- 灯笼树 500
- 灯笼椒 663
- 兴安莢蒾 609
- 兴安楠木 34
- 闭花 218
- 许树 712
- 〔一〕
- 红山梅 369
- 红千层 163
- 红子仔 608
- 红子仔 217
- 红马蹄草 494
- 红木 123
- 红木科 123
- 红天葵 138
- 红云草 519
- 红车 169, 171
- 红车轴草 331
- 红毛羊蹄甲 ... 283
- 红毛毡 519
- 红乌柏 235
- 红叶 138
- 红叶老枪谷 ... 100
- 红叶树 118
- 红叶哥纳香 ... 13
- 红叶藤 474
- 红皮 530
- 红冬菰 418
- 红半边莲 137
- 红丝线 702
- 红曲根 651
- 红色对叶榕 ... 375
- 红血藤 330
- 红灯笼 711
- 红米菜 99
- 红豆树 322
- 红花 624
- 红花八角 7
- 红花大油茶 ... 145
- 红花木 127
- 红花木 338
- 红花木莲 4
- 红花丹 653
- 红花龙胆 648
- 红花羊蹄甲 ... 281
- 红花羊蹄甲 ... 283
- 红花鸡距草 ... 65
- 红花夜来香 ... 663
- 红花油茶 145
- 红花参 204
- 红花草 294
- 红花点草 388
- 红花桐 338
- 红花洋素馨 ... 663
- 红花荷树 7
- 红花倒水莲 ... 695
- 红花酢浆草 ... 105
- 红花蛇不过 ... 94
- 红花紫荆 283
- 红花楸 288
- 红刨楠 26
- 红芽大戟 581
- 红杜仲藤 557
- 红条紫草 661
- 红纹凤仙 107
- 红苞木 338
- 红苞悬钩子 ... 269
- 红枣 424
- 红果山胡椒 ... 22
- 红果子 167
- 红果钓樟 22
- 红果树 274
- 红果黄肉楠 ... 15
- 红果萝芙木 ... 559

- 红果楠 15
 红岩杜鹃 504
 红鱼眼 234
 红泡刺 269
 红线紫珠 707
 红草 99
 红茸毛羊蹄甲 281
 红荆芥 723
 红树科 182
 红背山麻杆 ... 213
 红背叶 ... 237, 628
 红背草 703
 红背桂 223
 红背娘 213
 红背菜 632
 红背蓝 76
 红蚂蟥七 690
 红脉麦果 422
 红脉南烛 502
 红莲 89
 红茴香 7
 红桦树 344
 红盐菜 97
 红胶木 172
 红梅花 256
 红桑 212
 红萝卜 494
 红桫 449
 红桫木 449
 红雀珊瑚 233
 红雀梅藤 424
 红淡 146
 红润楠 31
 红旋蒴苣苔 ... 688
 红绿草 99
 红棉 202
 红敷地发 179
 红葡萄藤 430
 红帽顶 213
 红掌草 308
 红紫珠 709
 红紫麻 388
 红喉崩 557
 红锥 350
 红蓝 703
 红楠 31
 红椴栲 350
 红椴 142
 红椴子 350
 红椴栲 350
 红楝 453
 红楝子 453
 红雾水藤 671
 红滩杜鹃 503
 红辣蓼 88
 红韧钩 264
 红算盘子 223
 红碧桃 257
 红薯 672
 红藤 ... 50, 307, 424
 红藤菜 102
 红椴 350
 红鳞蒲桃 169
 纤花耳草 589
 纤花狗牙花 ... 554
 纤花金盆 132
 纤序鼠李 423
 纤尾桃叶珊瑚 477
 纤枝槌果藤 ... 67
 纤细半蒴苣苔 692
 纤细雀梅藤 ... 423
 纤冠藤 566
 纤脉桫 165
 纤弱桑勒草 ... 179
 异毛金竹草 ... 701
 异叶山绿豆 ... 306
 异叶石龙尾 ... 680
 异叶节节菜 ... 109
 异叶花椒 445
 异叶败酱 610
 异叶泽兰 630
 异叶珍珠菜 ... 650
 异叶翅子树 ... 198
 异叶黄鹌菜 ... 646
 异叶紫云菜 ... 705
 异叶链荚豆 ... 292
 异叶榕 375
 异形木 172
 异形玉叶金花 584
 异形蒿 615
 异果山绿豆 ... 306
 异果崖豆藤 ... 316
 异药苣苔 688
 异型榕 375
 异冠毛菊 620
 异株木犀榄 ... 549

异裂菊	634	两广耳挖草 ...	737	豆麻	387
异萼粗毛藤 ...	218	两广吊石苣苔	692	豆腐木	715
阴生毛冬青 ...	401	两广杜仲藤 ...	557	豆腐菜	102
阴阳枫	485	两广直管花 ...	731	豆腐渣	468
阴阳莲	89	两广围涎树 ...	280	豆薯	323
阴行草	684	两广虎皮楠 ...	239	豆瓣草	114
阴香	18	两广泡花树 ...	466	豆瓣草科	113
阳桃	104	两广倒吊笔 ...	561	(小二仙草科)	
阳朔假野芝麻	724	两广梭罗树 ...	200	豆瓣菜	59
防已	53	两广悬钩子 ...	270	豆瓣菜	71
防已马兜铃 ...	57	两广野桐	229	丽春花	64
防已叶清风藤	466	两广猕猴桃 ...	160	赤才	455
防已科	50	两广清风藤 ...	467	赤小豆	324
防风草	720	两广粗叶木 ...	582	赤车	389
那大紫玉盘 ...	14	两广润楠	30	赤兰	169
那藤	49	两广紫金牛 ...	518	赤兰蒲桃	169
羽叶金合欢 ...	276	两广紫荆	288	赤豆	323
羽叶黄檀	302	两广紫苑	619	赤苍藤	412
羽叶楸	697	两广猴耳环 ...	280	赤果鱼木	67
羽裂横蒴苣苔	695	两广葵	60	赤柯	348
观音草	648	两广桐	363	赤胫散	94
如意草	714	两广赖桐	711	赤桉	164
七 笔		两广锦香草 ...	178	赤楠	470
〔一〕		两广樱桃	255	赤楠蒲桃	168
		两广横蒴苣苔	695	赤褐珍珠菜 ...	653
		两色紫金牛 ...	516	走马天风	710
		两色槭	459	走马胎	518
		两面针	446	走茎黄连	42
		豆角	333	麦卡吐	557
		豆翁树	192	麦豆藤	333
		豆豉姜	26	麦果	211
		豆梨	259		
弄七	125				
两广小花藤 ...	556				
两广千金子藤	571				
两广牛奶藤 ...	569				
两广长蒴苣苔	689				
两广耳草	588				

壳斗科	346	花皮胶藤	553	芒麻	383
壳菜果	337	花边灯盏	495	芦莉草	704
来江藤	677	花防已	52	苏木	285
远志	77	花红茶	249	苏木科	281
远志科	75	花坪杜鹃	503	苏合香	337
还亮草	42	花点草	388	芭西	172
连江寄生	415	花 葱 科	659	苡芭菊	628
连明子	96	(翠梅科)		杏	255
连珠豆	319	花菱草	64	杏叶沙参	655
连钱草	44, 725	花梨木	321	杏香兔儿风	613
连翘	542	花椒	444	李	258
连蕊藤	53	花椒鞑	445	杜仲	339
芫花叶白前	564	花椰菜	70	杜仲科	339
芫荽	493	花桐木	321	杜仲藤	557
芫荽菊	626	花碧桃	257	杜英	191
芸苔	68	芥兰	68	杜英	193
芸香	443	芥蓝	68	杜 英 科	191
茺菁	70	芥蓝头	68	(胆八树科)	
芙蓉木槿	207	芥菜	69	杜茎山	523
芙蓉花	206	芬芳安息香	530	杜鹃花	507
芙蓉麻	203	苍山杜鹃	503	杜鹃花科	499
莛莢菜	642	苍叶红豆	323	杉木鞘花寄生	414
莛	100	苍白秤钩风	52	杧果	471
莛科	98	苍耳	646	杨柳科	341
莛菜	100	苍耳七	81	杨枏	610
花木通	41	苍蝇花	85	杨桐	141
花心藤	412	葶谷草	638	杨梅	343
花叶八角莲	47	芹叶铁线莲	38	杨梅科	343
花叶细辛	58	芹菜	492	杨梅蚊母树	336
花叶假杜鹃	700	芡	45	扶芳藤	406
花生	293	芡叶菱	59	扶桑	206
				扶绿柯	353

秀丽鼠刺 239	沙叶毛柱铁线莲 41	怀庆地黄 683
秀柱花 336		
秃毛冬青 400	沙皮树 370	
秃叶黄皮树 ... 442	沙朴 366	鸡儿肠 619
秃尖尾枫 708	沙虫药 ... 677, 730	鸡爪三七 79
秃红紫珠 710	沙先茶 275	鸡爪子 420
延平桐 359	沙苋菜 97	鸡爪风 11
延叶茜草 596	沙针 418	鸡爪莲 420
延叶珍珠菜 ... 651	沙纸树 370	鸡爪根 254
延叶鳞蕊藤 ... 674	沙药草 710	鸡爪筋 595
近邻豆腐木 ... 714	沙葛 323	鸡公尾 539
近穗状冠唇花 729	沙椶子 449	鸡仔木 575
角叶槭 463	沙塘香草 97	鸡仔茶 141
角刺栲 347	沙滩子 89	鸡仔树 75
角菜 98	沙濂木 215	鸡矢果 167
皂合欢 279	没药树 448	鸡矢藤 591
皂角 289	沟厚(壮音) ... 18	鸡皮果 438
皂荚 289	沟繁缕科 83	鸡头筋 225
皂帽花 11	沉香 114	鸡头薯 310
刨花树 15	庐山石楠 254	鸡头藤 557
刨花润楠 30	庐山冬青 403	鸡肉菜 86
钉茄 669	庐山芙蓉 207	鸡肉菜 684
条隆胶树 381	庐山厚朴 1	鸡血藤 320
利黄藤 471	庐山香科 739	鸡血藤 318
牡蒿 616	庐山椴 189	鸡肠风 583
	庐山鼠李 423	鸡卵果 275
	庐山馒头果 ... 225	鸡肾果 468
	庐山算盘子 ... 225	鸡冠子 201
	鹿古猪屎豆 ... 299	鸡冠花 101
	应春花 2	鸡骨草 291
	诃子 181	鸡骨草 700
	补骨脂 325	鸡骨香 219

〔、〕

〔一〕

鸡骨香.....26,544	尾叶崖爬藤...431	陀螺桐.....361
630	尾叶猕猴桃...160	扭子花.....561
鸡骨柴.....723	尾叶黑面叶...217	纸叶琼楠.....17
鸡骨常山.....551	尾叶黑面神...217	纸叶榕.....373
鸡屎木.....441	尾叶紫薇.....107	纸浆木.....400
鸡屎泡.....715	尾叶槌果藤...66	纳搞润楠.....30
鸡桑.....381	尾叶榕.....375	
鸡眼子.....292	灵山百灵藤...567	
鸡眼草.....314	灵川钻地风...246	
鸡眼草.....212	灵川润楠.....30	
鸡眼藤.....584	灵川桐.....361	
鸡脚桑.....381	灵香草.....651	
鸡麻.....261	忍冬.....604	
鸡蛋花.....557	忍冬科.....603	
鸡蛋果.....128	君迁子.....512	
鸡榕.....371	驱蚊树.....26	
鸡嘴椒.....663	驴尾草.....539	
鸡嘴籐.....285	驳骨九节.....593	
尾叶山茶.....142	驳骨松.....364	
尾叶山胡椒...21	驳骨丹.....702	
尾叶马槟榔...66	驳骨丹.....538	
尾叶木蓝.....312	驳骨草.....593	
尾叶水锥栲...349	驳骨醉鱼草...538	
尾叶乌饭树...509	阿丁枫.....335	
尾叶耳草.....587	阿拉伯乳香树447	
尾叶远志.....75	阿婆伞.....488	
尾叶钓樟.....21	阿婆胶.....15	
尾叶香楠.....594	陆地棉.....205	
尾叶美丽山胡椒	陆英.....605	
.....24	附子.....36	
尾叶美丽钓樟24	附地菜.....662	
尾叶铁线莲...41	陀螺果.....527	

八 笔

〔一〕

青山安息香...529
青凡木.....216
青木香.....56
青牛胆.....56
青冈栎.....360
青冈栎寄生...417
青皮木.....413
青皮木科.....412
青皮茶.....155
青皮香.....397
青皮柴.....103
青皮槭.....461
青兰木.....124
青江藤.....403
青豆藤.....555
青杨梅.....343
青芷麻.....383
青果.....181
青果榕.....380
青鱼胆.....719
青莢叶.....479
青茶冬青.....397

青栲	362	苦苣苔科	687	茅瓜	133
青铁果	405	苦李根	422	茅栗	346
青钱柳	475	苦李莢	422	茅莓	268
青菜	68	苦坛子	317	茅膏菜	82
青蛇丹	93	苦茄	667	茅膏菜科	82
青蛇藤	570	苦枊木	542	茄	668
青麻	383	苦罗豆	300	茄科	662
青桐	362	苦参	329	茎花防已	52
青栳	101	苦树	447	茎花崖爬藤	431
青葵	59	苦柚木	449	苹果	249
青齒木	252	苦胆木	447	苹婆	201
青蛤蟆	461	苦荚	642	茉莉花	544
青蒿	615	苦荚菜	642	茉莉茜	199
青蓝木	78	苦荞麦	95	茉莉藤	675
青莖菜	72	苦桑子	447	苞叶藤	671
青榨木	575	苦桃树	258	苞壳菊	643
青榨槭	461	苦梓	4	英国梧桐	341
青箭	700	苦梓	6	英雄草	684
青篙柴	103	苦菜	634	苜蓿	316
青檀	367	苦患树	457	莧萝	676
青藤	50	苦登茶	398	松风草	435
青藤公	374	苦楝	451	松叶耳草	589
青藤仔	544	苦辣树	416	松叶牡丹	87
青藤科	35	苦檻蓝	705	松寄生	414
苦木科	447	苦檻蓝科	705	松筋藤	56,83
苦叶菜	539	苦槠	351	松蒿	683
苦瓜	134	苦蕒	666	松鳞蕨	424
苦瓜藤通	41	苗山小蕨	46	枫叶	708
苦玄参	683	苗山毛冬青	395	枫杨	476
苦舌草	714	苗山长蒴苣苔	690	枫树	337
苦灯笼	711	苗山冬青	395	枫树寄生	414
苦芥	69	苗山槭	462	枫香	337

枫桦桂	485	拉拉藤	578	刺蒺藜	190
枫鞘花寄生 ...	414	抽筋菜	83	刺蓼	94
杯叶西番莲 ...	128	拖鞋花	233	刺槐	327
杯叶转心莲 ...	128	拔毒散	209	刺蒺藜悬钩子 ...	268
杯苋	101	刺毛柏拉木 ...	173	刺篱木	124
杯花凤仙	106	刺毛野锦香 ...	173	刺糖果	262
杯果	354	刺毛黎豆	320	软水蓼	91
杯果栲	347	刺叶冬青	397	软兔儿风	613
杯菊	626	刺叶铁仔	524	软荚红豆	323
枝子	579	刺叶榕木	483	转心莲	128
枝花木奶果 ...	216	刺苋	100	转心莲科 ...	128
枝花李榄	547	刺莞荑	494	(西番莲科)	
杭子梢	295	刺壳椒	445	转枝莲	128
杷叶山矾	532	刺茄	669	轮叶木姜	28
枕头子	287	刺茎榕木	483	轮叶牛皮消 ...	565
枸花山矾	533	刺果卫矛	409	轮叶沙参	655
枸树	370	刺果牛皮消 ...	564	轮环藤	51
批杷	248	刺果苏木	284	轮冠木	662
板栗	346	刺果紫玉蚕 ...	14	斩蛇剑	78
板蓝根	699	刺果锥栗	347	欧地瓜儿苗 ...	727
枚拉(壮音) ...	169	刺果藤	195	欧接骨木	605
枚辣叶肉实 ...	515	刺鱼骨木	576	欧筋骨草	720
枚辣柿	512	刺籽鱼木	68	顶花艾麻	387
拦山虎	431	刺桐	310	顶序山龙眼 ...	119
披针叶乌口树	598	刺鸭脚	484	顶序绣球防风	727
披针叶铃	149	刺桑	381	玫瑰	263
披针叶南五味子	8	刺黄连	46	玫瑰茄	206
披针叶珍珠菜	652	刺梨	263	坡油菜	197
披针叶粗叶木	582	刺萼假糙苏 ...	733	坡油麻	197
披针叶紫珠 ...	708	刺茴	252	坡柳	454
拍岭葛	671	刺茴	126	坡荔枝	237
拐枣	420	刺楸	488	枣	424

- 枣皮 477
直生刀豆 295
直刺山芹菜 ... 497
直脉榕 377
奇异珍珠菜 ... 652
奇形绣球 242
奇蒿 615
武鸣杜鹃 507
武陵槭 464
- [1]
- 罗汉果 134
罗伞树 520
罗壳木 464
罗志藤 68
罗甸香花藤 ... 550
罗甸纤细假糙苏
..... 731
罗定白桐 230
罗城石楠 252
罗城白桐 230
罗星草 647
罗城假糙苏 ... 732
罗晃子 291
罗浮冬青 398
罗浮杜鹃 504
罗浮泡花树 ... 464
罗浮柿 512
罗浮栲 349
罗浮粗叶木 ... 581
罗浮槭 461
罗勒 729
- 罗盖叶 608
罗盖荚蒾 608
罗裙子 9
肾叶天胡荽 ... 495
肾茶 721
齿叶枫桐桂 ... 486
齿叶岭南槭 ... 463
齿叶泥花草 ... 679
齿叶烂泥树 ... 491
齿叶铁线莲 ... 40
齿叶黄皮 437
齿叶崖爬藤 ... 432
齿叶船柄茶 ... 154
齿叶锈毛石斑木
..... 260
齿叶荛桐 711
齿叶樱汁石楠 253
齿苞绣线梅 ... 250
虎皮楠 238
虎皮楠科 ... 238
(交让木科)
虎耳草 81
虎耳草科 80
虎灯笼 454
虎杖 89
虎刺 577
虎泡 270
虎崖豆藤 319
虎掌牵牛 674
明立花 524
明萼草 704
昆明山海棠 ... 410
昆明鸡血藤 ... 318
- 昂天莲 195
昙花 139
昌感秋海棠 ... 137
非洲菊 631
非洲棉 205
岭南山竹子 ... 186
岭南山茉莉 ... 527
岭南木瓜红 ... 527
岭南石栎 353
岭南杜鹃 505
岭南花椒 444
岭南青冈栎 ... 359
岭南柯 353
岭南柿 513
岭南倒捻子 ... 186
岭南稠 359
岭南酸枣 469
岭南槭 463
岷江鹅耳枥 ... 345
岩水蕨衣 702
岩生远志 77
岩杜鹃 504
岩柃 151
岩茶 145
果盒子 224
咖啡 577
咖啡黄葵 203
咖啡葵 203
咀签 420
败酱 611
败酱科 610
具盖母草 681

〔ノ〕		金鸡纳 577	金缕梅 336
金不换 55	金英草 64	金缕梅科 335	金腺荚蒾 606
金山蒲桃 171	金果瓜馥木 ... 11	金锦香 177	金腰箭 643
金千里光 640	金果榄 56	金缨子 262	金橘 440
金毛冬青 396	金虎尾科 210	钩丝红 211	念珠藤 551
金毛柯 354	金鱼草 677	念珠藤叶紫金牛 516
金凤花 285	金鱼藻 45	佩兰 630, 651	
金心大叶黄杨 407	金鱼藻科 45	侧耳根 61	
金心卫矛 407	金狗胆 56	使君子 181	
金甲豆 324	金线吊乌龟 ... 54	使君子科 180	
金叶细枝柃 ... 150	金线吊芙蓉 ... 81	肥儿草 76	
金叶柃 147	金线风 51	肥牛树 232	
金叶树 513	金线草 95	肥牛草 690	
金瓜 131	金柑 440	肥皂荚 289	
金瓜核藤 566	金挖耳 623	肥荚红豆 321	
金丝花 567	金盆 131	肥猪树 370	
金丝李 186	金钮扣 643	胀果木五加 ... 486	
金丝苦楝藤 ... 454	金香炉 177	周毛悬钩子 ... 263	
金丝桃 183	金莲木 162	爬山虎 430	
金丝桃科 183	金莲木科 162	爬行卫矛 406	
金丝梅 184	金莲花 106	爬岩香 60	
金丝蝴蝶 183	金莲花科 106	爬墙虎 406	
金边桑 213	金盏花 623	爬藤榕 376	
金耳环 58	金盏藤 40	鱼木 68	
金光菊 639	金钱草 308	鱼花草 613	
金合欢 276	金钱豹 655	鱼尾菊 646	
金花树 173	金银花 604	鱼泡菜 112	
金花草 204	金银莲花 649		
金花茶 156	金粟兰 63		
金花猕猴桃 ... 161	金粟兰科 62		
金龟莲 131	金萼杜鹃 503		
	金锁匙 51		

鱼草	613	垂茉莉	713	宜昌橙	436
鱼骨木	182	垂果榕	378	空心花	523
鱼骨柴	337	垂柳	342	空心菜	672
鱼黄草	675	垂盆草	80	空筒菜	637
鱼眼草	626	垂珠花	528	实心崖豆藤	318
鱼腥草	61	垂叶榕	372	宛田红花油茶	145
鱼藤草	495	垂绿柳	342	变叶木	218
狗牙木	183	乳汁藤	557	变叶榕	380
狗牙花	554			变色杜鹃	507
狗仔菜	644			变红美莲	607
狗奶柴	528			变秃安息香	528
狗耳蕨	624			夜关门	314
狗舌果	217			夜合花	1
狗舌草	659			夜来香	664
狗舌草	640			夜来香	113
狗芽茶	183			夜香木兰	1
狗肝菜	701			夜香牛	644
狗角藤	211			夜香花	572
狗尾虫	661			夜偏头草	721
狗尾红	212			夜笠草	287
狗骨木	477			京梨	158
狗骨柴	598			盲眼果	457
狗骨蕨	434			泽八绣球	244
狗贴耳	61			泽兰	629
狗桔	434			泽兰	727
狗笠耳	61			泽珍珠菜	650
狗脚迹	210			泽漆	221
狗筋蔓	83			河白草	93
狗癫木	554			泪木	501
狐狸尾	332			油甘子	233
垂杨柳	342			油叶柯	356
垂枝柳	342			油瓜	132

〔、〕

单刀根	289
单子南蛇藤	404
单子藤	404
单叶红豆	323
单叶泽兰	629
单叶钩长蒴苣苔	690
单叶拿身草	309
单叶酒饼勒	435
单叶蔓荆	718
单叶藤桔	442
单耳伶	153
单果阿芳	10
单籽崖爬藤	431
单雄蕊败酱	610
宝巾	117
宝炉木	218
宝塔草	710
宝塔菜	721
宜山石楠	251
宜昌娃儿藤	573
宜昌铁线莲	40

- 油芦子 226
 油柿 512
 油茶 144
 油茶寄生 415
 油点草 388
 油桐 213
 油桐寄生 416
 油菜 68
 油患子 457
 油梨 34
 油渣果 132
 油橄榄 547
 泡叶柯 355
 泡花 30
 泡花树叶桐 362
 泡花楠 30
 泡吹叶花楸 272
 泡桐 682
 泡麟蒲桃 170
 波叶桤木 484
 波形素馨 542
 波利亚草 576
 波状叶山蚂蝗 308
 波斯菊 626
 波缘山矾 537
 波缘艾纳香 622
 波缘冬青 395
 泥花草 678
 泥胡菜 633
 泥鳅草 651
 法国梧桐 341
 浅圆齿堇菜 74
 浅裂长蒴苣苔 691
 泌脂藤 471
 析艾 616
 闹头花 505
 闹羊花 505, 664
 卷花丹 179
 郎陆 708
 怕拉马按 165
 [一]
 细小紫金牛 520
 细子龙 453
 细毛山矾 536
 细叶十大功劳 48
 细叶水苋 107
 细叶艾 617
 细叶石榕 374
 细叶冬青 403
 细叶谷木 176
 细叶沙参 656
 细叶苦菜 635
 细叶青栎 362
 细叶青葵藤 60
 细叶青藤 571
 细叶变叶木 219
 细叶泥花草 679
 细叶莽苧 730
 细叶香茶菜 735
 细叶洒金榕 219
 细叶桉 167
 细叶黄皮 438
 细叶野花生 308
 细叶野牡丹 175
 细叶银花 603
 细叶鼠李 422
 细叶鼠麴草 632
 细叶榕 376
 细叶楷木 472
 细白艾 614
 细红藤 53
 细花丁香蓼 112
 细花杜鹃 505
 细花莴苣 635
 细青七树 216
 细青漆木 236
 细刺毛蓼 88
 细枝铃 149
 细枝栲 347
 细枝蚬壳草 83
 细枝鹅耳枥 346
 细齿叶柃木 150
 细齿吊钟 500
 细齿金盏藤 40
 细齿锥花 725
 细罗伞 520
 细果猴欢喜 194
 细柱五加 481
 细柄五月茶 214
 细柄水苏 738
 细柄百两金 517
 细柄杨桐 141
 细柄豆腐木 714
 细柄络石 561
 细柄黄叶五加 481

细柄假卫矛 ... 409
 细柄猴欢喜 ... 194
 细轴堇花 ... 116
 细样黄瓜草 ... 651
 细圆齿火棘 ... 259
 细圆藤 ... 53
 细皱香薷 ... 724
 细烟筒子 ... 267
 细弱掌叶树 ... 484
 细梗木五加 ... 486
 细梗胡枝子 ... 315
 细梗密束花 ... 334
 细萼海桐 ... 122
 细蒴苣苔 ... 694
 细蕊木兰 ... 1
 细穗爵床 ... 702
 线叶龙胆 ... 648
 线叶铃 ... 149
 线叶猪屎豆 ... 299
 线叶常绿忍冬 ... 605
 线条楼梯草 ... 386
 线状紫金牛 ... 518
 线纹香茶菜 ... 734
 线枝蒲桃 ... 168
 线齿木 ... 162
 筠叶海桐 ... 121
 虱子草 ... 111
 屈头鸡 ... 66
 屈草 ... 93
 降龙草 ... 692
 降香黄檀 ... 301
 降香藤 ... 12

降真香 ... 434
 帚状鼠李 ... 423
 弧脉核实 ... 220
 建楠 ... 30

九 笔

〔一〕

面条树 ... 550
 厚叶八角 ... 7
 厚叶山矾 ... 533
 厚叶乌饭树 ... 510
 厚叶石楠 ... 251
 厚叶红淡 ... 146
 厚叶茜草树 ... 594
 厚叶素馨 ... 544
 厚叶铁线莲 ... 39
 厚叶梅花草 ... 81
 厚叶崖爬藤 ... 432
 厚叶猕猴桃 ... 160
 厚叶琼楠 ... 17
 厚叶槲木 ... 483
 厚叶鼠刺 ... 240
 厚叶酸藤子 ... 522
 厚叶算盘子 ... 224
 厚皮树 ... 470
 厚皮树 ... 500
 厚皮香 ... 155
 厚皮槲 ... 215
 厚朴 ... 2
 厚壳树 ... 661
 厚壳桂 ... 20

厚果鸡血藤 ... 317
 厚果崖豆藤 ... 317
 厚轴堇花 ... 116
 厚藤 ... 674
 厚萼凌霄 ... 695
 歪冠苣苔 ... 694
 咸沙木 ... 697
 咸虾花 ... 645
 咸虾花 ... 644
 威灵仙 ... 39
 南大戟 ... 221
 南山茶 ... 145
 南山楂 ... 247
 南川绣球 ... 244
 南弓果藤 ... 572
 南天仙子 ... 702
 南天竹 ... 48
 南长蒴苣苔 ... 689
 南方硷蓬 ... 98
 南石萝藦 ... 570
 南瓜 ... 131
 南瓜子金 ... 565
 南宁红豆 ... 322
 南宁红锥 ... 351
 南宁虎皮楠 ... 239
 南宁冬青 ... 399
 南宁栲 ... 347
 南老鹳草 ... 103
 南华木 ... 458
 南华木科 ... 458
 南华杜鹃 ... 507
 南赤楠蒲桃 ... 168

南板蓝根	699	毒根斑鸠菊 ...	643	茶叶	146
南岭山矾	533	毒鼠子科	274	茶花	143
南岭虎皮楠 ...	238	革叶七叶树 ...	458	茶条山矾	534
南岭柞木	126	革叶冬青	394	茶条木	454
南岭堇花	116	革叶猕猴桃 ...	159	茶条果	534
南岭栲	350	革叶蓼	89	茶油树	144
南岭黄檀	300	革叶槭	460	茶茱萸科	411
南岭紫菀	619	革命菜	632	茶科	140
南岭棟树	451	茜木	592	茶胶树	15
南苜蓿	315	茜草	595	茶海棠	249
南胡颓子	425	茜草科	574	茶梅	145
南洋紫珠	705	荆芥	736	茶辣	439
南洋蒲桃	171	莢蒾	607	茶辣	440
南洋楹	277	茸毛木蓝	313	茯苓菜	626
南屏柁	362	茸毛柏拉木 ...	173	荞麦	90
南桦	344	茸毛胡枝子 ...	315	荞麦七	90
南柴胡	493	茸莢红豆	322	茶	114
南柴胡	492	草本一品红 ...	221	莽	70
南烛	501	草乌	36	莽芋	730
南蛇根	410	草龙	112	荠菜	70
南蛇簕	284	草地柳	343	萱	75
南蛇藤	404	草决明	287	茹菜	71
南紫薇	108	草珊瑚	63	荨麻叶母草 ...	681
南醋栗	241	草棉	205	荨麻叶螳螂菊	645
南薄荷	734	草葡萄	426	荨麻科	382
南鞘蕊花	722	茼蒿	625	荔枝	456
牵牛	673	茵芋	443	荔枝草	632
牵根草	332	茵陈草	684	荔枝菊	630
春云实	285	茵陈蒿	616	荔枝藤 ...	303, 474
春头草	8	茵芹美花草 ...	37	荭草	93
春花木	260	茴香	494	药乌檀	586
毒瓜	131	茶	146	药用狗牙花 ...	554

药用萝芙木 … 559	柳叶冬青 …… 401	树梅 …… 343
柘树 …… 371	柳叶虎皮楠 … 239	树棉 …… 205
柘藤 …… 371	柳叶茶 …… 145	树紫珠 …… 705
柄果木 …… 456	柳叶香楠 …… 595	指天椒 …… 663
柄果海桐 …… 122	柳叶桉 …… 166	指甲花 … 106, 108
柑 …… 437	柳叶菜 …… 112	指叶紫堇 …… 65
柑桔科 …… 434	柳叶菜科 …… 111	珍珠兰 …… 63
(芸香科)	柳叶润楠 …… 31	珍珠枫 …… 706
柑橄果 …… 191	柳叶斑鸠菊 … 644	珍珠香青 …… 614
柚 …… 435	柳叶蓼 …… 92	珍珠栗 …… 346
柚木 …… 716	柳枝山柑 …… 67	珍珠梅 …… 272
枳 …… 442	柳桉 …… 166	珍珠菜 …… 650
枳壳 …… 442	柳楠 …… 31	珍珠盖罗伞 … 517
枳椇 …… 420	柳辣草 …… 91	玻利维亚古柯 211
相思藤 …… 292	柿 …… 511	玻璃生菜 …… 636
栎 …… 358	柿叶木姜 …… 27	珊瑚树 …… 608
栎叶掌叶树 … 485	柿科 …… 511	珊瑚藤 …… 87
桉叶石笔木 … 157	柿寄生 …… 416	鸦片 …… 64
桉叶油茶 …… 143	柱头草 …… 634	鸦胆子 …… 447
枸杞 …… 665	柱果桐 …… 364	砍头树 …… 291
枸杞菜 …… 665	柱穗桦 …… 344	残虫草 …… 222
枸骨 …… 395	柠檬 …… 436	胡瓜 …… 130
枸桔 …… 442	柠檬 …… 436	胡枝子 …… 314
枸橼 …… 436	柠檬香咸草 … 492	胡桃 …… 475
柞木 …… 126	柠檬桉 …… 164	胡桃科 …… 474
柏拉木 …… 173	柠檬清风藤 … 467	胡萝卜 …… 494
梔子 …… 579	怪柳 …… 128	胡麻 …… 698
梔子花 …… 579	怪柳科 …… 128	胡麻草 …… 678
梔花素馨 …… 543	怪麻 …… 299	胡麻斜蒴苣苔 692
柳 …… 342	树兰 …… 448	胡椒 …… 60
柳叶天料木 … 127	树枝草 …… 79	胡椒科 …… 59
柳叶牛膝 …… 99	树胶桉 …… 166	胡椒蒴 …… 446

胡颓子科 425
胡蔓藤 540
轻木 202

〔 1 〕

点地梅 649
显苞齐墩果 ... 549
显脉山绿豆 ... 307
显脉木犀 549
显脉乌饭树 ... 510
显脉泡花树 ... 464
显脉掌叶树 ... 485
显脉新木姜 ... 33
显脉榕 ... 376
星毛冠盖藤 ... 245
星色草 85
星花木五加 ... 487
星状山矾 537
星宿草 651
思茅酒饼霸 ... 434
思茅黄檀 302
思茅猴欢喜 ... 195
思茅蒲桃 171
思茅臀形果 ... 259
贵州山柳 498
贵州山橙 556
贵州木瓜红 ... 528
贵州毛柃 149
贵州玉叶金花 585
贵州石栎 355
贵州布荆 717
贵州杜鹃 506

贵州远志 76
贵州吴茱萸 ... 440
贵州青藤 35
贵州泡花树 ... 465
贵州盾翅藤 ... 211
贵州娃儿藤 ... 573
贵州络石 560
贵州素馨 545
贵州栎木 477
贵州猴欢喜 ... 195
贵州鼠李 422
贵州榕 379
省沽油科 468
骨齿山矾 535
临桂绣球 243
响叶杨 341
响铃豆 297
咳嗽草 319
咪枢 185
咪蚬 186
映山红 ... 155, 507
映桦子 344
昭平山茶 143
贴生鼠麴草 ... 631
贴梗海棠 246
虹石竹 84
虾子花 110
虾公木 217
虾须草 311
虾钳草 620
虾钳菜 99
虾勒眼 150

蚂蚁树 335
蚂蚱菜 590
蚂蟥七 690

〔 2 〕

重阳木 216
重楼排草 652
重瓣狗牙花 ... 554
香木莲 6
香艾 620
香叶 104
香叶树 22
香瓜 130
香白芷 492
香丝草 629
香合欢 278
香豆 324
香芙木 413
香花木 6
香花崖豆藤 ... 316
香花楠 6
香花藤 550
香荒荜 494
香青皮木 413
香苹婆 200
香果新木姜 ... 32
香果树 578
香茶菜 734
香茹 631
香草 651, 738
香独活 492
香秋海棠 138

香信木	191	盾叶木	227	保亭秋海棠 ...	138
香桂子	18	盾叶唐松草 ...	44	保亭槲果藤 ...	66
香圆	436	盾状冷水花 ...	390	待霄草	113
香铁线莲	38	盾果草	662	钝叶白鹤藤 ...	670
香粉叶	24	盾翅果	210	钝叶沙参	654
香椒	663	盾鳞风车子 ...	180	钝叶黄檀	301
香椒子	446	食用短梗藤 ...	562	钝叶崖爬藤 ...	432
香港木兰	1	盆上芫荽	495	钝叶樟	19
香港四照花 ...	478	盆状谷木	176	钝齿华青荚叶	479
香港瓜馥木 ...	13	鬼羽箭	678	钝齿红紫珠 ...	710
香港厚壳桂 ...	21	鬼画符	216	钝齿芹叶铁线莲	
香港桤木	450	鬼针草	620	38
香港猴欢喜 ...	194	匍茎榕	378	钝齿银钟树 ...	526
香港楠木	29	兔儿伞	622	钟刺草	701
香港蓬菜葛 ...	540	兔尾草	332	钟萼草	680
香港新木姜 ...	32	急性子	106	钩虫草	97
香港算盘子 ...	224	急解索	657	钩交刺	421
香港鹰爪	10	科尚(壮音) ...	291	钩状长蒴苣苔	690
香槐	297	秋分草	638	钩柄狐狸尾 ...	332
香楠	594	秋枫	216	钩栗	352
香椿	452	秋茄树	182	钩粉草	703
香蒲桃	171	秋海棠	137	钩雀梅藤	423
香蓼	95	秋海棠科	137	钩藤	599
香蕉草	389	秋葵	203	钮子瓜	133
香糊楠	5	秋鼠麴草	631	钮扣子	664
香櫟	436	信宜石柯	356	饶平石楠	253
香薷	723	信宜杜茎山 ...	523	矩圆果木瓜红	528
香藤风	12	信宜杜鹃	503	须药藤	571
复叶苹婆	201	信宜豆腐木 ...	716	狭叶山胡椒 ...	21
复叶葡萄	433	信宜念珠藤 ...	552	狭叶山香圆 ...	469
复耳金果榄 ...	55	信宜娃儿藤 ...	573	狭叶山黄麻 ...	392
复序利末花 ...	200	信宜润楠	31		

- 狭叶卫矛 406
 狭叶木犀 548
 狭叶木犀榄 ... 547
 狭叶车轮梅 ... 261
 狭叶月桂山矾 535
 狭叶牛皮消 ... 565
 狭叶石楠 254
 狭叶四照花 ... 478
 狭叶母草 680
 狭叶红紫珠 ... 709
 狭叶杜英 192
 狭叶崖豆藤 ... 318
 狭叶韩信草 ... 736
 狭叶败酱 610
 狭叶泡花树 ... 464
 狭叶柯 353
 狭叶柄果海桐 123
 狭叶茜草 596
 狭叶香港楠 ... 29
 狭叶柴胡 493
 狭叶倒提壶 ... 660
 狭叶绣花针 ... 577
 狭叶绣线菊 ... 272
 狭叶菜豆 324
 狭叶梔子 580
 狭叶球兰 568
 狭叶黄杨 340
 狭叶崖花子 ... 121
 狭叶排草 653
 狭叶假糙苏 ... 732
 狭叶掌叶树 ... 484
 狭叶蓬莱葛 ... 540
 狭叶番泻叶 ... 286
 狭叶楠 29
 狭叶蒲桃 171
 狭叶鼠麴草 ... 631
 狭叶鼠刺 240
 狭花马钱 541
 狭花长蒴苣苔 691
 狭序泡花树 ... 465
 狭桃叶珊瑚 ... 477
 狭萼半边莲 ... 658
 狭翼云实 285
 狭瓣木五加 ... 485
 狭瓣吊灯花 ... 563
 狭瓣紫薇 108
 独山瓜馥木 ... 11
 独脚金 684
 独脚莲 46
 独脚莲花 692
 狮子草 637
 狮子球 713
 狮子筋 222
 牯岭鹅耳枥 ... 345
 牻牛儿苗科 ... 103
 剑叶山芝麻 ... 198
 剑叶冬青 398
 剑叶耳草 588
 剑叶杜英 192
 剑叶金钱豹 ... 655
 剑叶波斯菊 ... 626
 剑叶南烛 502
 剑叶球兰 568
 剑叶紫金牛 ... 518
 剑叶槭 462
 胆八树 193
 胆草 648
 肺筋草 497
 脉叶香茶菜 ... 734
 脉果漆 471
 胖大海 201
 胖婆茶 142
 胜红蓟 613
 [、]
 亮毛红豆 323
 亮叶女贞 546
 亮叶杜英 192
 亮叶杨桐 141
 亮叶围涎树 ... 280
 亮叶厚皮香 ... 156
 亮叶栎 363
 亮叶崖豆藤 ... 317
 亮叶揭阳鱼藤 303
 亮叶猴耳环 ... 280
 亮叶槭 462
 亮绿爬山虎 ... 430
 亮薄叶山矾 ... 531
 弯叶冬青 395
 弯曲碎米荠 ... 70
 度量草 541
 庭藤 312
 疣果花楸 271
 痂子薯 293
 穿心草 646
 穿心草 185

穿心莲	699	美花崖豆藤 ...	318	洋芫荽	494
穿线蛇	84	美秀锥栗	350	洋金凤	285
穿破石	371	美国凌霄	695	洋柠檬	436
穿珠林	219	美栎	359	洋麻	206
穿根藤	593	美脉花楸	271	洋蒲桃	171
窃衣	498	美脉茵芋	443	洋橄榄	547
扁斗桐	361	美洲木棉	202	染色无香藤 ...	566
扁竹花	88	美艳杜鹃	506	炮仗竹	683
扁豆	309	美新木姜	33	炮仗红	663
扁担杆	187	姜叶柯	356	炮仗花	697
扁担藤	432	首乌	92	炮弹果	552
扁果柯	354	首冠藤	281	烂头钵	234
扁果润楠	31	前胡	496	烂泥巴树	491
扁果桐	364	总状山矾	532	烂泥树	491
扁桃	471	总状千金藤 ...	55	烂泥树科	491
扁钻	431	总序山矾	537	神仙果	7
扁球丁香	549	总序山蚂蝗 ...	307	闽粤栲栗	349
美丁花	175	总序山绿豆 ...	307	闽赣葡萄	433
美山矾	533	总序狸藻	687	冠盖绣球	242
美木莲	4	总苞牵牛	673	冠盖藤	245
美叶菜豆树 ...	697	总苞楼梯草 ...	385		
美肉穗草	178	总梗蓝猪耳 ...	685		
美丽山胡椒 ...	24	将军树 ...	231, 369		
美丽叶子花 ...	117	洒金榕	218		
美丽钓樟	24	洞柿	512		
美丽胡枝子 ...	314	浓毛柏拉木 ...	173		
美丽南烛	501	浓毛野锦香 ...	173		
美丽梧桐	196	洗手果	457		
美丽崖豆藤 ...	318	活血丹	725		
美丽獐牙菜 ...	649	活血胎	519		
美丽藻百年草	647	洛阳花	84		
美花兔尾草 ...	332	洋丁香	84		

[7]

眉豆	333
贯叶蓼	93
蚤缀	83
柔毛艾纳香 ...	621
柔毛当归	492
柔毛茜草	596
柔毛绣球	245
柔毛楼梯草 ...	386
柔刺草	700
退色黄芩	737

陡崖杏叶柯 ... 352	夏季石藤 241	桂西七叶树 ... 458
娃儿草 656	夏枯草 720	桂西黄檀 301
结衣藤 556	夏暑果 369	桂花 548
结香 115	唇形科 719	桂林乌柏 235
绒毛山绿豆 ... 309	莲 45	桂林石楠 251
绒毛千屈菜 ... 109	莲子草 99	桂林紫薇 108
绒毛叶山蚂蝗 309	莲生桂子花 ... 562	桂林锥 346
绒毛杭子梢 ... 295	莲花白 70	桂林槭 462
绒毛苹婆 201	葶艾冷水花 ... 390	桂南山矾 536
绒毛鸭脚木 ... 489	苘麻 204	桂南木莲 3
绒毛梭罗树 ... 200	苘麻叶扁担杆 187	桂南花皮胶藤 553
绒毛桐 361	莴苣 635	桂南柯 358
绒毛野锦香 ... 173	莴苣笋 636	桂南桐 359
绒果海木 ... 451	蒟蒻 491	桂钩藤 599
绒润楠 31	苣荬 664	桂圆 455
绒楠 31	莫菜 95	桂党参 655
络石 561	菜菔 71	桂野桐 228
绛花醉鱼草 ... 538	菜菔 425	桂粤黄檀 302
绞股蓝 131	蕹 710	桔 437
孩儿茶 599	荷 45	桔仔 440
孩儿草 704	荷包豆 324	桔红(见橘红) 436
孩儿草 629	荷兰豆 324	桔梗 656
	荷花玉兰 2	桔梗石竹 659
	荷莲豆 84	桔梗科 654
	莞香 114	栲树 351
	碧苾菜 97	栲栗 348
	桂丁香 583	桃 257
	桂山橙 555	桃叶珊瑚 477
	桂木 369	桃花心木 452
	桂叶素馨 543	桃金娘 167
	桂北悬钩子 ... 269	桃金娘科 163
	桂北槭 460	桐花树 515

十 笔

〔一〕

栗 346	栗叶算盘子 ... 224	栗寄生 414	哥波(牡音) ... 201	夏无踪 44	夏花云实 283
-------------	---------------	---------------	----------------	--------------	----------------

- 栓皮栎 364
 栓皮櫟 364
 桦木叶葡萄 ... 432
 桦木科 343
 桦角 344
 格木 288
 格林榻捷木 ... 157
 栝楼 136
 核桃 475
 桉树 166
 捕虫瞿麦 85
 热葎草 730
 豇豆 333
 珠子草 233
 珠兰 63
 珠光绣球 242
 珠眼柯 356
 破布木 660
 破布叶 189
 破血丹 691
 破血丹 633
 破故纸 325
 破铜钱 495
 较剪藤 567
 耙齿钩 21
 翅子树 199
 翅子藤 410
 翅子藤科 410
 (希藤科)
 翅托叶猪屎豆 297
 翅果槌果藤 ... 66
 翅怜 147
 翅脉百灵藤 ... 567
 翅荚香槐 297
 都安槭 464
 盐巴米 97
 盐肤木 472
 盐酸树 472
 盐霜白 472
 壶果山矾 538
 泰国西番莲 ... 129
 [1]
 唛吠 216
 唛坚(壮音) ... 290
 唛采 6
 唛栲 23
 唛梅马(壮音) 290
 唛嫩 10
 唛螺陀 10
 圆叶八角枫 ... 480
 圆叶水锦树 ... 602
 圆叶乌桕 235
 圆叶节节菜 ... 110
 圆叶瓜子菜 ... 59
 圆叶杜鹃 506
 圆叶鸡矢藤 ... 591
 圆叶茅膏菜 ... 82
 圆叶细辛 58
 圆叶狸藻 387
 圆叶野扁豆 ... 310
 圆叶榕 372
 圆叶舞草 305
 圆角金果榄 ... 55
 圆果冬青 401
 圆果杜英 193
 圆果花楸 271
 圆果琼楠 15
 圆果蕁菜 72
 圆齿两色槭 ... 460
 圆齿荚蒾 606
 圆齿紫金牛 ... 521
 圆齿紫金牛 ... 517
 圆金柑 440
 圆柱斑鸠菊 ... 645
 圆柱稠 359
 圆基米花树 ... 161
 圆眼 455
 圆萼山矾 535
 圆蒴蜆木 186
 圆锥花荵 710
 圆锥堇花 116
 圆锥绣球 244
 圆滑番荔枝 ... 10
 鸭儿芹 494
 鸭公青 ... 451, 711
 鸭仔虫菜 79
 鸭皂树 276
 鸭香草 729
 鸭屎瓜 136
 鸭脚木 490
 鸭脚板 ... 455, 494
 鸭脚黄连 37
 鸭脚蓼 94
 鸭嘴花 699
 峨眉千里光 ... 640

峨眉山胡椒 ... 22	倒卵叶红淡 ... 146	铁带藤 432
峨眉木荷 155	倒卵叶花点草 388	铁骨藤 552
峨眉五味子 ... 9	倒卵叶琼楠 ... 16	铁屎米 576
峨眉虎皮楠 ... 239	倒卵叶紫麻 ... 388	铁桐 213
峨眉紫金牛 ... 518	倒披针叶萝芙木	铁钻 12
蚬木 186 559	铁海棠 222
蚬肉秋海棠 ... 139	倒刺草 98	铁脚威灵仙 ... 39
蚬肉海棠 139	倒钩藤 290	铁商木 713
蚌壳千斤拔 ... 319	倒劈藤 65	铁榄 514
蚌壳椒 445	僂白菊 623	铁锥栲 350
蚝猪刺 46	倍蕊田繁缕 ... 83	铁篱笆 421
蚊子草 730	徐长卿 570	缺萼枫香 336
蚊母草 686	钱串木 307	缺腰叶蓼 94
蚊虫草 314	钱贯草 654	矩圆叶柃 150
贼子树 439	钻天杨 342	秤星木 393
柴龙树 411	钻地风 246	秤星树 466
柴沙利 577	钻地风 319	秤钩风 52
柴胡 492	铁刀木 287	秤锤子 253
柴胡叶链荚豆 292	铁山矾 536	秧青 302
党参 656	铁巴掌 182	积雪草 493
	铁东木 216	彩叶紫苏 721
	铁仔 524	彩花马鞭草 ... 717
	铁冬青 401	彩花茄 666
	铁包金 419	皱叶卫矛 408
	铁扫把 314	皱叶芥 69
	铁色 513	皱叶柯 354
	铁苋菜 212	皱叶莴苣 636
	铁面将军 231	皱叶酸模 95
	铁线莲 39	皱枣 425
	铁线子 514	皱果油茶 144
	铁轴草 739	皱果桐 214
	铁挂牌 221	皱果蛇莓 247

〔 〕

胭脂花 117
胭脂麻 611
胶木 15, 26
胶鸟藤 584
脂麻 698
倒水莲 75
倒地铃 454
倒吊笔 561
倒吊黄 75
倒卵叶山龙眼 118

皱桐	214	蚕豆	333	窄叶小桑树 ...	456
皱雀梅藤	424	蚕茧草	91	窄叶石斑木 ...	251
皱薄荷	734	爱地草	580	窄叶石楠	251
饿蚂蝗	308	笔罗子	465	窄叶坡垒	162
豺皮木姜	28	笔管榕	380	窄叶柃	152
豺皮樟	28	鸳鸯茉莉	663	窄叶厚皮香 ...	156
狸尾草	332			窄叶蚊母树 ...	335
狸藻科	687			窄叶落瓣油茶	144
狼牙草	312	高山栲	348	窄基红褐柃 ...	151
透明草	390	高山望 ...	191, 192	窄裂槭	459
透明蛇根草 ...	590	高山蓼	93	容县瓜馥木 ...	13
透骨草	719	高山榕	371	唐松草	44
透骨草科	719	高冬青	396	扇叶槭	461
透骨消	725	高地棉	205	扇花冷水花 ...	390
臭节草	435	高合欢	278	凌云山杠木 ...	250
臭矢茉莉	711	高原蝎蟊菊 ...	646	凌云山胡椒 ...	25
臭矢菜	67	高莴苣	635	凌云风车子 ...	180
臭豆腐木	715	高雪轮	85	凌云悬钩子 ...	265
臭牡丹	710	高脚白菜	70	凌霄	695
臭茉莉	711	高脚犁头草 ...	74	凉伞木	488
臭草	443	高粱泡	267	凉粉木	595
臭草	714	离萼守宫木 ...	236	凉粉果	377
臭荚蒾	607	宽叶卫矛	406	凉粉草	728
臭蚊艾	617	宽叶拉拉藤 ...	579	凉粉藤	51
臭菜	61	宽叶南烛	501	凉薯	323
臭假耳草	575	宽叶雪下红 ...	521	酒饭团	8
臭椿	447	宽叶锥花	725	酒药树	468
臭辣树	439	宽花柱黄杨 ...	340	酒饼子	14
臭辣树	715	宽卵叶山蚂蝗	305	酒饼叶	11
臭藜藿	97	宽萼桐	363	酒饼药	434
拿身草	305	宽筋藤	56	酒饼菊	434
拿拉藤	43	家麻树	201	酒窝草	671

浙玄参	684	海南茭苎	607	海桐皮	310
海刀豆	295	海南草珊瑚 ...	63	海桐花	123
海木	450	海南厚壳桂 ...	21	海桐花科	121
海风藤	8	海南毒鼠子 ...	274	海桐假柴龙树	412
海州常山	713	海南须蕊木 ...	411	海蚌含珠	212
海红	249	海南栲	350	海桑科	110
海红豆	276	海南倒吊笔 ...	561	海麻	207
海芒果	553	海南臭茉莉 ...	711	海棠	247, 249
海岛棉	205	海南铁骨藤 ...	552	海棠叶莓	267
海罗麻	207	海南崖豆藤 ...	317	海棠花	249
海南大风子 ...	124	海南桤木	450	海棠椴	189
海南山龙眼 ...	118	海南梭罗树 ...	199	海滨油楠	290
海南马兜铃 ...	57	海南黄梔	579	海滨薄瓣节节菜	
海南五月茶 ...	214	海南黄檀	300	109
海南木五加 ...	486	海南萝芙木 ...	559	海漆	223
海南木犀榄 ...	549	海南菜豆树 ...	697	流产草	329
海南冬青	397	海南粗丝木 ...	411	流苏子	598
海南耳挖草 ...	737	海南深红直管花		涩叶藤	120
海南吊石苣苔	693	731	涩沙藤	120
海南风吹楠 ...	36	海南密花树 ...	524	烟斗柯	354
海南血桐	227	海南菱	59	烟草	665
海南红豆	322	海南椴	189	烟管草	623
海南红椴	142	海南蒲桃	169	粉叶轮环藤 ...	51
海南杜鹃	504	海南鼠李	422	粉叶鱼藤	303
海南杨桐	141	海南锥栗	350	粉团	243
海南李榄	547	海南新樟	32	粉防己	55
海南余甘子 ...	233	海南榕	374	粉苹婆	200
海南茄	669	海南韶子	457	粉背山胡椒 ...	24
海南杯冠藤 ...	563	海南樟	19	粉背葶谷草 ...	638
海南轮环藤 ...	51	海南黎豆	320	粉背雷公藤 ...	410
海南罗伞树 ...	520	海南霍而飞 ...	36	粉绿牛皮消 ...	564
海南念珠藤 ...	551	海桐山矾	536	粉绿叶爬山虎	430

粉绿南烛	501	绢毛油麻藤	320	黄叶树	78
粉绿栲子	247	绣花针	577	黄瓜	130
粉绿钻地风	246	绣线梅	250	黄瓜香	73
粉绿秤钩风	52	绣球花	243	黄皮	438
粉绿猕猴桃	159	绣球花科	241	黄皮果	438
粉葛	326	绣球绣线菊	272	黄花夹竹桃	560
瓶头菊	636	陵水球兰	567	黄花序卫矛	406
浆果水苋	107	陶林模	557	黄花远志	75
资源木姜	27	预知子	49	黄花地丁	643
调羹树	120	展叶斑鸠菊	644	黄花鸡距草	64
益母草	726			黄花草子	315
拳头菊	628			黄花狸藻	687
拳参	89			黄花倒水莲	75

十一笔

〔一〕

桑	380	黄九牛	412	黄花球	632
桑上寄生	416	黄干头	89	黄花船板草	113
桑叶榕	376	黄山栾树	456	黄花酢浆草	105
桑枝米碎叶	164	黄山景天	80	黄花蒿	615
桑科	369	黄牙果	186	黄花蓝猪耳	685
桑寄生	416	黄牛木	183	黄花榆	208
桑寄生科	414	黄牛奶树	535	黄芽木	183
桑勒草	179	黄牛筋	290	黄芽白	70
通奶草	221	黄毛五月茶	214	黄杨	340
通条木	335	黄毛耳草	587	黄杨叶冬青	394
通条木科	334	黄毛灰叶	331	黄杨科	340
(旌节花科)		黄毛豆腐木	715	黄杨刺柊	125
通泡木	334	黄毛柄兔儿风	613	黄杞	475
通草	335, 491	黄毛掌叶树	484	黄杜鹃	505
通城虎	57	黄毛榕	373	黄豆	311
通泉草	681	黄毛黎豆	321	黄豆树	278
通脱木	491	黄兰	5	黄连	42
		黄龙退壳	371	黄连木	471
				黄菊莲	641

黄壳楠	26	黄棉木	594	恭菜	97
黄尿草	703	黄棉树	574	菠萝蜜	369
黄板木	141	黄薔	293	菠薐	98
黄板叉木	141	黄鹌菜	646	菠薐	98
黄刺茄	667	黄榄	448	菱	113
黄果	437	黄蜀葵	203	菱叶山绿豆	308
黄果厚壳桂	21	黄腺短尾叶铃	150	菱叶绣线菊	273
黄果榕	372	黄槐	287	菱角	113
黄肿木	226	黄蝉	550	菱角菜	69
黄命树	148	黄端木	141	菱果羊蹄甲	283
黄泡	265	黄槿	207	菱荚红豆	322
黄泡刺	264	黄樟	20	菱科	113
黄细心	117	黄椿木姜	28	萍乡山柳	498
黄线桐	359	黄檀	301	萍蓬草	45
黄柏	442	黄藤	52	堇叶碎米荠	71
黄荆	717	黄藤根	410	堇菜	72
黄荚蒾	608	黄藤通	38	堇菜科	72
黄冠毛杜英	192	黄藤子	266	菜豆	324
黄背叶铃木	150	黄鼠李	422	菜豆树	697
黄胆草	671	菊三七	633	菜藤	412
黄珠子	122	菊芋	633	菩提树	377
黄珠子草	234	菊花	625	菩提树	234
黄桐	220	菊芹	628	莨叶五加	481
黄根	592	菊科	612	莨肉	477
黄蚕木	381	菽	311	菲岛算盘子	225
黄海棠	183	菝葜叶铁线莲	40	菲律宾合欢	278
黄桑	371	萝卜	71	荊柎	125
黄堇	64	萝卜木	343, 344	菟丝子	671
黄常山	242	萝花	115	梅	256
黄麻	187	萝芙木	558	梅叶冬青	393
黄葵	203	萝芥叶	609	梅花草	43
黄葛榕	375	萝藦科	562	梅花钻	8

梅牢(壮音) ... 168	接骨金粟兰 ... 63	野木瓜 133
梅擦饭(壮音) 191	接骨草 ... 605, 702	野杜英 191
榧木 337	接筋藤 647	野牡丹 175
榧花 337	排草 651	野牡丹科 172
梯茛木 103	排草叶钮扣子 665	野皂角 286
梧桐 197	排钱草 307	野鸡公花 650
梧桐科 195	救必应 401	野鸡冠 101
枸木 154	救军粮 259	野枇杷 247
梓树 696	救荒粮 259	野枇杷 ... 465, 487
梢瓜 130		野苦葵 642
雪下红 520	[1]	野苦葵菜 634
雪见草 736	野八角 7	野板栗 352
雪豆 309, 324	野三七 489	野茉莉 529
雪花罌粟 63	野山茶子 142	野刺梨 263
球子草 624	野山楂 247	野玫瑰 261
球兰 567	野木兰 5	野思桃 251
球叶莴苣 636	野木瓜 49	野金丝桃 183
球花水蓼 89	野木棉 466	野金瓜 136
球花毛麝香 ... 677	野木蓝 311	野金银花 604
球花珍珠菜 ... 650	野水苎麻 382	野念珠藤 551
球茎甘蓝 68	野艾 618	野鱼腥草 721
球果木莲 3	野艾 616	野油麻 203
球果柯 357	野艾蒿 617	野柿 512
球果胆八树 ... 192	野甘草 683	野茶子 143
基及树 660	野生菜 635	野茶藤 403
基脉润楠 29	野冬桃 192	野荞麦 90
副萼翼核果 ... 424	野西瓜 135	野胡椒 ... 59, 523
琉璃草 660	野百合 299	野鸦椿 468
描绘冷水花 ... 391	野当归 95	野蚂蝗 308
掏马桩 319	野菟 100	野扁豆 286
接骨木 605	野芹 496	野桐 232
接骨丹 491	野麦叶 638	野桐 228

野 桉	166	野 辣椒	558	蛇床子	493
野豇豆	334	野漆树	473	蛇总管	734
野核桃	475	野豌豆	333	蛇莓	247
野苔菜	649	野薏豆	331	蛇根木	558
野蚊子草	85	野薄荷	728	蛇菰	419
野彩雀	42	鄂西石楠	253	蛇菰科	418
野海棠	137	鄂西胡颓子	426	蛇喇草	570
野烟叶	670	鄂西栎木	478	蛇婆子	201
野凉粉草	681	鄂羊蹄甲	282	蛇葡萄	427
野菰	686	鄂桂冬青	399	蛇藤	276
野菊	624	咄状玉叶金花	584	雀儿子树	715
野菊花	616	咄缘桐	360	雀儿花根	296
野黄皮	438	匙叶伽蓝菜	79	雀儿肾	517
野黄皮树	441	匙叶草	648	雀仔肾	525
野黄杨	340	匙羹藤	566	雀舌草	86
野黄桂	19	曼陀罗	664	雀舌草	184
野黄菊	624	眼镜豆	279	雀舌黄杨	340
野梧桐	229	悬钩子	267	雀梅藤	424
野梨	259	悬铃木	341	雀蒴珠	310
野牵牛	673	悬铃木叶苎麻	383	崖花子	121
野格拉菲	701	悬铃木科	341	崖县泡花树	465
野葛	327	悬铃花	208	崖爬藤	431
野棉	203	蛇不过	93	崖柿	511
野棉叶扁担杆	189	蛇目菊	626	崖桑	381
野棉花	37	蛇瓜	135	崖藤	50
野棉花	37	蛇头花	713	崩大碗	493
野葡萄	433	蛇头黄	642	崩疮药	173
野番茄	667	蛇头蓼	94	常山	242
野蓝	331	蛇头藤	54	常春卫矛	407
野蓝枝子	311, 312	蛇舌莲	80	常春藤	487
野蓝靛	312, 477	蛇花藤	573	常绿重阳木	216
野锦香	173	蛇含	254		

〔ノ〕

偏肿鸭嘴花 … 699
偏瓣花 … 178
斜叶榕 … 373
斜叶澄广花 … 14
斜对叶 … 334
斜脉胶桉 … 165
斜脉暗罗 … 14
斜蒴苣苔 … 692
稗草 … 720
假人参 … 334
假了刁竹 … 570
假九节木 … 577
假大青蓝 … 312
假山龙眼 … 119
假山红木 … 253
假山绿豆 … 305
假小花木五加 487
假卫矛 … 409
假木豆 … 308
假水八角 … 680
假水瓜 … 112
假水石梓 … 514
假水苏 … 724
假牛膝 … 699
假长毛锥花 … 726
假升麻 … 246
假龙眼 … 453
假瓜子金 … 565
假半支莲 … 652
假芙蓉 … 195, 203

假花生 … 226
假芹菜 … 659
假杜鹃 … 700
假杨桐 … 152
假地豆 … 292, 306
假地蓝 … 298
假老虎筋 … 284
假西藏红花 … 206
假吊钟 … 499
假肉桂 … 33
假向日葵 … 639
假红芽大戟 … 580
假走马风 … 726
假鸡皮果 … 438
假连翘 … 713
假茉莉 … 712
假辛婆 … 201
假青梅 … 393
假青蒿 … 615
假刺藤 … 522
假轮叶厚皮香 156
假败酱 … 716
假金鸡尾 … 678
假夜来香 … 574
假茶叶 … 524
假荔枝 … 49
假思桃 … 251
假钩藤 … 599
假桂乌口树 … 597
假栝楼 … 136
假蚌壳椒 … 445
假柴胡 … 616

假烟叶 … 670
假通城虎 … 57
假黄皮 … 67
假黄花 … 539
假黄杨 … 168
假黄草 … 208
假黄麻 … 187
假蒺菜 … 96
假野丁香 … 583
假野木瓜 … 50
假野芝麻 … 724
假蛇舌草 … 576
假斜叶榕 … 379
假绿豆 … 287
假猫豆 … 574
假菱 … 61
假葡萄 … 433
假琴叶悬钩子 268
假散血薯 … 55
假紫珠 … 716
假鹊肾树 … 381
假蓝靛 … 313
假蓝靛 … 331
假鼠尾草 … 736
假辣蓼 … 651
假新妇木 … 229
假酸枣 … 469
假糙苏 … 732
假螺序草 … 597
假鹰爪 … 11
假镰叶乌饭树 510
脱力草 … 246

脱皮树	527	盘花地不容 ...	54	犁耙柯	357
匍伏堇	73	盘柱冬青	397	猫儿刺	395
匍茎佛甲草 ...	80	象牙红	310	猫爪草	44
敏果	514	象牙红	736	猫合藤	158
猛老虎	653	船板草	114	猫豆	320
甜艾	617	船柄茶	153	猫尾木	696
甜叶木	225	猪牙木	217	猫尾草	332
甜叶算盘子 ...	225	猪牙皂荚	289	猫眼草	221
甜瓜	130	猪母楠	23	猫眼草	212
甜冬青	402	猪仔笠	310	铜叶柯	358
甜麦	637	猪耳木	608	铜钱叶母草 ...	681
甜果木通	49	猪耳风	634	铜钱树	421
甜茶	267, 356	猪耳草	178	铜钱草	650
甜莽麦	90	猪耳桐	480	铜钻	412
甜菜	97	猪血木	153	铜锤玉带草 ...	658
甜菜子	617	猪血木	156	银叶巴豆	219
甜麻	187	猪血树	602	银叶安息香 ...	528
甜楮	348	猪血藤	330	银叶杜茎山 ...	523
甜橙	437	猪油果	132	银叶花	654
兜蓬菜	63	猪攄菜	97	银白杨	341
脚骨脆	127	猪殃殃	578	银边大叶黄杨	407
猕猴桃	158	猪屎豆	299	银边卫矛	407
猕猴桃科	158	猪屎青	711	银丝草	672
梨	260	猪屎栏	592	银色山矾	538
梨叶小舌菊 ...	637	猪络木	238	银合欢	279
梨叶悬钩子 ...	268	猪笼草	58	银条菜	727
梨叶榕	377	猪笼草科	58	银线金粟兰 ...	62
梨叶榕	377	猪脚楠	29	银钟树	526
梨果米仔兰 ...	449	猪婆刺	371	银珠	290
梨果榕	377	猪粥菜	388	银桦	117
盒子草	129	猪糠木	532	银柴	215
盒果藤	675	犁头草	74	银柯木	154

银鹊树	468	密齿凤仙	106	婆婆指甲菜 ...	83
银瓣崖豆藤 ...	316	密脉木	586	淮木通	41
〔、〕		密脉鸭脚木 ...	490	清风藤	467
麻子藤	558	密脉蒲桃	169	清风藤科	464
麻轧木	289	密雀梅藤	423	清沙草	705
麻叶绣线菊 ...	272	密蒙花	539	清明柳	342
麻叶绣球	272	密锥花鱼藤 ...	304	清香木姜子 ...	26
麻花头	642	密榴木	13	清香藤	543
麻栎	358	康膜藤	553	清藤香	57
麻风树 ... 226, 386		廊茵	94	深山佛甲草 ...	80
	387	鹿角苣苔	689	深山含笑	5
麻桐	209	鹿角藤	553	深山黄堇	64
麻雀筋藤	412	鹿饭	372	深圆齿堇菜 ...	73
麻梨	260	鹿蹄草科	508	深隐长蒴苣苔	689
麻婆菜	736	鹿藿	327	深裂羊蹄甲 ...	281
麻楝	449	商木	125	深紫木蓝	311
密子豆	327	商陆	96	淡色椒	190
密生牵牛	673	商陆科	96	淡红鹿藿	327
密花山矾	533	寄生茶	417	淡黄悬钩子 ...	266
密花千里光 ...	640	寄生藤	417	粗毛千金藤 ...	54
密花木五加 ...	486	寄色草	644	粗毛水锦树 ...	601
密花水锦树 ...	600	剪刀股	635	粗毛水蓼	91
密花火棘	259	盖碗花	207	粗毛败酱	611
密花玉叶金花	584	望江南	286	粗毛野桐	229
密花冬青	395	望江南	286	粗毛猪屎豆 ...	299
密花豆	330	望春花	2	粗叶木	581
密花远志	76	旋花科	670	粗叶水锦树 ...	601
密花轮环藤 ...	51	旋花藤	670	粗叶耳草	588
密花树	525	旋复花	634	粗叶地桃花 ...	210
密花排草	651	旋蒴苣苔	688	粗叶拉拉藤 ...	578
密花假卫矛 ...	409	婆婆针	620	粗叶梵天花 ...	210
		婆婆纳	686	粗叶悬钩子 ...	263

粗叶斑鸠菊 ... 644
粗叶槿 ... 247
粗叶榕 ... 378
粗齿齿冠菊 ... 637
粗珍珠菜 ... 650
粗柄铁线莲 ... 39
粗脉乌饭树 ... 509
粗脉樟 ... 20
粗根细辛 ... 58
粗喙秋海棠 ... 137
粗糙莽芋 ... 730
粗糙悬钩子 ... 263
粗糠木 ... 343
粗糠柴 ... 231
粘木 ... 212
粘木科 ... 212
粘毛泡桐 ... 682
粘毛黄花捻 ... 209
粘毛假蓬 ... 625
粘手风 ... 708
粘母草 ... 681
粘身草 ... 305
粘树 ... 396
粘酢浆草 ... 105
断肠草 ... 540
断骨藤 ... 521

〔7〕

绿玉树 ... 223
绿叶山杜英 ... 193
绿叶石柯 ... 357
绿豆 ... 324

绿花寒莓 ... 264
绿茎还阳参 ... 626
绿果罗浮槭 ... 461
绿背桂 ... 223
绿萼梅 ... 256
绿萼酸模 ... 96
绿葡萄 ... 427
绿樟 ... 466
绿瓣绣球 ... 242
绵楮 ... 356
绵毛娃儿藤 ... 573
绵毛千里光 ... 640
绸缎木 ... 282
续断 ... 612
续断科 ... 612
续随子 ... 221
蛋果崖豆藤 ... 317
蛋黄焰爵床 ... 703
隆林耳叶柃 ... 150
隆林梭罗树 ... 199
隐脉琼楠 ... 17
弹斗栲 ... 352
弹帽桉 ... 166

十二笔

〔一〕

粟米草 ... 86
粟米草科 ... 86
喜树 ... 480
喜栎小苞爵床 ... 704
喜钙碎米荠 ... 70

葫芦 ... 132
葫芦茶 ... 309
葫芦科 ... 129
葛薯 ... 323
葛藟 ... 433
葛藤 ... 326
衰芝 ... 371
蓖麻 ... 234
葡萄 ... 434
葡萄叶艾麻 ... 387
葡萄叶鱼黄草 ... 675
葡萄科 ... 426
葎草 ... 392
葵叶扁担杆 ... 187
葵叶莓 ... 270
落地生根 ... 79
落地杨梅 ... 254
落地杨梅 ... 247
落地金钱 ... 82
落地紫金牛 ... 519
落地蜘蛛 ... 254
落花生 ... 293
落葵 ... 102
落葵科 ... 102
落瓣油茶 ... 144
蒴藋 ... 88
菱叶 ... 59
椅 ... 125
棒凤仙 ... 106
棒红花 ... 725
棒果榕 ... 373
棒棒木 ... 365

棒筒花	162	散血子	138	酢浆草	105
棒锤瓜	135	散血丹	444	酢浆草科	104
楮	370	散沫花	108	雅丽千金藤 ...	54
梭子藤	411	棘果卫矛	405	雅致鹿蹄草 ...	508
棱角丝瓜	132	硬毛山芝麻 ...	197	裂斗锥栗	349
梭果木	172	硬毛玉叶金花	585	裂叶白辛树 ...	527
梭茎木	174	硬毛石笔木 ...	157	裂叶秋海棠 ...	138
梭茎半边莲 ...	658	硬毛杨桃	160	裂叶悬钩子 ...	267
梭枝冬青	393	硬毛莢蒾	607	裂叶绿葡萄 ...	428
梭枝槲寄生 ...	417	硬毛滇白珠 ...	501	裂果金花	596
梭翅蒲桃	170	硬毛满山香 ...	501	裂膈牡丹	175
梭蕊同心结 ...	557	硬叶栎	357	塔花	721
椰菜	70	硬叶柯	357	越瓜	130
稠木	357	硬叶栲	352	越南瓜子金 ...	566
稠琼楠	17	硬叶蒲桃	171	越南卫矛	406
棉毛含笑	5	硬叶鼠李	422	越南山龙眼 ...	118
棉豆	324	硬叶樟	18	越南山胡椒 ...	25
棉桐	209	硬质石楠	251	越南大叶藤 ...	55
捻子	167	硬质石斑木 ...	251	越南巴豆	220
捻膜草	76	硬骨凌霄	698	越南叶下珠 ...	233
棕紫金牛	516	斑叶水珍珠菜	722	越南安息香 ...	531
榔榆	368	斑叶桉	166	越南羊蹄甲 ...	283
榔榆寄生	415	斑叶朱砂根 ...	519	越南冷水花 ...	389
椭圆广东绣球	243	斑花败酱	610	越南油楠	291
椭圆叶南烛 ...	501	斑鸠菊	644	越南油茶	146
椭圆豺皮木姜	28	斑鸠木	645	越南枝实	218
椭圆野木瓜 ...	49	斑种草	660	越南苎麻	384
棣棠花	249	琴叶飞蓬	629	越南香楠	594
揭阳鱼藤	303	琴叶悬钩子 ...	268	越南桂木	370
搜山虎	444	琴叶碎米荠 ...	71	越南崖豆藤 ...	316
琼桂山香圆 ...	469	琴叶榕	376	越南紫玉盘 ...	15
散玉叶金花 ...	584	琴忌郎	251	越南榆	368

越南裸瓣瓜 ... 131	掌叶榕 379	紫荆 288
越桔 510	掌叶蓼 93	紫荆木 514
越桔杜鹃 507	掌脉山芹菜 ... 497	紫背天葵 138
越桔爱花 508	掌裂草葡萄 ... 426	紫背金牛 76
越桂樟 20	棠梨 260	紫背金钱 82
翘摇 294	紫云英 294	紫背绿 516
戟叶扛板归 ... 94	紫风车子 180	紫脉鹅耳枥 ... 345
戟叶鱼黄草 ... 675	紫玉兰 2	紫凌木 164
戟叶犁头草 ... 73	紫玉盘 14	紫堇科 64
戟叶蓼 95	紫龙须 67	紫雪花 653
朝开暮落花 ... 207	紫羊蹄甲 282	紫麻 388
朝天罐 177	紫花地丁 74	紫弹树 365
博白大果油茶 143	紫花钮扣子 ... 665	紫梗树 302
博白大果茶 ... 143	紫花茄 667	紫葳 695
博白油茶 143	紫花前胡 496	紫葳科 695
博落回 64	紫花堇 74	紫萼莓 264
韩信草 737	紫花苜蓿 316	紫楠 34
逼迫子 217	紫花牵牛 674	紫槭 460
	紫苏 733	紫薇 108
	紫苏草 679	紫檀 325
	紫枝柳叶绣球 244	紫穗槐 293
	紫茉莉 117	紫藤 334
	紫茉莉科 117	黑九牛 35
	紫苜蓿 316	黑木姜 25
	紫果猕猴桃 ... 161	黑叶木蓝 312
	紫金牛 518	黑叶龙吐珠 ... 713
	紫金牛科 515	黑叶谷木 176
	紫金花 108	黑叶爵床 699
	紫树 481	黑肉风 320
	紫树科 480	黑血藤 320
	紫草 661	黑壳楠 23
	紫草科 659	黑饭木 337

[1]

量天尺 140
景天科 79
鼎湖耳草 589
鼎湖合欢 279
鼎湖血桐 228
鼎湖钓樟 21
凿木 254
掌叶木 455
掌叶白粉藤 ... 429
掌叶树 484
掌叶秋海棠 ... 138
掌叶复盆子 ... 264

黑果果 120 短刺南宁栲 ... 347 短萼黄连 42

黑果娃儿藤 ... 573 短刺栲 348 短萼野蓝 330

黑草 678 短刺锥栗 348 短筒清明花 ... 552

黑桉 150 短茎秋海棠 ... 138 短穗铁苋菜 ... 212

黑面叶 216 短茎紫金牛 ... 516 短瓣石竹 83

黑面神 216 短齿白毛假糙苏
..... 731 铺地山绿豆 ... 307

黑翅荃草 683 短齿榕叶楼梯草
..... 385 铺地草 222

黑弹树 365 短柄卫矛 408 铺地毡 178

黑榄 448 短柄长叶水麻 385 铺地蛇 268

黑嘴蒲桃 168 短柄本勒木 ... 124 铺地蜈蚣 587

黑藤钻 584 短柄清风藤 ... 466 铺地锦 175

喃木 470 短柄紫珠 706 铺地蝙蝠草 ... 296

喇叭花 673 短柄幌伞枫 ... 488 链荚豆 292

喙顶红豆 321 短柄樱桃 255 锈毛木莲 4

喙果皂帽花 ... 10 短柄横蒴苣荬 694 锈毛石斑木 ... 260

喙嘴核桃 474 短柱八角 6 锈毛叶野枣 ... 425

喙荚云实 284 短柱枹 147 锈毛鱼藤 303

喉咙草 649 短柱络石 560 锈毛金银花 ... 604

喉毒药 400 短药野木瓜 ... 49 锈叶鱼藤 303

蛛毛千里光 ... 639 短药蒲桃 168 锈叶新木姜 ... 32

蛛毛香青 614 短冠草 684 锈色纤枝槲果藤
..... 67

晚花吊钟 500 短脉杜鹃 502 锈色柳枝山柑 67

[J]

短叶岗松 163 短总序荚蒾 ... 605 锈色宿苞豆 ... 328

短叶假糙苏 ... 731 短翅黄杞 475 锈花胡颓子 ... 426

短花台湾水锦树
..... 601 短梗牛奶藤 ... 569 腊肠树 286

短花茎飞蓬 ... 628 短梗青江藤 ... 404 腊瓣花 335

短序润楠 29 短萼天料木 ... 127 腋毛泡花树 ... 465

短序琼楠 16 短萼灰叶豆 ... 330 腋花络石 560

短尾叶枹 149 短萼素馨 543 稍秃樱桃 255

短刺海桐 121 短萼海桐 121 猩猩木 222

短萼海桐 121 猩猩草 221

- 猴耳环 230
 猴欢喜 195
 鹅不食 83
 鹅不食草 624
 鹅肠菜 86
 鹅脚板 497
 鹅脚草 97
 鹅掌柴 490
 鹅掌楸 1
 鹅掌藤 489
 粤羊蹄甲 282
 粤柳 342
 粤桂茄 667
 粤桂柯 353
 粤桂稠 360
 粤酒饼勒 434
 粤黄檀 300
 粤蛇葡萄 427
 粤黔野桐 229
 粤赣紫珠 709
 番木瓜 139
 番石榴 167
 番茄 665
 番泻叶 286
 番荔枝 10
 番荔枝科 10
 番禺匙羹藤 566
 番樱桃 167
 番薯 672
 鲁花 125
 筐柳 342
 筋骨草 719
 筛箕藤 522
 筒桂 18
 [、]
 湘桂毛萼红果树 273
 湘桂冷水花 391
 湘桂锦香草 177
 湖北卫矛 406
 湖北羊蹄甲 282
 湖北海棠 249
 湖北悬钩子 270
 湖南杨桐 141
 湖南连翘 183
 湖南金银花 605
 阔叶十大功劳 47
 阔叶瓜馥木 11
 阔叶西南八角枫 480
 阔叶异形木 172
 阔叶金合欢 276
 阔叶线柱苣苔 694
 阔叶厚皮香 155
 阔叶桫欏木 337
 阔叶萝芙木 558
 阔叶猕猴桃 160
 阔叶蒲桃 170
 阔叶楼梯草 386
 阔叶蜡莲绣球 244
 阔叶缬草 611
 阔萼悬钩子 269
 阔瓣白兰花 6
 滑叶常山 535
 滑光杜英 192
 滑桃树 237
 滑萼山矾 537
 割舌树 453
 愉悦蓼 91
 普谷麻 387
 普通千屈菜 109
 普通丝瓜 133
 普通油茶 144
 寒莓 264
 遍地金 184
 痧药儿 730
 粪箕笃 54
 [7]
 缅甸木 696
 缅甸木莲 3
 缅甸合欢 278
 缅甸茄 290
 缅甸枣 425
 缘毛一碗泡 78
 疏叶崖豆藤 318
 疏花山桂花 124
 疏花山绿豆 306
 疏花卫矛 407
 疏花本勒木 124
 疏花铁青树 413
 疏花海桐 122
 疏花腰骨藤 555
 疏花蓼 90
 疏花槭 462

疏枝泡花树 ... 464
疏齿栲 ... 351
疏脉弓果藤 ... 572
疏脉猴欢喜 ... 195
疏麻菜 ... 728

十三笔

〔一〕

蓝 ... 95
蓝花毛麝香 ... 676
蓝花草 ... 76
蓝花柴胡 ... 734
蓝花狸藻 ... 687
蓝花楹 ... 696
蓝美丁花 ... 175
蓝桉 ... 165
蓝雪科 ... 653
(白花丹科)
蓝裂膈牡丹 ... 175
蓝蓼 ... 95
蓝靛 ... 699
蓑衣草 ... 629
蒙自山芹菜 ... 497
蒙自合欢 ... 277
蒙自苎麻 ... 382
蒙自杜鹃 ... 504
蒙自铃木 ... 148
蒙自桉木 ... 343
蒙花 ... 115
蒙国润楠 ... 29
蒺藜 ... 103

蒺藜科 ... 103
蒲儿根 ... 641
蒲公英鼠菊 ... 614
蒲公英 ... 643
蒲桃 ... 170
蒴莲 ... 128
蒴藋 ... 605
蓟 ... 625
蒜头果 ... 413
蓬菜葛 ... 540
椴叶山麻杆 ... 213
椴叶厚壳树 ... 661
椴叶扁担杆 ... 189
椴树 ... 190
椴树科 ... 186
榄仁树 ... 181
榄色紫金牛 ... 519
榄李 ... 180
榄核莲 ... 699
楝 ... 451
楝叶吴茱萸 ... 439
楝科 ... 448
楔瓣花 ... 657
楔瓣花科 ... 657
楹树 ... 277
槌柱算盘子 ... 226
椿叶花椒 ... 444
椿芽树 ... 452
楠木 ... 34
楠木 ... 5, 154, 169
榆科 ... 365
楷木 ... 471

神葛藤 ... 552
雾水藤 ... 671
雾水藤 ... 671
雾水葛 ... 392
雷公根 ... 493
雷公藤 ... 410
雷公藤 ... 410
雷公枏 ... 346
雷公枏 ... 361
感应草 ... 105
槲桐 ... 712
碎米荠 ... 71
碌耳草 ... 109
瑞木 ... 335
瑞香 ... 115
瑞香科 ... 114
塘葛菜 ... 72
塘边藕 ... 61
鹊肾树 ... 381

〔1〕

蜂出巢 ... 563
蜂刺草 ... 83
蜈蚣七 ... 489
蜈蚣草 ... 88
路边青 ... 711
路边菊 ... 619
路边黄 ... 650
睫毛掌叶树 ... 484
睫毛长蒴苣苔 ... 690
蜀葵 ... 204
蜀榆 ... 368

- 虞美人 64
 幌伞枫 488
 幌幌木 413
 睡莲叶秋海棠 139
 睡莲科 45
 睡菜科 649
- [ノ]
- 腺山矾 534
 腺毛泡花树 ... 465
 腺叶山矾 531
 腺叶拉拉藤 ... 579
 腺叶野樱 257
 腺边山矾 536
 腺花香茶菜 ... 734
 腺柄山矾 531
 腺背忍冬 603
 腺点紫金牛 ... 519
 腺绣线梅 250
 腺萼木 585
 腺鼠刺 240
 腰果 469
 腰果柯 353
 腰骨藤 555
 腥藤 412
 鼠李冬青 393
 鼠李科 419
 鼠麴草 632
 鼠尾红 703
 鼠尾草 735
 鼠刺 239
 鼠刺木姜 27
- 鼠刺乌饭树 ... 509
 鼠刺叶石柯 ... 356
 鼠刺科 239
 鼠掌老鹤草 ... 104
 矮瓜 668
 矮地茶 518
 矮地黄连 452
 矮红果树 274
 矮茄 666
 矮青木 558
 矮香叶树 22
 矮雪轮 85
 矮假吊钟 499
 矮脚三郎 520
 解宝叶 189
 解热豆 541
 微子蕓菜 72
 微毛豆腐木 ... 716
 微毛柃 148
 微红水锦树 ... 602
 微花藤 412
 锦上添花 140
 锦毛穗花香科 738
 锦地罗 82
 锦鸡儿 296
 锦香草 178
 锦葵 207
 锦葵科 203
 锯叶竹节树 ... 182
 锯齿赫德木 ... 154
 锥叶榕 379
 锥果红淡 146
- 锥栗 346
 锥栗栲 348
 锡叶藤 120
 锡兰莲 43
 锡兰算盘子 ... 226
- [、]
- 滇木瓜 454
 滇印琼楠 15
 滇枣 425
 滇刺枣 425
 滇南红果树 ... 274
 滇南杭子梢 ... 294
 滇南蛇藤 404
 滇香薷 723
 滇球兰 568
 滇桂山香圆 ... 469
 滇桂山绿豆 ... 306
 滇桂木莲 3
 滇桂水锦树 ... 601
 滇桂牛栓藤 ... 473
 滇桂血桐 227
 滇桂安息香 ... 529
 滇桂米仔兰 ... 449
 滇桂金粟兰 ... 62
 滇桂茶药 568
 滇桂兔儿风 ... 613
 滇桂臭茉莉 ... 712
 滇桂海桐 122
 滇桂野茉莉 ... 529
 滇桂蛇根草 ... 591
 滇桂悬岩苣苔 694

蔓赤车 389
 蔓苳麻 388
 蔓苳苳菜 73
 蔓苳葫芦茶 ... 307
 蔓性千斤拔 ... 319
 蔓荆 718
 蔓草虫豆 296
 蔓胡颓子 426
 蔓斑鸠菊 645
 蔞菜 72
 蔞 91
 蔞子草 89
 蔞芽菜 91
 蔞科 87
 榛木科 345
 榛叶荚蒾 606
 榛叶黄花榆 ... 208
 榧藤子 279
 榧楂 247
 槐叶决明 287
 槐树 329
 檳榔柯 353
 檳榔钻 50
 檳榔櫚 359
 檳榔葵 59
 榕叶冬青 396
 榕树 376
 榨菜 69
 槁树 28
 截裂翻白叶树 199
 嘉宝山柳 499
 嘉賜树 126

[1]

蜡树 546
 蜡莲绣球 244
 蜡菊 633
 蜡梅 275
 蜡梅科 275
 蜻蜓叶 711
 蜘蛛香 611
 蝉翼藤 78
 罌粟 64
 罌粟科 63

[J]

膜叶钩藤 599
 膜叶紫珠 709
 膜叶槲果藤 ... 66
 膜叶嘉賜树 ... 127
 算珠豆 332
 算盘子 225
 算盘子密榴木 13
 管花荚蒾 610
 馒头果 225
 獐牙菜 648
 舞草 305

[、]

漆大伯 224
 漆姑木 224
 漆姑草 85
 漆树 473

漆树科 469
 漆榆 476
 辣鸡树 32
 辣味根 77
 辣椒 663
 辣椒木 121
 辣蓼 91
 端午艾 617
 褐毛弓果藤 ... 572
 褐毛四照花 ... 478
 褐毛野桐 230
 褐毛酸藤子 ... 522
 褐色球兰 568
 褐柄南蛇藤 ... 405
 赛山梅 530
 赛尔茜 678
 赛苹婆 201
 赛牡丹 64
 赛短序润楠 ... 30
 赛葵 208
 肇庆鱼藤 304
 瘦风轮菜 721

[7]

嫩肉木 523
 熊巴耳 178
 熊巴树 527
 熊耳草 613
 熊胆木 401
 缨绒花 628

十五笔

〔一〕

醋栗科 241
醉鱼草 539
醉香含笑 5
醉酒芙蓉 206
醉魂藤 567
醉蝶花 67
榶 447
槿麻 206
横经席 185
横蒴苣苔 695
槭叶悬铃木 ... 341
槭树科 459
樱叶石楠 253
樱花 258
樱桃椒 663
槲栎 358
槲寄生 417
樟叶木防已 ... 50
樟叶荚蒾 606
樟叶槭 460
樟树 18
樟科 15
樟梨 34
樟寄生 416
橄榄 448
橄榄科 447
橡胶树 226

橡胶榕 373
蕨叶人字果 ... 42
蕺菜 61
震叶花点草 ... 388
震叶紫麻 388
豌豆 324

〔1〕

蝶形花科 291
蝴蝶花 685
蝴蝶果 237
蝴蝶草 647
蝴蝶树 609
蝴蝶蓝猪耳 ... 685
蝴蝶槭 462
蝴蝶藤 129
蝙蝠草 296
墨菜 627, 702

〔丿〕

稻槎菜 637
箭叶黄葵 204
箭叶淫羊藿 ... 47
箭叶榕 378
箭叶蓼 90
箭杆杨 342
箭毒木 369
鲫鱼胆 ... 523, 544

〔丶〕

糊洩疏 244
澳洲金合欢 ... 276

潺槁木姜 26
潺槁树 26
瘤果柯 356
瘤果琼楠 16

〔フ〕

繖花山柳菊 ... 634
繖花木 455
繖花鱼黄草 ... 675
繖花绣球 245
繖房花耳草 ... 587
繖房荚蒾 606
繖房清风藤 ... 467
繖石竹 84
繖萼木 237
繖萼乌饭树 ... 509

十六笔

〔一〕

颠茄 662
薯豆 192
薯豆杜英 192
燕子尾 307
蕹菜 672
薄叶山矾 531
薄叶红厚壳 ... 185
薄叶柏拉木 ... 173
薄叶胡桐 185
薄叶梭罗树 ... 199
薄叶野锦香 ... 173
薄叶桐 359

薄柱草 586
 薄荷 728
 薄瓣石笔木 ... 157
 藪芒麻 382
 薜荔 377
 橙 437
 橘红 436
 霍而飞 36
 素舌千里光 ... 641

[1]

黔鱼藤 303
 黔茶 142
 黔贵柏拉木 ... 172
 黔贵野锦香 ... 172
 黔桂七叶树 ... 458
 黔桂三角瓣花 592
 黔桂千里光 ... 641
 黔桂千金藤 ... 54
 黔桂牛奶藤 ... 569
 黔桂百灵藤 ... 567
 黔桂芒麻 382
 黔桂鱼藤 304
 黔桂悬钩子 ... 265
 黔桂葵叶莓 ... 270
 黔桂槌果藤 ... 65
 黔桂醉魂藤 ... 567
 黔黄藤 300
 黔鄂桑 381
 黔越冬青 402
 黔粤柯 355

[1]

簕天剑 671
 穆坪醉鱼草 ... 539
 赞桃 258

[、]

磨盘草 204
 鸬鸕花 451
 鸬鸕茶 63
 鸬鸕麻 198
 糙叶长节耳草 590
 糙叶水芒麻 ... 384
 糙叶树 365
 糙皮桦 344
 糙果山茶 143
 糙刺蓼 94
 糖胶树 550
 懒茶叶 491

十七笔

[一]

藕豆 309
 藁本 495
 檀香 418
 檀香叶寄生 ... 417
 檀香科 417
 檀梨 418
 翳子草 43
 戴星草 642

[1]

螺丝木 526
 螺掩叶 216

[1]

穗序五隔草 ... 657
 穗序钟刺草 ... 701
 穗序栲 351
 穗序黄杞 475
 鳄梨 34
 鳊鱼脯 126
 蕻苋菜 100
 蕻杜鹃 117
 蕻泡木 595
 蕻档 444
 蕻番薯 673
 蕻管草 387
 簇花清风藤 ... 466
 簇蓼 88
 爵床 703
 爵床科 698
 繁缕 86
 繁缕叶景天 ... 79

[、]

糠秕琼楠 16
 糠藤 584

[7]

翼朴 367

翼核果 424
臀形果 259
掌蓝 68

十八笔

〔一〕

覆坡虎 379
藜 97
藜科 97
藤千里光 640
藤牡丹 172
藤茶 427
藤构 370
藤菊 643
藤菜 102
藤黄连 52
藤黄檀 301
藤蛇总管 412
藤梨 158
藤麻 392
藤麻 404
藤麻南蛇藤 404
藤商陆 673
藤葡萄 434
藤榕 374
藤槐 294
檬子公树 451
檬木 34
檬树 439
檬树寄生 415

〔1〕

嚙吟 513
嚙啮鸣 125
瞿麦 84
蜚蜉菊 645

〔ノ〕

镰叶乌饭树 509
镰叶鱼木 68
翻白叶树 198
翻白草 254

〔、〕

鹰爪 10
鹰爪花 10
癩杨梅 478
灌木苎麻 382

十九笔

〔一〕

藻百年草 647
藜香 719
椴木 350
椴椴 436
攀茎钩藤 600

〔ノ〕

蟹爪兰 140
蟹甲菊 622

〔、〕

爆牙郎 176
爆仗杜鹃 507
癖草 95,704
麒麟吐珠 700
麒麟花 222

二十笔

〔ノ〕

鰲蒴 349
鳞毛蚊母树 336
鳞片水麻 385
鳞花草 703
鳞尾木 413
鳞果榕 378
鳞秕杜茎山 524

〔、〕

糯米条 603

二十笔以上

〔一〕

霸王花 140
霸王鞭 140
露珠草 111
囊萼羊蹄甲 282

〔ノ〕

绶肠草 627

拉丁文科名、属名索引

科名或属名后的第一个数字是科的序列号，第二个数字是页码。有“#”号者是异名，不列科号，只列页码。

Abelia	233...603	Actinostemma.....	103...129
Abelmoschus	132...203	Adelostemma	231...562
Abroma	130...195	Adenantha	146...276
Abrus	148...291	Adenia.....	101...128
Abutilon	132...204	Adenophora.....	243...654
Acacia	146...275	Adenosma... ..	252...676
Acalypha	136...212	Adenostemma	238...612
ACANTHACEAE...	259...698	Adhatoda.....	259...699
Acanthopanax	212...481	Adina	232...574
Acanthopanax#	485	Adinandra	108...140
Acanthus	259...698	Aegiceras.....	223...515
Acer.....	200...459	Aeginetia.....	253...686
ACERACEAE	200...459	Aerva.....	63... 99
Achillea	238...612	Aeschynanthus ..	256...687
Achras.....	222...513	Aeschynomene.....	148...292
Achyranthes	63... 98	Aeschynomene#.....	328
Achyranthes# ..	85、99、101	Aesculus	198A...457
Acmena	118...163	Aganosma	230...550
Aconitum	15... 36	Agapetes	216...508
Acrocephalus	264...719	Agastache	264...719
Acronychia	194...434	Ageratum	238...613
Actinidia.....	112...158	Aglaia	197...448
ACTINIDIACEAE	112...158	Agrimonia	143...246
Actinodaphne	11... 15	Ailanthus.....	195...447
Actinodaphne# ..	28、32	Ainsliaea	238...613

Ajuga	264...719
Akebia	21... 48
ALANGIACEAE ...	210...479
Alangium.....	210...479
Albertisia	23... 50
Albizzia	146...277
Alchornea	136...213
Aleurites	136...213
Allamanda	230...550
Allomorpha.....	120...172
Allophylus	198...453
Allospodias	205...469
Alniphyllum	224...525
Alnus	161...343
Alphonsea	8 ... 10
Alseodaphne#	29
Alsomitra#	135
Alstonia.....	230...550
Alternanthera	63... 99
Althaea	132...204
Altingia	151...335
Alysicarpus.....	148...292
Alyxia	230...551
AMARANTHACEAE	
.....	63... 98
Amaranthus	63... 99
Amesiodendron ..	198...453
Ammannia	72...107
Ammannia*	109,110
Amorpha	148...293
AMPELIDACEAE	193...426
Ampelopsis	193...426

ANACARDIACEAE	
.....	205...469
Anacardium	205...469
Anaphalis.....	238...614
Andrographis	259...699
Androsace	240...649
Anemone	15... 37
Anethum	213...491
Angelica	213...492
Anisochilus.....	264...720
Anisomeles	264...720
Anisopappus	238...615
Annamocarya	207...474
Anneslea	108...142
Annona	8 ... 10
ANNONACEAE.....	8 ... 10
Anodendron.....	230...552
Anotis	232...575
Anplectrum	120...172
Anplectrum#.....	173
Anthocephalus...	232...576
Antiaris	167...369
Antidesma	136...214
Antigonum.....	57... 87
Antiotrema	249...659
Antirrhinum	252...677
Aphanamixis	197...449
Aphananthe.....	165...365
Apios	148...293
Apium	213...492
APOCYNACEAE...	230...550
Apodytes	179...411

Aporosa	136...215	Asystasia*.....	699
AQUIFOLIACEAE	171...393	Asystasiella	259...699
Aquilaria	81...114	Atalantia.....	194...434
Arachis.....	148...293	Atractylodes	238...620
Aralia	212...482	Atropa.....	250...662
Aralia*	489	Atylosia*	296
ARALIACEAE.....	212...481	Aucuba... ..	209...477
Archiphysalis	250...662	Averrhoa	69...104
Arctium	238...615		
Ardisia.....	223...515	Babua*	536
Arenaria.....	53... 83	Baccaurea	136...216
Argyreia	251...670	Bacopa.....	252...677
Aristolochia	24... 56	Baeckea	118...163
ARISTOLOCHIACEAE		Balanophora.....	189...418
.....	24... 56	BALANOPHORACEAE	
Artabotrys	8 ... 10	189...418
Artemisia.....	238...615	BALSAMINACEAE	71...106
Artocarpus	167...369	Baphicacanthus	259...699
Aruncus	143...246	Barleria	259...700
Arytera	198...454	Barthea	120...172
Asarum	24... 58	Basella	64...102
ASCLEPIADACEAE		BASELLACEAE	64...102
.....	231...562	Bauhinia	147...281
Asclepias.....	231...562	Beaumontia	230...552
Aspidopterys	133...210	Beesia.....	15... 37
Aster	238...618	Begonia	104...137
Aster*	619	BEGONIACEAE	104...137
Asteromaea	238...619	Beilschmiedia	11... 15
Asteropyrum	15... 37	Beloperone	259...700
Astilbe	47... 80	Benincasa.....	103...129
Astragalus	148...293	Bennettiodendron	93...124
Asyneuma.....	243...655	BERBERIDACEAE	19... 46

<i>Berberis</i>	19... 46	<i>Brachiostemon</i>	256...688
<i>Berchemia</i>	190...419	<i>Brachystelma</i>	231...562
<i>Bergia</i>	52... 83	<i>Brachystemma</i>	53... 83
<i>Beta</i>	61... 97	<i>Brandisia</i>	252...677
<i>Betula</i>	161...344	<i>Brassaiopsis</i>	212...484
BETULACEAE ..	161...343	<i>Brassica</i>	39... 68
<i>Bidens</i>	238...620	<i>Bredia</i>	120...174
BIGNONIACEAE	257...695	<i>Bretschneidera</i> ...	198A...458
<i>Biophytum</i>	69...104	BRETSCHNEIDERACEAE	
<i>Bischofia</i>	136...216	198A...458
<i>Bixa</i>	91...123	<i>Breynia</i>	136...216
BIXACEAE	91...123	<i>Bridelia</i>	136...217
<i>Blainvillea</i>	238...620	<i>Briggsia</i>	256...688
<i>Blastus</i>	120...172	<i>Broussonetia</i>	167...370
<i>Blinkworthia</i>	251...671	<i>Brucea</i>	195...447
<i>Blumea</i>	238...620	<i>Bruguiera</i>	122...182
<i>Blumeopsis</i>	238...622	<i>Brunella</i>	264...720
<i>Boea</i>	256...688	<i>Brunfelsia</i>	250...663
<i>Boehmeria</i>	169...382	<i>Bryonia</i> *	134
<i>Boenninghausenia</i>	194...435	<i>Bryonopsis</i> *	131
<i>Boerhaavia</i>	83...117	<i>Bryophyllum</i> *	79
<i>Boltonia</i> *	619	<i>Buchanania</i>	205...470
BOMBACACEAE	131...202	<i>Buchnera</i>	252...678
<i>Bombax</i> *	202	<i>Bucklandia</i> *	339
<i>Bonnaya</i> *	678, 679	<i>Buddleia</i>	228...538
BORAGINACEAE	249...659	<i>Buettneria</i>	130...195
<i>Borreria</i>	232...576	<i>Bupleurum</i>	213...492
<i>Boswellia</i>	196...447	<i>Burretiodendron</i> ..	128...186
<i>Bothriospermum</i> ..	249...660	BURSERACEAE ...	196...447
<i>Botryopleuron</i>	252...677	BUXACEAE	154...340
<i>Bougainvillea</i>	83...117	<i>Buxus</i>	154...340
<i>Bowringia</i>	148...294		

Cacalia	238...622
CACTACEAE	107...139
Caesalpinia	147...283
CAESALPINIACEAE	
.....	147...281
Cajanus	148...294
Calamintha	264...721
Calamintha*	722
Calendula	238...623
Callicarpa	263...705
Callistemon	118...163
CALLITRICHACEAE	
.....	79...114
Callitriche	79...114
Calonyction	251...671
Calophyllum	126...185
Calopogonium	148...294
Calorhabdos	252...678
Calotropis	231...562
CALYCANTHACEAE	
.....	145...275
Calystegia	251...671
Camchaya.....	238...623
Camellia	108...142
Camellia*	154
CAMELLIACEAE	108...140
Campanula*	655
CAMPANULACEAE	
.....	243...654
Campanumoea	243...655
Campanumoea*	656
Campsis	257...695

Camptotheca	211...480
Campylotropis	148...294
Campylus*	56
Canarium	196...448
CANNABINACEAE	
.....	170...392
Cannabis	170...392
Canscora	239...646
Cansjera	183...413
Cantharospermum	148...296
Canthium.....	232...576
Canvalia	148...295
CAPPARIDACEAE	36... 65
Capparis	36... 65
CAPRIFOLIACEAE	
.....	233...603
Capsella.....	39... 70
Capsicum	250...663
Caragana	148...296
Carallia	122...182
Cardamine	39... 70
Cardiandra	142...241
Cardiopteris... ..	179...411
Cardiospermum ..	198...454
Carica	106...139
CARICACEAE.....	106...139
Carmona	249...660
Carpesium	238...623
Carpinus	162...345
Carthamus	238...624
Carya	207...474

CARYOPHYLLACEAE

.....	53... 83
Caryopteris	263...710
Caryopteris*	710
Casearia.....	94...126
Cassia	147...286
Cassytha	11... 17
Castanea	163...346
Castanopsis	163...347
Casuarina.....	164...364

CASUARINACEAE

.....	164...364
Catalpa.....	257...695
Catenaria*.....	305
Catharanthus	230...552
Cayratia	193...428
Cecropia	167...370
Cedrela*	452
Ceiba	131...202
CELASTRACEAE	173...403
Celastrus	173...403
Celosia	63...101
Celsia	252...678
Celtis	165...365
Centella	213...493
Centipeda	238...624
Centranthera	252...678
Centrostemma	231...563
Cephalanthus	232...577
Cerastium	53... 83

CERATOPHYLLACEAE

.....	17... 45
-------	----------

Ceratophyllum	17... 45
Ceratoscyphus	256...689
Cerbera	230...553
Cercis.....	147...288
Ceropegia	231...563
Cestrum.....	250...663
Chaenomeles	143...246
Chasalia	232...577
Chavica*.....	60
Chaydaia	190...420
Chayota*	135

CHENOPODIACEAE

.....	61... 97
Chenopodium.....	61... 97
Chimonanthus	145...275
Chingiacanthus ...	259...700
Chingithamnus*	409
Chirita*.....	689, 690
Chisocheton.....	197...449
Chlamydofoea.....	256...689

CHLORANTHACEAE

.....	30... 62
Chloranthus	30... 62
Chloranthus*	63
Choerospondias ..	205...470
Chonemorpha	230...553
Christia	148...296
Chrysanthemum ..	238...624
Chrysophyllum ...	222...513
Chrysosplenium.....	47... 81
Chukrasia	197...449
Cimicifuga*	37

Cinchona.....232...577
 Cinnamomum11... 18
 Cipadessa..... ..197...450
 Circaea77...111
 Cirsium238...625
 Cissus193...429
 Citrullus103...130
 Citrus194...435
 Citrus*434
 Cladogynos136...218
 Cladrastis148...297
 Claoxylon...136...218
 Clausena194...437
 Cleistanthus136...218
 Cleistocalyx118...163
 Clematis15... 38
 Cleome36... 67
 Clerodendanthus...264...721
 Clerodendron263...710
 Clethra214...498
 CLETHRACEAE...214...498
 Cleyera.....108...146
 Clinacanthus259...700
 Clitoria...148...297
 Cnesmone.....136...218
 Cnidium213...493
 Cocculus23... 50
 Codariocalyx*305
 Codiaenum.....136...218
 Codonacanthus ..259...701
 Codonopsis243...656
 Coffea232...577

Coleus264...721
 COMBRETACEAE 121...180
 Combretum121...180
 Commersonia130...196
 Commiphora196...448
 COMPOSITAE ..238...612
 CONNARACEAE 206...473
 Connarus206...473
 Consolida15... 41
 CONVULVACEAE
251...670
 Convolvulus*.....672
 Conyza.....238...625
 Conyza*620
 Coptis15... 42
 Corchoropsis130...196
 Corchorus.....128...187
 Corchorus*196
 Cordia249...660
 Coreopsis.....238...626
 Coriandrum213...493
 Coriaria87...120
 CORIARIACEAE ..87...120
 CORNACEAE209...477
 Cornus209...477
 Cornus*478
 Corydalis33... 64
 CORYLACEAE ..162...345
 Corylopsis151...335
 Cotoneaster143...247
 Cotula238...626
 Craibiodendron ..215...499

<i>Craspedolobium</i> ...	148...297	<i>Cynoglossum</i> *	659
<i>Crassula</i> *	80		
CRASSULACEAE ...	45... 79	<i>Dactylicapnos</i>	33... 65
<i>Crataegus</i>	143...247	<i>Dahlia</i>	238...626
<i>Crataeva</i>	36... 67	<i>Dalbergia</i>	148...300
<i>Cratoxylon</i>	123...183	<i>Damnacanthus</i>	232...577
<i>Crawfurdia</i>	239...647	<i>Daphne</i>	81...115
<i>Crepis</i>	238...626	DAPHNIPHYLLACEAE	
<i>Crepis</i> *	646	136A...238
<i>Crotalaria</i>	148...297	<i>Daphniphyllum</i> ...	136A...238
<i>Croton</i>	136...219	<i>Dasymaschalon</i>	8... 10
CRUCIFERAE	39... 68	<i>Datura</i>	250...664
<i>Cryptocarya</i>	11... 20	<i>Daucus</i>	213...494
<i>Cryptolepis</i>	231...563	<i>Debregeasia</i>	169...384
<i>Cryptotaenia</i>	213...494	<i>Decaspermum</i>	118...164
<i>Cucubalus</i>	53... 83	<i>Deeringia</i>	63...101
<i>Cucumis</i>	103...130	<i>Delavaya</i>	198...454
<i>Cucurbita</i>	103...131	<i>Delonix</i>	148...288
CUCURBITACEAE	103...129	<i>Delphinium</i>	15... 42
<i>Cudrania</i>	167...371	<i>Delphinium</i> *	41
<i>Cuscuta</i>	251...671	<i>Dendrobenthamia</i>	209...478
<i>Cyathella</i>	231...563	<i>Dendropanax</i>	212...485
<i>Cyathocline</i>	238...626	<i>Dendropanax</i> *	484
<i>Cyathula</i>	63...101	<i>Derris</i>	148...302
<i>Cybbanthera</i> *	680	<i>Derris</i> *	317
<i>Cyclea</i>	23... 51	<i>Desmodium</i>	148...304
<i>Cyclobalanopsis</i> *	359, 360, 361, 362, 363	<i>Desmodium</i> *	332
<i>Cyclocarya</i>	207...475	<i>Desmos</i>	8... 11
<i>Cynanchum</i>	231...564	<i>Deutzia</i>	142...241
<i>Cynanchum</i> *	563, 591	<i>Dianthus</i>	53... 84
<i>Cynoglossum</i>	249...660	DICHAPETALAGEAE	
		144...274

Dichapetalum	144...274
Dichocarpum	15... 42
Dichondra	251...671
Dichroa	142...242
Dichrocephala	238...626
Dichrocephala*	626
Dicliptera	259...701
Didymocarpus	256...689
Didymocarpus*	693
Dillenia	85...120
DILLENACEAE	85...120
Dimerocarpus	167...371
Diospyros	221...511
Dipentodon	173...405
Diploclisia	23... 52
Diplocyclos	103...131
Diplopanax	212...487
Diplospora*	598
DIPSACACEAE	236...612
Dipsacus	236...612
DIPTEROCARPACEAE	
.....	116...162
Dischidanthus	231...565
Dischidia	231...565
Distylium	151...335
Distylium*	336
Dodonaea	198...454
Dolichos	148...309
Dolichos*	311, 326, 333
Dolichostelma	231...566
Dracontomelon	205...470
Drosera	48... 82

DROSERACEAE	48... 82
Drymaria	53... 84
Drypetes	136...220
Duabanga	74...110
Duchesnea	143...247
Dumasia	148...309
Dunbaria	148...310
Duperrea	232...578
Duranta	263...713
Dysophylla	264...722
Dysophylla*	723
Dysoema	19... 46
Dysoxylum	197...450
EBENACEAE	221...511
Eberhardtia	222...513
Ecdysanthera	230...553
Echites*	550
Eclipta	238...627
Edgeworthia	81...115
Ehretia	249...660
ELAEAGNACEAE	191...425
Elaeagnus	191...425
ELAEOCARPACEAE	
.....	128A...191
Elaeocarpus	128A...191
ELATINACEAE	52... 83
Elatostema	169...385
Elatostema*	389
Elephantopus	238...627
Elsholtzia	264...723
Elsholtzia*	735

Elytranthe	185...414
Embelia	223...521
Emilia	238...627
Emmenopterys ...	232...578
Endospermum.....	136...220
Engelhardtia	207...475
Enkianthus	215...500
Entada	146...279
Eomecon.....	32... 63
Epaltes.....	238...628
Epilobium	77...111
Epimedium.....	19... 47
Epiphyllum	107...139
Epithema	256...692
Eranthemum	259...701
Erechtites	238...628
ERICACEAE	215...499
Erigeron	238...628
Eriobotrya	143...247
Erioglossum	198...455
Eriolaena.....	130...196
Eriosema	148...310
Ervatamia	230...554
Erycibe	151...672
Eryngium	213...494
Eryodendron	108...153
Erythrina	148...310
Erythralum	182...412
Erythrophloeum ...	147...288
ERYTHROXYLACEAE	
.....	135...211
Erythroxylum	135...211

ESCALLONIACEAE

.....	139...239
Eschscholtzia	32... 64
Eucalyptus	118...164
Euchresta	148...311
Eucommia	152...339
EUCOMMIACEAE	152...339
Eugenia	118...167
Eugenia*	163, 168,
	169, 170, 171

Eryonymus	173...405
Eupatorium	238...629
Euphorbia	136...220
EUPHORBIACEAE	

.....	136...212
Euphoria	198...455
Eurya	108...147
Euryale	18... 45
Eurycorymbus.....	198...455
Euscaphis.....	204...468
Eustigma	151...336
Evodia	194...439
Evolvulus	251...672
Exacum	239...647
Exbucklandia*	338, 339
Excoecaria	136...223

FAGACEAE	163...346
Fagopyrum*	90
Fagraea	228...540
Fagus	163...352
Fibraurea	23... 52

Ficus	167...371
Firmiana	130...196
Fissistigma	8...11
Flacourtia	93...124
Flacourtia*	126
FLACOURTIACEAE	
.....	93...124
Flemingia*	319
Fluggea	136...223
Foeniculum	213...494
Fordia	143...311
Fordiophyton.....	120...174
Forsythia	229...542
Fortunella	194...440
Fragaria	143...248
Fraxinus	229...542
FUMARIACEAE	33...64
Gaillardia	238...630
Galeobdolon.....	264...724
Galium.....	232...578
Garcinia	126...185
Gardenia	232...579
Gardneria	228...540
Garuga.....	196...448
Gaultheria	215...500
Gelsemium	228...540
Gendarussa*	699
Geniosporum*	729
Gentiana	239...647
Gentiana*	647
GENTIANACEAE	239...646

Geophila	232...580
GERANIACEAE	67...103
Geranium	67...103
Gerbera	238...630
GESNERIACEAE	256...687
Geum.....	143...248
Gironniera	165...366
Gleadovia	253...686
Glechoma.....	264...725
Gleditsia	147...288
Glochidion	136...223
Glossogyne	238...631
Glycine	148...311
Glycosmis	194...441
Gmelina	263...713
Gmelina*	124
Gnaphalium.....	238...631
Goldfussia.....	259...701
Goldfussia*	700
Gomphandra	179...411
Gomphostemma	264...725
Gomphrena... ..	63...101
Gongronema	231...566
Goniothalamus	8...13
Gonocaryum	179...411
Gonocaryum*	549
Gordonia*	154
Gossampinus	131...202
Gossypium	132...205
Gouania	190...420
Grangea	238...632
Graphistemma.....	231...566

Gratiola*	679
Grevillea	84...117
Grewia	128...187
GROSSULARIACEAE	
.....	141...241
GUTTIFERAE ...	126...185
Gutzlaffia	259...701
Gymnema	231...566
Gymnocladus	147...289
Gymnopetalum ...	103...131
Gymnotheca	29... 61
Gynandropsis*	67
Gynostemma	103...131
Gynostemma*	135
Gynura	238...632
 Hainania	128...189
Halesia	224...526
HALORAGACEAE	78...113
Haloragis	78...113
HAMAMELIDACEAE	
.....	151...335
Hamamelis	151...336
Hancea*	229, 737
Hanceola	264...726
Handeliodendron ...	198...455
Hartia	108...153
Hedera	212...487
Hedyotis*	589
Hedysarum*	296, 305
Helianthus	238...633
Helichrysum	238...633

Helicia	84...118
Helicia*	119, 120
Heliciopsis	84...119
Helicteres	130...197
Heliotropium	249...661
Helwingia	209...478
Hemiboea	256...692
Hemigraphis	259...702
Hemistepta	238...633
Hemsleya	103...131
Henrya*	573
Henslowia	186...417
Heteropanax	212...488
Heteroplexis	238...634
Heterostemma	231...567
Hevea	136...226
Heynea	197...450
Hibiscus	132...206
Hibiscus*	203, 204, 209
Hieracium	238...634
HIPPOCASTANACEAE	
.....	198A...457
HIPPOCRATEACEAE	
.....	178...410
Hiptage	133...211
Hodgsonia	103...132
Holarrhena	230...555
Holmskioldia	263...714
Holostemma	231...567
Homalium	94...127
Homalocladium	57... 88
Homonoia	136...226

Hopea	116...162
Horsfieldia	14... 36
Houttuynia	29... 61
Hovenia	190...420
Hoya	231...567
Hugeria	216...508
Humulus	170...392
Huodendron	224...526
Huthamnus	231...568
Hydnocarpus	93...124
Hydrangea	142...242
HYDRANGEACEAE	
.....	142...241
HYDROCARYACEAE	
.....	77A...113
Hydrocotyle	213...494
Hydrolea	248...659
HYDROPHYLLACEAE	
.....	248...659
Hygrophila	259...702
Hylocereus	107...140
Hymenodictyon	232...580
Hyoscyamus	250...664
HYPERICACEAE	123...183
Hypericum	123...183
Hypoestes	259...702
Hypserpa	23... 53
Hyptis	264...726
ICACINACEAE	...179...411
Ichnocarpus	230...555
Idesia	93...125

Ilex	171...393
ILLICIACEAE2A... 6
Illicium	2A... 6
Illigera	13A... 35
ILLIGERACEAE	...13A... 35
Ilysanthes	252...678
Impatiens	71...106
Indigofera	148...311
Inula	238...634
Inula*638
Iodes	179...411
Ipomoea	251...672
Ipomoea*671, 675
Iresine	63...102
Isanthera	256...692
Isopyrum*42, 43
Itea	139...239
Itoa	93...125
Ixeris	238...634
IXONANTHACEAE
.....	135A...212
Ixonanthes	135A...212
Ixora	232...580
Jacaranda	257...696
Jacquemontia	251...674
Jasminum	229...542
Jatropha	136...226
JUGLANDACEAE	207...474
Juglans	207...475
Jussiaea	77...112

Jussiaea [#]	112
Justicia	259...702
Justicia [#]	699
Kadsura	3 ... 8
Kalanchoe	45... 79
Kalopanax	212...488
Kandelia	122...182
Kerria	143...249
Kinostemon	264...726
Kinostemon [#]	738, 739
Kleinhovia	130...198
Kmeria	1 ... 1
Knoxia	232...580
Kochia	61... 98
Koelreuteria	198...455
Korthalsella	185...414
Kummerowia	148...313
Kydia	132...207

LABIATAE	264...719
Lactuca	238...635
Lactuca [#]	634, 635, 637
Lagenaria	103...132
Lagenophora	238...636
Lagerstroemia	72...107
Lagdera	238...636
Lamium [#]	724, 732, 733
Lanea	205...470
Lantana	263...714
Laportea	169...386
Lapsana	238...637

LARDIZABALACEAE

.....	21... 48
Lasianthus	232...581
Lasianthus [#]	592
Latouchea	239...648
Launaea	238...637
LAURACEAE	11... 15
Lawsonia	72...108
Lecanthus	169...387
Leea	193...430

LENTIBULARIACEAE

.....	254...687
Leonurus	264...726
Lepidagathis	259...703
Lepionurus	183...413
Lepistemon	251...674
Lepistemon [#]	675
Leptodermis	232...583
Lespedeza	148...314
Lespedeza [#]	314
Leucaena	146...279
Leucas	264...727
Leucosceptrum [#]	735
Ligusticum	213...495
Ligustrum	229...545
Limnanthemum [#]	649
Limnophila	252...679
LINACEAE	65...102
Lindenbergia	252...680
Lindera	11... 21
Lindernia	252...680
Linociera	229...547

Linum65...102
 Lippia263...714
 Liquidambar151...336
 Liriodendron..... 1 ... 1
 Litchi198...456
 Lithocarpus163...352
 Lithocarpus*.....349,362
 Lithospermum.....249...661
 Litsea.....11... 25
 Litsea*15,22,24,33
 Lobelia.....244...657
 LOBELIACEAE ..244...657
 Loeseneriella178...410
 LOGANIACEAE ..228...538
 Lonicera233...603
 LORANTHACEAE 185...414
 Loranthus185...414
 Loranthus*414
 Loropetalum151...337
 Lotus148...315
 Lourea*296
 Loxostigma256...692
 Luculia232...583
 Ludwigia77...112
 Luffa103...132
 Lumnitzeria.....121...180
 Lycianthes250...664
 Lycium250...665
 Lycopersicum250...665
 Lycopus264...727
 Lyonia.....215...501
 Lysidice147...289

Lysimachia240...649
 Lysionotus256...692
 LYTHRACEAE.....72...107
 Lythrum72...109

Macaranga136...227
 Machilus11... 29
 Macleaya32... 64
 Macropanax212...488
 Madhuca222...513
 Maesa223...523
 Magnolia 1 ... 1
 MAGNOLIACEAE...1 ... 1
 Mahonia19... 47
 Malaisia167...380
 Malania182...413
 Mallotus136...228

MALPIGHIACEAE

.....133...210
 Malus143...249
 Malva132...207
 MALVACEAE132...203
 Malvastrum.....132...208
 Malvaviscus132...208
 Mangifera205...471
 Manglietia..... 1 ... 3
 Manglietia* 6
 Manihot136...232
 Manilkara222...514
 Maoutia169...387
 Mappianthus179...412
 Markhamia257...696

Marsdenia	231...569
Mastichodendron...	222...514
Mayodendron	257...696
Mazus	252...681
Medicago.....	148...315
Medinilla	120...175
Meehania.....	264...728
Melaleuca	118...167
Melampyrum	252...682
Melastoma	120...175
MELASTOMACEAE	
.....	120...172
Melia	197...451
MELIACEAE	197...448
Melilotus	148...316
Meliosma.....	201...464
Meliiodendron ..	224...527
Melochia.....	130...198
Melodinus	230...555
Melodorum*	12
Melothria	103...133
Memecylon	120...176
Memoralis	169...388
MENISPERMACEAE	
.....	23... 50
Mentha	264...728
Mentha*	722, 723
MENYANTHACEAE	
.....	239A...649
Menyanthes*	649
Meratia*	275
Merremia.....	251...675

Mesona.....	264...728
Mesona*.....	729
Metaplexis	231...569
Mezoneurum	147...290
Michelia	1 ... 4
Microchites.....	230...556
Microcos	128...189
Microdesmis	136...232
Microglossa	238...637
Micromelum	194...441
Microtoena	264...728
Microtropis.....	173...409
Miliusa	8 ... 13
Millettia	148...316
Mimosa	146...280
MIMOSACEAE ...	146...275
Mirabilis	83...117
Mischocarpus	198...456
Mitreola	228...541
Mitrephora	8 ... 14
Moghania.....	148...319
MOLLUGINACEAE	
.....	54... 86
Mollugo.....	54... 86
Momordica	103...134
Monocelastrus# ..	404
Monotropa	218...511
MONOTROPACEAE	
.....	218...511
MORACEAE	167...369
Morinda	232...583
Morus	167...380

Mosla*730,731
Mucuna148...320
Muehlenbeckia* 88
Munronia197...452
Muricococcum ...136...232
Murraya194...441
Mussaenda232...584
Mycetia232...585
MYOPORACEAE 261...705
Myoporum261...705
Myriactis238...637
Myrica.....159...343
MYRICACEAE ...159...343
Myrioneuron232...586
Myriophyllum .. 78...114
Myriopteron231...570
Myristica14... 36
MYRISTICACEAE 14... 36
MYRSINACEAE...223...515
Myrsine223...524
Myrsine*525
MYRTACEAE ...118...163
Mytilaria.....151...337

Nandina.....19... 48
Nanocnide169...388
Naravelia15... 43
Nasturtium39... 71
Nasturtium # 72
Nauclea232...586
Neillia.....143...250
Nelumbo18... 45

Nealsomitra103...135
Neocinnamomum ...11... 32
Neolitsea11... 32
Neolitsea* 24
NEPENTHACEAE 27... 58
Nepenthes27... 58
Nephelium198...457
Nerium230...556
Nertera232...586
Nicotiana.....250...665
Nosema264...729
Nothapodytes179...412
Nothopanax*488
Nuphar18... 45
NYCTAGINACEAE
.....83...117
NYMPHAEACEAE
.....18... 45
Nymphoides239A...649
Nyssa211...481
NYSSACEAE211...480

Ochna114...162
OCHNACEAE114...162
Ochroma131...202
Ocimum264...729
Ocimum*733
Ocymum*730
Oenanthe.....213...496
Oenothera77...113
OLACACEAE182...412
Olax.....182...413

Oldenlandia.....232...586
 Olea229...547
 Olea*549
 OLEACEAE229...542
 ONAGRACEAE.....77...111
 Operculina251...675
 Ophiorrhiza.....232...590
 OPILIACEAE183...431
 Opuntia107...140
 Oreocharis256...693
 Oreocnide169...388
 Origanum264...729
 Ormosia148...321
 OROBANCHACEAE
 253...686
 Orophea 8 ... 14
 Oroxylon.....257...696
 Orthodon.....264...730
 Orthodon*731
 Orthosiphon264...731
 Orthosiphon*721, 726
 Osbeckia120...177
 Osmanthus229...548
 Ostodes136...232
 Osyris186...418
 OXALIDACEAE ...69...104
 Oxalis69...105
 Oxyspora.....120...177
 Oxystelma231...570

 Pachygone 23... 53
 Pachyrhizus148...323

Pachyrhizus*327
 Paederia232...591
 Paeonia15... 43
 Pahudia147...290
 Pala*550
 Paliurus190...421
 Panax212...489
 Papaver32... 64
 PAPAVERACEAE 32... 63
 PAPILIONACEAE 148...291
 Parabaena23... 53
 Parabarium.....230...556
 Paracleisthus*218
 Paracyclea*51, 52
 Paralbizzia*279
 Paramanglietia..... 1 ... 6
 Paramignya.....194...442
 Paraphlomis264...731
 Paraprenanthes ...238...637
 Parnassia47... 81
 Parsonsia230...557
 Parthenocissus ...193...430
 Pasania*347, 348, 349,
 353, 354, 355,
 356, 357, 358
 Passiflora101...128
 PASSIFLORACEAE
 101...128
 Patrinia235...610
 Paulownia252...682
 Pavetta232...592
 PEDALIACEAE ...258...698

Pedicularis252...682
 Pedilanthus.....136...233
 Pegia205...471
 Pelagonium67...104
 Pellionia169...389
 Peltophorum147...290
 Pentanema238...638
 Pentapetes130...198
 Pentaphragma ..243A...657
 PENTAPHRAGMATACEAE
243A...657
 PENTAPHYLACACEAE
108A...158
 Pentaphylax.....108A...158
 Pentasacme231...570
 Penthorum.....47... 81
 Peperomia.....28... 59
 Pericampylus23... 53
 Perilepta.....259...703
 Perilla.....264...733
 Periploca.....231...570
 Peristrophe.....259...703
 Persea11... 34
 Petrocodon256...694
 Petrocosmea256...694
 Petunia250...666
 Peucedanum213...496
 Phaseolus.....148...323
 Phaseolus*.....311
 Phellodendron ..194...442
 Phlebochiton205...471
 Phlogacanthus ..259...703

Phlomis#727,732,733
 Phlox247...659
 Phoebe11... 34
 Photinia143...250
 Photinia#273
 Phryma.....263A...719
 PHRYMACEAE 263A...719
 Phtheirospermum 252...683
 Phyllagathis120...177
 Phyllagathis#179
 Phyllanthodendron136...233
 Phyllanthus136...233
 Phyllanthus#223
 Phylloboea#689
 Phyllodium#...304,306,307
 Physalis250...666
 Phytolacca.....59... 96
 PHYTOLACCACEAE
59... 96
 Picrasma195...447
 Picria252...683
 Picris238...638
 Pilea169...389
 Pileostegia142...245
 Pimpinella213...497
 Piper28... 59
 PIPERACEAE28... 59
 Pistacia205...471
 Pisum148...324
 Pithecellobium ..146...280
 Pithecolobium#.....279

PITTOSPORACEAE

.....	88...121
Pittosporum	88...121
Plagiopetalum ...	120...178
Planchonella	222...514
Planchonella*	513

PLANTAGINACEAE

.....	242...654
Plantago	242...654
PLATANACEAE	155...341
Platanus	155...341
Platea	179...412
Platycarya	207...476
Platycodon	243...656
Plectranthus	264...734
Plectranthus*	721, 731, 737, 738

PLUMBAGINACEAE

.....	241...653
Plumbago.....	241...653
Plumeria	230...557
Podophyllum*	46, 47
Pogostemon.....	264...735
Polanisia*	67

POLEMONIACEAE

.....	247...659
Polyalthia	8 ... 14
Polycarpaea	53... 85
Polycarpon	53... 85
Polygala	42... 75
Polygala*	78
POLYGALACEAE	42... 75

POLYGONACEAE 57... 87

Polygonum	57... 88
Polyosma.....	139...241
Polyspora	108...154
Poncirus	194...442
Pongamia	148...325
Populus	156...341
Porana.....	251...675
Portulaca	56... 87

PORTULACACEAE

.....	56... 87
Potentilla	143...254
Pottsia.....	230...558
Pouteria	222...514
Pouteria*	513
Pouzolzia	169...391
Pratia	244...658
Premna	263...714
Prenanthes	238...638
PRIMULACEAE.....	240...649
Prismatomeris ...	232...592
Pristimera	178...411
Procris	169...392
Prosartema	136...234
PROTEACEAE	84...117
Prunus.....	143...255
Pseuderanthemum	259...703
Pseudonephelium	198...457
Pseudosassafras ...	11... 34
Pseudostreblus ...	167...381
Psidium	118...167
Psilopeganum	194...443

Psophocarpus148...325
Psoralea148...325
Psychotria232...592
Pternopetalum.....213...497
Pterocarpus148...325
Pterocarya207...476
*Pterocarya**475
Pteroceltis165...367
Pterolobium.....147...290
*Pteroloma**307,309
Pterospermum130...198
Pterostyrax224...527
Pterygiella252...683
Pueraria148...325
Punica75...110
PUNICACEAE75...110
Pycnospora148...327
Pycnostelma231...570
Pygeum143...259
Pyracantha143...259
Pyrola215A...508
PYROLACEAE...215A...508
Pyrostegia257...697
Pyrularia.....186...418
Pyrus143...259

Quamoclit251...676
Quercus163...358
*Quercus**347,348,349,
 351,353,354,
 355,356,357,358
Quisqualis121...181

Radermachera257...697
Randia.....232...594
RANUNCULACEAE
 15... 36
Ranunculus15... 43
Rapanea223...524
*Rapanea**147
Raphanus39... 71
Raphiocarpus256...694
Raphiolepis.....143...260
Rauvolfia...230...558
Reevesia130...199
Rehderodendron ...224...527
Rehmannia252...683
Reinwardtia65...102
*Reinwardtia**.....103
RHAMNACEAE ...190...419
Rhamnella190...421
Rhamnus190...422
*Rhamphocarya**.....474
Rhinacanthus259...704
*Rhizophora**182
RHIZOPHORACEAE
 122...182
Rhododendron.....215...502
Rhodoleia.....151...338
Rhodomyrtus118...167
Rhodotypus143...261
Rhoiptelea.....207A...476
RHOIPTLEACEAE
 207A...476

Rhus.....205...472
 Rhynchoglossum ...256...694
 Rhynchosia148...327
 Rhynchospermum 238...638
 Rhynchotechum ...256...694
 Ribes141...241
 Ricinus136...234
 Rinorea40... 72
 Robinia148...327
 Roripa39... 72
 Roripa* 71
 Rosa.....143...261
 ROSACEAE.....143...246
 Rostrinucula264...735
 Rotala72...109
 Rotula249...662
 Rourea*474
 Rubia232...595
 RUBIACEAE232...574
 Rubus143...263
 Rudbeckia238...639
 Ruellia.....259...704
 Ruellia*678
 Rumex57... 95
 Rungia259...704
 Russelia252...683
 Ruta.....194...443
 RUTACEAE194...434

 Sabia201...466
 SABIACEAE201...464
 Sageretia.....190...423

Sagina53... 85
 Salacia.....178...411
 SALICACEAE.....156...341
 Salix156...342
 Salmalia*202
 Salomonina42... 78
 Salvia264...735
 Sambucus.....233...605
 SAMYDACEAE.....94...126
 Sanguisorba.....143...270
 Sanicula213...497
 SANTALACEAE...186...417
 Santalodes206...474
 Santalum186...418
 SAPINDACEAE ...198...453
 Sapindus198...457
 Sapium.....136...235
 SAPOTACEAE ...222...513
 Saraca147...290
 Sarcandra30... 63
 Sarcococca154...341
 Sarcopyramis120...178
 Sarcosperma.....222A...515
 Sarcosperma*514
 SARCOSPERMACEAE
222A...515
 Sargentodoxa22... 50
 SARGENTODOXACEAE
22... 50
 Sassafra* 35
 Satureia*721
 Saurauia113...161

SAURAUACEAE 113...161
 Sauropus136...236
 SAURURACEAE ...29... 61
 Saururus29... 61
 Saussurea.....238...639
 Saussurea*.....633
 Saxifraga47... 81
 SAXIFRAGACEAE 47... 80
 Schefflera212...489
 Schima.....108...154
 Schizandra3... 9
 SCHIZANDRACEAE 3... 8
 Schizomussaenda 232...596
 Schizonepeta264...736
 Schizophragma ...142...246
 Schnabelia264...716
 Schoepfia.....182...413
 Scolopia.....93...125
 Scoparia252...683
 Scorpiothyrus ...120...179
 Scrophularia252...684
 SCROPHULARIACEAE
252...676
 Scutellaria264...736
 Sebastiania.....136...237
 Secamone.....231...571
 Sechium103...135
 Securidaca.....42... 78
 Sedum45... 79
 Sedum* 80
 Selinum*493
 Semiaquilegia15... 44

Semiliquidambar...151...338
 Senecio.....238...639
 Senecio*.....622
 Serissa.....232...597
 Serratula.....238...642
 Sesamum.258...698
 Sesbania148...328
 Shuteria148...328
 Sida.....132...208
 Sideroxylon*.....514
 Siegesbeckia238...642
 Silene53... 85
 SIMARUBACEAE 195...447
 Sindechites230...559
 Sindora147...290
 Sinia114...162
 Sinocrassula45... 80
 Sinomenium23... 53
 Sinopimelodendron
136...237
 Siphocranion264...737
 Siphonostegia252...684
 Sisymbrium* 72
 Skimmia194...443
 Slackia.....256...694
 Sladenia108...155
 Sloanea128A...194
 Smithia148...328
 SOLANACEAE ...250...662
 Solanum250...666
 Solanum*664
 Solidago238...642

Sonchus238...642

Sonerila120...179

SONNERATIACEAE

.....74...110

Sophora148...329

Sopubia252...684

Sorbus143...270

Spatholobus.....148...330

Speranskia136...237

Sphaeranthus238...642

Sphenoclea243B...657

SPHENOCLEACEAE

.....243B...657

Spilanthus238...643

Spinacia.....61... 98

Spiradielis232...597

Spiraea143...272

Spondias*469,470

Stachys264...737

Stachytarpheta ...263...716

STACHYURACEAE

.....150...334

Stachyurus150...334

Stapfiophyton.....120...179

STAPHYLEACEAE

.....204...468

Stauntonia.....21... 49

Staurogyne259...704

Stellaria53... 86

Stelmatocrypton...231...571

Stemonurus*.....411

Stenolodium*294

Stephanandra143...273

Stephania23... 53

Stephanotis231...571

Sterculia130...200

STERCULIACEAE 130...195

Stereospermum ..257...697

Stereospermum*697

Stewartia.....108...155

Stixis.....36... 68

Stizolobium*.....321

Stranvaesia143...273

Streblus167...381

Streptocaulon231...571

Striga252...684

Strobilanthes259...705

Strobilanthes* 699,701,703

Strophanthus230...560

Strophoblachia ..136...237

Strychnos..... ..228...541

Stylosanthes148...330

STYRACACEAE ..224...525

Styrax224...528

Suaeda61... 98

Swertia239...648

Swietenia197...452

Sycopsis151...338

Symingtonia151...338

SYMPLOCACEAE 225...531

Symplocos225...531

Syndiclis11... 35

Synedrella238...643

Syneilesis*622

Syringa229...549
Syzygium.....118...168

Tagetes238...643
Talinum.....56... 87
TAMARICACEAE...98...128
Tamarindus.....147...291
Tamarix.....98...128
Tapiscia204...468
*Taraktogenos**124, 125
Taraxacum238...643
Tarennia232...597
*Tarennia**592
Taxotrophis167...381
*Tecoma**.....695
Tecomaria257...698
Tectona263...716
Telosma231...572
Teonongia167...381
Tephrosia148...330
Terminalia121...181
Ternstroemia108...155
TERNSTROEMIACEAE
.....108...140
Tetracera85...120
Tetrapanax212...491
Tetrapilus229...549
Tetrastigma193...431
Tetrathyrium151...339
Teucrium.....264...738
*Teucrium**.....726
Thalictrum15... 44

*Thea**.....142, 143, 146
THEACEAE.....108...140
Theopsis108...156
*Theopsis**142
Thesium186...418
Thespesia132...209
Thevetia230...560
Thladiantha.....103...135
Thunbergia259...705
THYMELAEACEAE 81...114
Thyrocarpus249...662
Thysanosperrum 232...598
Tiarella47... 82
Tilia.....128...189
TILIACEAE.....128...186
Tinomisium.....23... 55
Tinospora23... 55
Tirpitzia65...103
Toddalia194...444
Toona197...452
Torenia252...685
Torilis.....213...498
Torricellia212A...491
TORRICELLIACEAE
.....212A...491
*Tovara** 95
Toxicarpus231...572
*Trachelosperma**550
Trachelospermum 230...560
*Tragia**218
Trapa77A...113
Trema165...367

Trevesia	212...491
Trewia	136...237
Tribulus	66...103
Tricalysia	232...598
Trichosanthes	103...135
Trifolium	148...331
Trigonostemon ...	136...238
Trigonotis	249...662
Tripterygium	173...410
Tristania	118...172
Triumfetta	128...190
TROPAEOLACEAE	70...106
Tropaeolum	70...106
Tsoongia	263...716
Tsoongiodendron ..	1 ... 6
Turpinia	204...468
Tutcheria	108...156
Tylophora	231...573
Tylophora [#]	571
ULMACEAE	165...365
Ulmus	165...368
UMBELLIFERAE	213...491
Uncaria	232...599
Uraria	148...331
Urariopsis	148...332
Urena	132...210
Urophyllum	232...600
URTICACEAE ...	169...382
Utricularia	254...687
Uvaria	8 ... 14
Uvaria [#]	11

VACCINIACEAE	216...508
Vaccinium	216...508
Vaccinium [#]	500
Valeriana	235...611
VALERIANACEAE	
.....	235...610
Vallaris	230...561
Vandellia [#]	680, 681
Ventilago	190...424
Verbena	263...717
VERBENACEAE ...	263...705
Verbesina [#]	643
Vernonia	238...643
Veronica	252...686
Viburnnm	233...605
Vicia	148...333
Vicoa [#]	638
Vigna	148...333
Viola	40... 72
VIOLACEAE	40... 72
Viscum	185...417
VITACEAE	193...426
Vitex	263...717
Vitis	193...432
Wahlenbergia	243...656
Walsura	197...453
Waltheria	130...201
Wattakaka	231...574
Webera [#]	598
Wedelia	238...645

Weigela233...610
 Wendlandia.....232...600
 Whitfordiodendron
 148...334
 Wikstroemia.....81...116
 Wisteria148...334
 Woodfordia72...110
 Wrightia230...561

 Xanthium238...646
 Xanthophyllum42... 78
 Xanthophytopsis...232...602
 Xylosma.....93...126

Youngia238...646

 Zanthoxylum194...444
 Zelkova165...368
 Zenia147...291
 Zinnia238...646
 Zippelia.....28... 61
 Zizyphus190...424
 Zornia148...334
 Zygocactus107...140
 ZYGOPHYLLACEAE
 66...103

中科院植物所图书馆



S0050188

13007

58.VI

